

UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
INSTITUT ZA MATEMATIKU

SPECIJALNI ELEMENTI MREŽE I PRIMENE
DOKTORSKA DISERTACIJA

kandidat:

Andreja Tepavčević

mentor:

Svetozar Milic

SADRŽAJ

UVOD

POGLAVLJE I

SPECIJALNI ELEMENTI MREŽE	1
1.1 UVOD	1
1.2 OSNOVNE DEFINICIJE	2
1.3 UVODNA TVRDJENJA	5
1.4 NEKA SVOJSTVA DISTRIBUTIVNIH I KODISTRIBUTIVNIH ELEMENATA	8
1.5 KARAKTERIZACIJA BESKONAČNO DISTRIBUTIVNOG ELEMENTA	11
1.6 KARAKTERIZACIJA NEPREKIDNIH ELEMENATA MREŽE	13
1.7 O IZOMORFIZMIMA NEKIH INTERVALA U MREŽI	16
1.8 O IZOMORFIZMIMA IDEALA I FILTERA GENERISA- NIH SPECIJALNIM ELEMENTIMA	18
1.9 O MREŽNIM IDENTITETIMA, ZAKONIMA	23
1.10 O JEDNAKOSTI ALGEBARSKIH FUNKCIJA	27
1.11 KADA JE L_B PODMREŽA OD L ?	34
1.12 DEFINICIJE NERAZLOŽIVIH ELEMENATA MREŽE I JOS NEKE DEFINICIJE IZ TEORIJE MREŽA	36
1.13 O BIRKOFOVOJ TEOREMI REPREZENTACIJE	38
1.14 UOPŠTENJE TEOREME BIRKOFIJA	39
1.15 O KOLEKCIJI SVIH MREŽA SA IZOMORFNIM SKUPOM \wedge -NERAZLOŽIVIH ELEMENATA	41

POGLAVLJE II

SPECIJALNI ELEMENTI BIPOLUMREŽE	51
2.1 UVOD I OSNOVNE DEFINICIJE O BIPOLUMREŽAMA	51
2.2 DEFINICIJE I OSOBINE SPECIJALNIH ELEMENATA BIPOLUMREŽE	53
2.3 TEOREMA REPREZENTACIJE ZA BIPOLUMREŽE	58
2.4 DEFINICIJE I KARAKTERIZACIJA APSORPTIVNIH ELEMENATA BIPOLUMREŽE	60
2.5 TEOREMA REPREZENTACIJE BIPOLUMREŽE PREKO DIREKTOG PROIZVODA	62
2.6 IDENTITETI NA BIPOLUMREŽI	66

POGLAVLJE III

PRIMENE U ALGEBRI: MREŽE KONGRUENCIJA, PODALGEBRI, SLABIH KONGRUENCIJA	68
3.1 MREŽE SLABIH KONGRUENCIJA ALGEBRI I NEKA SVOJSTVA ALGEBRI (CEP, CIP, w CIP, *CIP)	68
3.2 KADA JE MREŽA C_{wd} PODMREŽA MREŽE E_{wd} , A KADA SE SA NJOM POKLAPA?	76
3.3 O MREŽI SLABIH KONGRUENCIJA DIREKTOG PROIZVODA ALGEBRI	85
3.4 PRENOŠENJE MREŽNIH ZAKONA SA MREŽA KONGRUENCIJA I PODALGEBRI NA MREŽU SLABIH KONGRUENCIJA	86
3.5 O PRENOŠENJU NEKIH SVOJSTAVA NA PODALGEBRE I FAKTOR ALGEBRE	92
3.6 O MREŽI SLABIH KONGRUENCIJA FAKTOR ALGEBRE	97
3.7 MREŽE SLABIH KONGRUENCIJA NEKIH POSEBNIH KLASA I VARIJETETA ALGEBRI	107
LITERATURA	124

UVOD

Teorija mreža razvija se u poslednjih 100 godina paralelno sa tendencijama objedinjavanja oblasti u algebri i logici, strukturnih ispitivanja i nalaženja opštih zakonitosti. U tom smislu, karakterična je formalizacija logike (A.De Morgan, G Boole, sredinim prošlog veka), kao i razvoj univerzalne algebre (A.N.Whitehead, B.L.van der Waerden, početkom ovog veka). Posebno su za teoriju mreža značajna istraživanja C.S.Peirce-a, E.Schrodera, R.Dedekinda, krajem prošlog veka, kao i G.Birkhoffa, V.Glivenka, K.Mengera, J.von Neumanna i O.Orea, tridesetih godina ovog veka. Osnovni pojmovi teorije mreža, i njihova veza sa univerzalnom algebrom prvi put su celovito izloženi u Birkhoff-ovoj knjizi Teorija mreža (Lattice Theory) (1940, 1948, 1967) kao sinteza navedenih istraživanja. Fundamentalni rezultati Birkhoffa o kongruencijama, slobodnim algebrama i varijetetima odredili su pravce istraživanja koja se i danas obavljaju. Od šezdesetih godina naglasak je na strukturnim istraživanjima algebri preko mreža kongruencija i podalgebri. Teorija mreža razvila se kao posebna matematička disciplina, a pored primena u matematici (algebri,

projektivnoj geometriji, teoriji skupova, funkcionalnoj analizi,...), zbog svoje univerzalnosti, primenjuje se i izvan matematike (sociometrijska istraživanja, psihologija i dr., na primer u okviru Darmštatske škole). Potreba za ispitivanjem mreža na "većim" konačnim skupovima i njihovom vizuelnom interpretacijom dovode do uključivanja u ova istraživanja i timova kompjuterskih stručnjaka.

U okviru apstraktne teorije mreža započeta su nedavno (oko 70-tih godina) sistematična istraživanja specijalnih elemenata mreže čiji je značaj uočen unutar same teorije mreža. Njihova primena u univerzalnoj algebri dolazi do izražaja tek nedavno (Reilly, 1984). Ova doktorska disertacija pokušava da ukaže na istaknuto mesto tih elemenata u strukturnim istraživanja algebri (preko mreža podalgebri i kongruencija algebri i posebno mreža slabih kongruencija). Iz tog razloga bilo je nužno definisati neke nove specijalne elemente i ispitati i dokazati mnoga čisto mrežna svojstva, već poznatih i novo uvedenih elemenata.

Sa stanovišta apstraktne teorije mreža i srodnih struktura bilo je prirodno definisati i istražiti specijalne elemente i u slabijim algebarskim strukturama od mreža. Razlog za to je činjenica da specijalni elementi mogu uneti lokalnu zakonitost koja nije postulirana. Na taj način dobijene su i nove teoreme reprezentacije za bipolumreže.

* * *

U prvom poglavlju se proučavaju specijalni elementi mreže. U prva tri dela prvog poglavlja daju se osnovne definicije i tvrdjenja iz ove oblasti, i navode se originalne definicije beskonačno distributivnog i neprekidnih elemenata. Originalni primer 1.1 prikazuje mrežu u kojoj postoji element koji je neutralan, a nije beskonačno distributivan, što ilustruje potrebu uvođenja te definicije. U četvrtom, petom i

šestom delu prvog poglavlja proučavaju se specijalni elementi, daju se nove osobine već poznatih elemenata, kao i karakterizacije novouvedenih. U sedmom i osmom poglavlju se raspravljaju problemi koji su u vezi sa izomorfizmima nekih intervala, odnosno ideala i filtara generisanih nekim specijalnim elementima, pri čemu se u sedmom poglavlju koristi tvrdjenje 1.12 preuzeto iz jednog rada S.Milića. U osmom delu su takode navedena tvrdjenja kojima je karakterisan izuzetan element mreže. Sva ova tvrdjenja imaju i svoju primenu u trećem poglavlju (u mrežama slabih kongruencija). U devetom i desetom delu se ispituje kada neki mrežni identiteti (zakoni), odnosno jednakosti nekih algebarskih funkcija važe na mreži, u zavisnosti od toga kada važe na idealima (filtrima) generisanim nekim specijalnim elementima. Slični problemi se rešavaju i za identitete koji sadrže beskonačne supremume (infimume). Ova tvrdjenja se primenjuju u trećem delu kod utvrđivanja kada se neki mrežni identiteti prenose sa mreža podalgebri i kongruencija na mrežu slabih kongruencija, i kada se neka svojstva mreža slabih kongruencija prenose sa algebre na njenu podalgebru, i faktor algebru. U delu 11 se pokazuje kada je određena unija intervala u mreži podmreža te mreže, što se primenjuje u trećem delu za utvrđivanje kada je mreža slabih kongruencija faktor algebre do na izomorfizam podmreža mreže slabih kongruencija te algebre, i kada je izomorfna filtru u njenoj mreži slabih kongruencija.

U delovima 12-15 ispituje se drugi tip mrežnih problema, koji nemaju neposredne primene u algebri, bar ne kao tvrdjenja u prethodnim delovima. Ovi problemi su u vezi sa \wedge i \vee -nerazloživim elementima mreže. U dvanaestom delu daju se osnovne definicije i tvrdjenja iz ove oblasti, u trinaestom poznata Teorema Birkofa za distributivne mreže konačne dužine, a u četrnaestom uopštenje te teoreme preko ideala na skupu \vee -nerazloživih elemenata. U petnaestom delu ispituje se kolekcija svih mreža sa izomorfni skupovima \wedge -nerazloživih elemenata.

Utvrđuje se da je ta kolekcija i sama mreža u odnosu na skupovnu inkluziju, daje se potreban i dovoljan uslov za neku mrežu da pripada toj kolekciji, i ispituje se kada je ta kolekcija (mreža) jednoelementna i maksimalna (u ovom slučaju je ona Bulova mreža). Ovaj deo ukazuje na mogućnosti daljih istraživanja, jer se još mnogi problemi u vezi sa tom mrežom mogu postaviti.

U drugom poglavlju se definišu i ispituju specijalni elementi za bipolumreže, i rešavaju neki problemi reprezentacije, i važenja identiteta na bipolumrežama preko tih specijalnih elemenata, što opravdava njihovo uvođenje. U prvom delu drugog poglavlja daju se neke osnovne definicije u vezi sa bipolumrežama. U drugom delu se definišu specijalni elementi za bipolumreže, po analogiji sa mrežama; definišu se distributivan, beskonačno distributivan, standardan element, njima dualni pojmovi, kao i neutralan i skrativ element, i daju se neka osnovna tvrđenja u vezi sa tim elementima. Primer 1.1 pokazuje da ipak ne važi potpuna analogija sa mrežama, jer element može biti distributivan, kodistributivan, standardan, kostandardan i neutralan, a da ne bude skrativ, što kod mreža nije slučaj. U trećem delu se daje jedna teorema reprezentacije za bipolumreže. U četvrtom delu definišu se razne klase apsorptivnih elemenata, za koje ne postoje analogni pojmovi u teoriji mreža, i dokazuju se neke osobine tih elemenata. U petom delu daje se teorema reprezentacije bipolumreže preko direktnog proizvoda ideala i filtra generisanih nekim specijalnim elementima. U šestom delu utvrđuje se kada se proizvoljni mrežni identitet sa ideala i filtra na bipolumreži prenosi na celu bipolumrežu, i daju se posledice tog tvrđenja za neke posebne klase bipolumreža.

U trećem poglavlju daju se primene nekih rezultata u algebri, uglavnom rezultata iz delova 4-11 iz prvog poglavlja. Primene su u uglavnom u vezi sa mrežama kongruencija, podalgebri i slabih kongruencija neke algebre. U prvom delu daju se definicije i osnovna

svojstva tih mreža. Definišu se neka svojstva algebri koja se mogu karakterisati uz pomoć specijalnih elemenata u mreži slabih kongruencija, od kojih je beskonačno svojstvo preseka kongruencija (*CIP) originalna definicija. Primer 3.1 ilustruje opravdanje uvođenja te definicije, jer prikazuje algebru koja ima svojstvo preseka kongruencija, a nema beskonačno svojstvo preseka kongruencija. Navode se neke poznate karakterizacije, i daju neke nove, algebri koja imaju neka od tih svojstava (CEP, CIP, *CIP). U drugom delu rešavaju se problemi kada je mreža slabih kongruencija podmreža mreže slabih ekvivalencija, a kada se sa njom poklapa. U trećem delu se razmatra mreža slabih kongruencija direktnog proizvoda algebri. Prema poznatom tvrdenju iz algebre direktan proizvod mreža kongruencija dve algebre se može potopiti u mrežu kongruencija njihovog direktnog proizvoda. Ovde se utvrđuje da to nije slučaj i za mreže slabih kongruencija.

U četvrtom delu trećeg poglavlja rešava se problem kada se proizvoljni mrežni identitet prenosi sa mreža kongruencija i podalgebri na mrežu slabih kongruencija (ovo je do sada bilo poznato samo za neke mrežne identitete). Ovde su takođe dati potrebni i dovoljni uslovi pod kojima je mreža slabih kongruencija polumodularna.

U petom delu trećeg poglavlja, primenjujući tvrđenja iz prvog poglavlja dobijaju se uslovi za prenošenje nekih algebarskih svojstava (CEP, CIP, *CIP) sa algebre na njene podalgebre i faktor algebre. U šestom delu se daju potrebni i dovoljni uslovi da mreža slabih kongruencija faktor algebre bude do na izomorfizam podmreža mreže slabih kongruencija te algebre, i daju se uslovi pod kojim je ta podmreža filter u mreži slabih kongruencija te algebre (to je uvek slučaj sa mrežama kongruencija, odnosno, mreža kongruencija faktor algebre uvek je filter u mreži kongruencija te algebre).

U sedmom delu trećeg poglavlja ispituju se mreže slabih kongruencija nekih posebnih klasa algebri i varijeteta. Ispituju se

mreže slabih kongruencija unarnih algebri, navode se već poznati i novi rezultati za mreže i grupe, kao i originalni rezultati za prstene, varijetete modula, Hamiltonove, B_m -regularne algebre, Risove varijetete i varijetete skupova.

Na kraju je navedena Literatura sa 132 bibliografske jedinice.

* * *

Pored naslova pojedinih delova navedena je literatura koja je korišćena u tim delovima (rednim brojem iz spiska literature).

Svi dokazi koji su navedeni su originalni. Tvrdjenja koja su preuzeta iz literature navedena su bez dokaza, sa oznakom broja iz spiska literature. Ako su dati originalni dokazi poznatih tvrdjenja to je takode naznačeno oznakom pored tvrdjenja broja iz rada odakle je preuzeto tvrdjenje. Osim rezultata koji su neobjavljeni, deo originalnih rezultata je objavljen samostalno, a deo u koautorstvu, u radovima navedenim u spisku literature.

* * *

Učešće na Konferenciji iz teorije mreža, održanoj povodom 80. rodendana G.Birkhoffa, u Darmštatu, 1991 godine, i susreti sa matematičarima koji su utemeljili teoriju mreža, G.Birkhoff-om, G.Gratzer-om i drugima, posebno su uticali na koncepciju ovog rada.

Želela bih da spomenem i sve one koji su na razne načine pomogli u nastajanju ovoga rada.

Kolege iz inostranstva, Hilda Draškovicova sa Univerziteta Komenského iz Bratislave, George Markowsky sa Univerziteta iz Meina i Ivan Chajda iz Prerova, Čehoslovačka su mi redovno slali svoje knjige i radove i obavestavali me o najnovijim dostignućima i problemima, čime su mi omogućili da budem u toku sa razvojem u ovoj oblasti i pomogli mi u izboru teme za ovaj rad.

Kolega Branimir Šešelja me je pre više godina uputio na slabe kongruencije i postavio neke probleme iz ove oblasti, što je rezultovalo dugogodišnjom saradnjom i mnogim zajedničkim radovima.

Janez Ušan mi je prvi ukazao na značaj istraživanja u teoriji bipolumreža u kojoj smo saradivali i imali zajedničke rezultate.

Bilo mi je zadovoljstvo saradivati sa mentorom Svetozarom Milićem, koji je postavio neke od problema koji su na ovom mestu rešeni, i dao niz korisnih sugestija koji su ovaj rad poboljšali.

Žarko Mijajlović inicirao je izlaganje mojih rezultata na Seminaru u Beogradu, pročitao rad i dao neke kritičke primedbe značajne za moj dalji rad.

Žikica Perović je rad veoma detaljno pregledao i dao niz korisnih sugestija i komentara.

Milan Grulović mi je pomogao u skraćivanju i ulepšavanju nekih dokaza i ispravljanju nekorektnosti u dokazu Tvrdjenja 1.10.

Dragan Acketa pregledao je rad i dao neke korisne komentare.

Svima hvala!

Novi Sad, mart 1993.

Andreja Tepavčević

POGLAVLJE I

SPECIJALNI ELEMENTI MREŽE

1.1 UVOD

Specijalni elementi mreže imaju veliku ulogu u reprezentaciji mreža i primenama u algebri, posebno u mrežama kongruencija, podalgebri i slabih kongruencija neke algebre. Značaj specijalnih elemenata je sledeći: U proučavanju nekih osobina mreža nije uvek potrebno da identitet važi na celoj mreži. Nekad je dovoljno posmatrati jedan ili više elemenata mreže koji zadovoljavaju određena svojstva. Najčešće se taj element posmatra kao konstanta u toj mreži, ili se u nekom zakonu fiksira taj element i traži se da tako dobijeni zakon važi na celoj mreži. Na primer umesto zahteva da mreža bude distributivna, za važenje nekih tvrdjenja dovoljno je da neki fiksirani element u toj mreži bude distributivan (odnosno da distributivni

zakon sa tim elementom fiksiranim na određenom mestu u zakonu uvek bude zadovoljen.)

O.Ore je 1935. godine prvi uveo pojam neutralnog elementa u modularnoj mreži. G.Birkhoff je 1940 proširio taj pojam posmatrajući neutralni elemenat u proizvoljnoj mreži. Neki autori neutralni elemenat nazivaju distributivnim. G.Gratzer i E.T.Schmidt su 1960 godine definisali standardni elemenat. N.R.Reilly je 1984 definisao i proučavao izuzetan elemenat. Neka svojstva specijalnih elemenata i svojstva mreža koja imaju određene specijalne elemente, kao i slične teme, pored gorepomenutih, dali su i J.Hashimoto, S.Kinugawa, O.Hajek, Iqbalunnisa, M.F.Janowitz, B.Šešelja, S.Milić, D.Acketa, G.Vojvodić, A.Tepavčević i drugi.

U ovom poglavlju će se navesti definicije i neka osnovna tvrđenja u vezi sa specijalnim elementima mreže, i biće dokazana neka mrežna tvrđenja koja su značajna i sama po sebi, a takode će se neka od njih u ostalim poglavljima primeniti za rešavanje nekih problema iz algebre.

1.2 OSNOVNE DEFINICIJE [4, 18, 41, 104, 117]

Neka je (L, \wedge, \vee, \leq) proizvoljna kompletna mreža i $a \in L$.

Elemenat a je distributivan ako za sve x i y iz L važi:

$$a \vee (x \wedge y) = (a \vee x) \wedge (a \vee y)$$

Elemenat a je kodistributivan ako za sve x i y iz L važi:

$$a \wedge (x \vee y) = (a \wedge x) \vee (a \wedge y).$$

Elemenat a je standardan ako za sve $x, y \in L$ važi:

$$x \wedge (a \vee y) = (x \wedge a) \vee (x \wedge y).$$

Elemenat a je kostandardan ako za sve $x, y \in L$ važi:

$$x \vee (a \wedge y) = (x \vee a) \wedge (x \vee y).$$

Element a je komodularan ako za sve x i y iz L

$$x \leq y \text{ implicira } xv(ay) = (xva)\wedge y.$$

Element a je modularan ako za sve x i y iz L

$$a \leq y \text{ implicira } av(x\wedge y) = (avx)\wedge y.$$

Dva elementa b i c iz L čine modularan par ako za svako $x \in L$:

$$x \leq c \text{ implicira } xv(b\wedge c) = (xvb)\wedge c.$$

Element a je neutralan ako za sve $x, y \in L$ važi:

$$(a\wedge x)v(x\wedge y)v(y\wedge a) = (avx)\wedge(xvy)\wedge(yva).$$

Element a je izuzetan ako je neutralan i klase kongruencije indukovane sa m_a imaju najveće elemente koji čine podmrežu M_a od L .

Neka je $(L, \leq, 0, 1)$ kompletna mreža sa najmanjim elementom (0) i najvećim elementom (1) .

Centar mreže L je podskup $C \subseteq L$ elemenata iz L koji su neutralni i koji imaju komplemente.

Očigledno je da neutralni element ima najviše jedan komplement, i da je taj komplement i sam neutralan, i da je centar mreže njena podmreža, i to Bulova mreža.

Uvodimo i sledeće definicije.

Element a je beskonačno distributivan ako za svaku familiju $\{x_i \mid i \in I\}$ elemenata iz L

$$a v \bigwedge_{i \in I} x_i = \bigwedge_{i \in I} (a v x_i).$$

Element a je beskonačno kodistributivan ako za svaku familiju $\{x_i \mid i \in I\}$ elemenata iz L

$$a \wedge \bigvee_{i \in I} x_i = \bigvee_{i \in I} (a \wedge x_i).$$

Reći ćemo da je element a skrativ ako za sve $x, y \in L$

iz $a \wedge x = a \wedge y$ i $avx = avy$ sledi $x = y$. (*)

Svojstvo (*) nazvaćemo svojstvo skraćivanja.

Slede još neke poznate definicije iz teorije mreža.

Element a kompletne mreže L je kompaktan ako iz $a \leq \bigvee_{i \in I} x_i$ sledi da je $a \leq \bigvee_{j \in J} x_j$, za neki konačan podskup $J \subseteq I$.

Element a kompletne mreže L je kokompaktan ako iz $a \geq \bigwedge_{i \in I} x_i$ sledi da je $a \geq \bigwedge_{j \in J} x_j$, za neki konačan podskup $J \subseteq I$.

Kompletna mreža je algebarska ako se svaki njen element može prikazati kao supremum kompaktnih elemenata (tj. ako je kompaktno generisana).

Kompletna mreža je neprekidna sa gornje strane ako za svaki element $a \in L$ i svaki lanac $C \subseteq L$ važi:

$$a \wedge \bigvee_C x_i = \bigvee_C (a \wedge x_i).$$

Kompletna mreža je neprekidna sa donje strane ako je njoj dualna mreža neprekidna sa gornje strane.

Kompletna mreža je neprekidna ako je neprekidna i sa gornje i sa donje strane.

Svaka algebarska mreža je neprekidna sa gornje strane.

Svaka kompletna kokompaktno generisana mreža je neprekidna sa donje strane.

Navodimo i sledeće definicije iz kojih ćemo izvesti neke osobine beskonačno distributivnih elemenata mreže.

Element a kompletne mreže L je \wedge -neprekidan ako za svaki lanac $\{x_i \mid i \in I\} \subseteq L$ važi:

$$a \wedge \bigvee_{i \in I} x_i = \bigvee_{i \in I} (a \wedge x_i).$$

Element a kompletne mreže L je \vee -neprekidan ako za svaki lanac $\{x_i \mid i \in I\} \subseteq L$ važi:

$$a \vee \bigwedge_{i \in I} x_i = \bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i).$$

Element a kompletne mreže je neprekidan ako je \wedge -neprekidan i \vee -neprekidan.

1.3 UVODNA TVRĐENJA [4,41]

Sledećih nekoliko lema su poznata tvrđenja koja karakterišu neke od specijalnih elemenata mreže.

Lema 1.1 (Ore, 1935.) Neka je L proizvoljna mreža i a element iz L . Sledeći uslovi su ekvivalentni:

- (i) Element a je distributivan.
- (ii) Preslikavanje $n_a : x \rightarrow avx$ je homomorfizam mreže L na filter $[a]$.
- (iii) Binarna relacija θ_a definisana na mreži L sa:
 $x\theta_a y$ akko $avx = avy$

je relacija kongruencije. ■

Važi i dualno tvrđenje:

Lema 1.1' Neka je L proizvoljna mreža i a element iz L . Sledeći uslovi su ekvivalentni:

- (i) Element a je kodistributivan.
- (ii) Preslikavanje $m_a : x \rightarrow x\wedge a$ je homomorfizam mreže L na ideal $[a]$.
- (iii) Binarna relacija ϕ_a definisana na mreži L sa:
 $x\phi_a y$ akko $a\wedge x = a\wedge y$

je relacija kongruencije. ■

Lema 1.2 (Greger i Šmit, 1961.) Neka je L proizvoljna mreža i a element iz L . Sledeći uslovi su ekvivalentni:

- (i) Element a je standardan.
- (ii) Binarna relacija ψ_a definisana na mreži L sa:
 $x\psi_a y$ akko $(x\wedge y)\vee a_1 = x\vee y$ za neko $a_1 \leq a$,

je kongruencija.

- (iii) Element a je distributivan, i za svako $x, y \in L$ iz $x\vee a = y\vee a$ i $x\wedge a = y\wedge a$ sledi $x = y$. ■

Važi i dualno tvrđenje:

Lema 1.2' Neka je L proizvoljna mreža i a elemenat iz L . Sledeći uslovi su ekvivalentni:

- (i) Elemenat a je kostandardan.
- (ii) Binarna relacija ψ_a definisana na mreži L sa:
 $x\psi_a y$ akko $(xvy)\wedge a_1 = x\wedge y$ za neko $a_1 \geq a$,

je kongruencija.

- (iii) Elemenat a je kodistributivan, i za svako $x, y \in L$ iz $xva=yva$ i $x\wedge a=y\wedge a$ sledi $x=y$. ■

Lema 1.3 Neka je L proizvoljna mreža i $a \in L$. Sledeći uslovi su ekvivalentni:

- (i) Elemenat a je neutralan.
- (ii) Elemenat a je distributivan, kodistributivan i za svako $x, y \in L$ važi: iz $xva=yva$ i $x\wedge a=y\wedge a$ sledi $x=y$.

(iii) Preslikavanja m_a i n_a su homomorfizmi i preslikavanje $x \rightarrow (x\wedge a, xva)$ je potapanje iz L u $(a) \times [a]$.

(iv) Postoji potapanje φ mreže L u direktan proizvod $A \times B$, mreža A i B , gde mreža A ima najveći elemenat (1), mreža B najmanji elemenat (0), i $\varphi(a) = (1, 0)$.

(v) Za sve $x, y \in L$ podmreža generisana elementima x, y i a je distributivna.

- (vi) Elemenat a je standardan i u L i u dualnoj mreži. ■

Lema 1.4 (1) Svaki neutralan elemenat je standardan i kostandardan.

(2) Svaki standardan elemenat je distributivan.


(3) Svaki standardan i kostandardan elemenat je neutralan. ■

Lema 1.5 Elemenat a pripada centru mreže $(L, \leq, 0, 1)$ ako i samo

ako je mreža L izomorfna sa $(a] \times [a)$ u odnosu na preslikavanje $x \rightarrow (x \wedge a, x \vee a)$. ■

Sledi primer mreže u kojoj je elemenat a neutralan, a nije beskonačno distributivan:

Primer 1.1



slika 1.1

Element a je distributivan, kodistributivan i skrativ, a nije beskonačno distributivan, jer:

$$\bigwedge (a \vee x_i) = 1 \neq a = a \vee 0 = a \vee \bigwedge x_i$$

Lema 1.6 U modularnoj mreži elemenat a je neutralan ako i samo ako je distributivan ili kodistributivan. ■

Lema 1.7 U proizvoljnoj mreži L važi:

(i) Skup D svih distributivnih elemenata mreže L je zatvoren u odnosu na supremume, tj. za $x, y \in D$ važi da $x \vee y \in D$.

(i') Skup K svih kodistributivnih elemenata mreže L je zatvoren u odnosu na infimume, tj. za $x, y \in K$ važi da $x \wedge y \in K$.

(ii) Skup S svih standardnih elemenata mreže L je zatvoren u odnosu na supremume i infimume, tj. za $x, y \in S$, važi $x \wedge y \in S$ i $x \vee y \in S$.

(iii) Skup N svih neutralnih elemenata mreže L je zatvoren u odnosu na supremume i infimume, tj. za $x, y \in N$, važi $x \wedge y \in N$ i $x \vee y \in N$. Skup svih neutralnih elemenata mreže L je presek svih njenih maksimalnih distributivnih podmreža. ■

* * *

Slede nekoliko poznatih tvrdenja u vezi sa predstavljanjem mreže u obliku direktnog proizvoda mreža.

Tvrdenje 1.1 Postoji uzajamno jednoznačna korespodencija između razlaganja ograničene mreže L u direktan proizvod dve mreže i elemenata iz centra mreže. ■

Tvrdenje 1.2 Neka je L mreža sa 0 . Ako se ona može predstaviti u obliku direktnog proizvoda $L = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$, gde su M_i , za $i \in \{1, \dots, n\}$ direktno nerazložive mreže, za svako drugo razlaganje $L = N_1 \times N_2 \times \dots \times N_m$ mreže L u obliku direktnog proizvoda direktno nerazloživih mreža važi da je $m = n$ i postoji permutacija α skupa $\{1, \dots, n\}$ takva da je $M_i \cong N_{\alpha(i)}$ za svako $i \in \{1, \dots, n\}$. ■

Mreža je konačne dužine ako je njen najduži lanac konačan.

Tvrdenje 1.3 Svaka ograničena mreža konačne dužine izomorfna je direktnom proizvodu direktno nesvodljivih mreža. ■

1.4 NEKA SVOJSTVA DISTRIBUTIVNIH I KODISTRIBUTIVNIH ELEMENATA

Sledećih nekoliko tvrdenja daju karakterizaciju distributivnih i kodistributivnih elemenata mreže i koriste se u dokazivanju nekih svojstava mreža slabih kongruencija u poglavlju III.

Tvrdenje 1.4 Ako je a distributivan element mreže L , tada su sledeća tvrdenja ekvivalentna:

(i) za sve $x, y \in L$

$x \leq y$ implicira $xv(a \wedge y) = (xva) \wedge y$; (a je komodularan element);

(ii) za sve $x, y \in L$

$$x \wedge (a \vee y) = (x \wedge a) \vee (x \wedge y). \quad (a \text{ je standardan element}).$$

Dokaz. (ii) \rightarrow (i)

Neka je $x \leq y$. Sada je $y \wedge (a \vee x) = (y \wedge a) \vee (y \wedge x) = (y \wedge a) \vee x$.

(i) \rightarrow (ii)

Iz $x \wedge y \leq x$ sledi $(x \wedge y) \vee (a \wedge x) = ((x \wedge y) \vee a) \wedge x = (x \vee a) \wedge (y \vee a) \wedge x = x \wedge (y \vee a)$. ■

U sledećim tvrdenjima pretpostavlja se da je a kodistributivan element mreže L i da klase kongruencije indukovane sa $m_a: x \rightarrow x \wedge a$ imaju najveće elemente (za $x \in L$ najveći element u odgovarajućoj klasi neka je \bar{x}).

Tvrđenje 1.5 Ako je a kodistributivan element mreže L tada su sledeća tvrđenja ekvivalentna:

(i) za sve $x, y \in L$

iz $x \wedge a = y \wedge a$ i $x \vee a = y \vee a$ sledi $x = y$; (a je skrativ)

(ii) za sve $x, y \in L$

$x \leq y$ implicira $x \vee (a \wedge y) = (x \vee a) \wedge y$

(a je komodularan);

(iii) za sve $x, y \in L$

$x \leq \bar{y}$ implicira $x \vee (a \wedge \bar{y}) = (x \vee a) \wedge \bar{y}$;

(iv) za sve $x, y \in L$

$x \vee (a \wedge y) = (x \vee a) \wedge (x \vee y)$

(a je kostandardan).

Dokaz. (i) \rightarrow (ii)

Neka je $x \leq y$. Koristeći da je a kodistributivan element, dobija se: $(x \vee (a \wedge y)) \wedge a = (x \wedge a) \vee (y \wedge a) = (x \vee y) \wedge a = y \wedge a = (x \vee a) \wedge y \wedge a$.

Takođe je: $(x \vee (a \wedge y)) \vee a = x \vee a \geq ((x \vee a) \wedge y) \vee a$, jer je $x \vee a \geq (x \vee a) \wedge y$,

a iz $x \leq y$ sledi da je $x \vee (a \wedge y) \leq (x \vee a) \wedge y$, pa važi i obrnuta nejednakost,

odnosno: $(x \vee (a \wedge y)) \vee a = ((x \vee a) \wedge y) \vee a$.

Koristeći (i) dobija se

$$xv(a\wedge y)) = (xva)\wedge y.$$

$$(ii) \longrightarrow (iii)$$

Očigledno.

$$(iii) \longrightarrow (iv)$$

$(xva)\wedge(xvy) \leq (xva)\wedge(\overline{xvy}) = xv(a\wedge(\overline{xvy})) = xv(a\wedge(xvy)) =$
 $= xv(a\wedge x)v(a\wedge y) = xv(a\wedge y),$ koristeći uslov (iii) uz $x \leq \overline{xvy}$, činje-
 nicu da je \overline{xvy} najveći element klase kongruencije indukovane sa m_a i
 kodistributivnost elementa a .

$$(iv) \longrightarrow (i)$$

Neka je $x\wedge a = y\wedge a$ i $xva=yva$. Iz uslova (iv) sledi:

$$xv(a\wedge y) = (xva)\wedge(xvy) \text{ i } yv(a\wedge x) = (yva)\wedge(xvy), \text{ pa je:}$$

$$\begin{aligned}
 x &= xv(x\wedge a) = xv(y\wedge a) = (xva)\wedge(xvy) = (yva)\wedge(xvy) = yv(a\wedge x) = \\
 &= yv(a\wedge y) = y.
 \end{aligned}$$

□

Tvrđenje 1.6 Ako je L polumodularna mreža konačne dužine i a je kodistributivan element iz L , tada je a komodularan element.

Dokaz Prema Teoremi 9, IV, 2 iz knjige [41] polumodularnost mreže L implicira ekvivalentnost komodularnosti elementa a sa uslovom:

$$\text{za sve } x, y \in L \text{ } y \leq a \text{ implicira } (yvx)\wedge a = (y\wedge a)v(x\wedge a).$$

Iz kodistributivnosti elementa a i $y \leq a$ sledi:

$(yvx)\wedge a = (y\wedge a)v(x\wedge a) = yv(x\wedge a),$ odakle sledi da je a
 komodularan.

■

Tvrđenje 1.7 Ako je element $a \in L$ kodistributivan, i skrativ, tada su sledeći uslovi ekvivalentni:

(i) a je distributivan;

(ii) za sve $x, y \in L$:

$$(x\wedge a)v(x\wedge y) = ((x\wedge a)v y)\wedge x.$$

Dokaz. (i) \longrightarrow (ii)

$$(x\wedge a)\vee(x\wedge y)\vee a = a\vee(x\wedge y);$$

$$(((x\wedge a)\vee y)\wedge x)\vee a = (a\vee x)\wedge(a\vee y\vee(a\wedge x)) = (a\vee x)\wedge(a\vee y) = a\vee(x\wedge y);$$

$$((x\wedge a)\vee(x\wedge y))\wedge a = (x\wedge a)\vee(x\wedge y\wedge a) = x\wedge a;$$

$$((x\wedge a)\vee y)\wedge x\wedge a = x\wedge a.$$

Pošto je: $(x\wedge a)\vee(x\wedge y)\vee a = (((x\wedge a)\vee y)\wedge x)\vee a$ i

$$((x\wedge a)\vee(x\wedge y))\wedge a = ((x\wedge a)\vee y)\wedge x\wedge a, \text{ sledi da je:}$$

$$(x\wedge a)\vee(x\wedge y) = ((x\wedge a)\vee y)\wedge x.$$

$$(ii) \rightarrow (i)$$

$$\begin{aligned} a\vee(x\wedge y) &= a\vee(x\wedge a)\vee(x\wedge y) \stackrel{(ii)}{=} a\vee(((x\wedge a)\vee y)\wedge x) = a\vee(((x\wedge a)\vee(y\wedge a))\wedge y)\wedge x \\ &= a\vee(((x\vee y)\wedge a)\vee y)\wedge x \stackrel{(ii) \text{ Tvrdjenje 1.5}}{=} a\vee((y\vee a)\wedge(x\vee y)\wedge x) = a\vee(x\wedge(a\vee y)) = \\ &= ((a\vee y)\wedge a)\vee(x\wedge(a\vee y)) \stackrel{(ii)}{=} (a\vee x)\wedge(a\vee y). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

1.5 KARAKTERIZACIJA BESKONAČNO DISTRIBUTIVNOG ELEMENTA [104]

Sledećih nekoliko tvrdjenja daju karakterizaciju beskonačno distributivnog elementa mreže i primenjuju se u dokazivanju nekih tvrdjenja u poglavlju III u vezi sa svojstvima mreže slabih kongruencija.

U sledećim tvrdenjima pretpostavlja se da je mreža L kompletna.

Lema 1.8 Sledeća tvrdjenja su ekvivalentna za element a mreže L :

(i) a je beskonačno distributivan;

(ii) preslikavanje $n_a : x \rightarrow x\vee a$ je kompletan homomorfizam iz L

u filter $[a]$;

(iii) relacija θ_a definisana sa:

$$x\theta_a y \text{ akko } a\vee x = a\vee y$$

je kompletna kongruencija na L . ■

Tvrdjenje 1.8 Element a mreže L je beskonačno distributivan ako

i samo ako za svako $b \in [a)$ familija $\{x \in L \mid avx \geq b\}$ ima najmanji elemenat.

Dokaz.

Neka je a beskonačno distributivan elemenat mreže L i neka $b \in [a)$, i neka je $\{x_i \mid i \in I\}$ familija $\{x \in L \mid avx \geq b\}$. Važi da je:

$av \bigwedge_{i \in I} x_i = \bigwedge_{i \in I} (avx_i) \geq b$, pa i $\bigwedge_{i \in I} x_i$ pripada toj familiji, pa je i njen najmanji elemenat.

Obratno, neka je $\{x_j \mid j \in J\}$ proizvoljna familija elemenata iz L , i neka je $\bigwedge_{j \in J} (avx_j) = b$. Sada $b \in [a)$, pa familija $\{x \in L \mid avx \geq b\}$ ima najmanji elemenat. Neka je to x_m . Za svako $j \in J$ važi da je $avx_j \geq b$, pa svako x_j , $j \in J$ pripada familiji $\{x \in L \mid avx \geq b\}$, i $x_j \geq x_m$. Sledi da je $\bigwedge_{j \in J} x_j \geq x_m$, a pošto $avx_m \geq b$, važi sledeće:

$$av \bigwedge_{j \in J} x_j \geq avx_m \geq \bigwedge_{j \in J} (avx_j).$$

$$av \bigwedge_{j \in J} x_j \leq \bigwedge_{j \in J} (avx_j) \text{ važi uvek, u svakoj mreži, pa sledi da}$$

je a beskonačno distributivan elemenat. ■

Sledeće tvrđenje karakteriše beskonačno-distributivan elemenat preko klasa kongruencije θ_a .

Tvrđenje 1.9 Elemenat a mreže L je beskonačno distributivan ako i samo ako je modularan i za svako $b \in [a)$, familija $\{x \in L \mid avx = b\}$ ima najmanji elemenat.

Dokaz.

Ako je a beskonačno distributivan elemenat on je očito i modularan. Neka je $\{x_i \mid i \in I\}$ familija $\{x \in L \mid avx = b\}$. Sada je $av \bigwedge_{i \in I} x_i = \bigwedge_{i \in I} (avx_i) = b$, pa je $\bigwedge_{i \in I} x_i$ najmanji elemenat te familije.

Obratno, neka je $\{x_j \mid j \in J\}$ proizvoljna familija elemenata iz J . Neka je $\bigwedge_{j \in J} (avx_j) = b$. Pošto $b \in [a)$ familija $\{x \in L \mid avx = b\}$ ima najmanji elemenat x_m . Koristeći da je a modularan elemenat, dobija se:

$$\bigwedge_{j \in J} (av(x_j \wedge b)) = \bigwedge_{j \in J} ((avx_j) \wedge b) = (\bigwedge_{j \in J} (avx_j)) \wedge b = b,$$

pa je, za svako $j \in J$, $av(x_j \wedge b) \geq b$, a pošto je $x_j \wedge b \leq b$, i $a \leq b$, sledi:

$$av(x_j \wedge b) = b, \text{ odnosno } x_j \wedge b \text{ pripada familiji } \{x \in L \mid avx = b\} \text{ za}$$

svako j . Sledi da je $x \leq x_j$ za svako $j \in J$, i $x \leq \bigwedge_{j \in J} x_j$, odakle sledi:

$$\bigwedge_{j \in J} (avx_j) = b = avx \leq av \bigwedge_{j \in J} x_j.$$

Pošto $\bigwedge_{j \in J} (avx_j) \geq av \bigwedge_{j \in J} x_j$ važi u svakoj mreži, sledi da je elemenat a beskonačno distributivan. ■

1.6 KARAKTERIZACIJA NEPREKIDNIH ELEMENATA MREŽE [117]

U sledećem delu pokazana su neka osnovna svojstva neprekidnih elemenata mreže i karakterizacija beskonačno distributivnih elemenata preko neprekidnih elemenata.

Lema 1.9 Neka je L kompletna mreža.

a) Skup svih \wedge -neprekidnih elemenata mreže L je zatvoren u odnosu na infimume.

b) Skup svih \vee -neprekidnih elemenata mreže L je zatvoren u odnosu na supremume.

c) Skup svih neprekidnih elemenata mreže L je neprekidna podmreža mreže L .

Dokaz. a) Neka su a i b \wedge -neprekidni elementi mreže L , i $\{x_i | i \in I\} \subseteq L$ proizvoljan lanac. Tada je:


$$a \wedge b \wedge \bigvee_{i \in I} x_i = a \wedge \bigvee_{i \in I} (b \wedge x_i) = \bigvee_{i \in I} (a \wedge b \wedge x_i),$$

jer su a i b neprekidni elementi, a ako je $\{x_i | i \in I\}$ lanac, tada je i $\{b \wedge x_i | i \in I\}$ takode lanac.

Tvrđenje pod b) je dualno tvrđenju pod a), a c) sledi direktno iz a) i b). ■

U sledećem primeru vidi se da infimum \vee -neprekidnih elemenata ne mora biti \vee -neprekidan elemenat (tj. skup \vee -neprekidnih elemenata ne mora biti zatvoren u odnosu na infimume): Takode, skup \wedge -neprekidnih elemenata ne mora biti zatvoren u odnosu na supremume.

Primer 1.2



slika 1.2

U mreži L b i c su v -neprekidni elementi, jer je $b \vee \bigwedge x_i = b \vee i = f = \bigwedge (b \vee x_i)$, a za svaki konačni niz, i svaki podniz niza $\{x_i | i \in I\}$, to svakako važi. Slično je i za elementat c. Elementat a koji je infimum ta dva elementa nije v -neprekidan, jer: $a \vee \bigwedge x_i = a \vee i = h \neq g = \bigwedge (a \vee x_i)$.

Lema 1.10 U kompletnoj, kokompaktno generisanoj mreži svaki elementat je v -neprekidan.

Dokaz. Neka je L kompletna, kokompaktno generisana mreža, a proizvoljan elementat iz L i $\{x_i | i \in I\}$ lanac u L . Nejednakost $a \vee \bigwedge_{i \in I} x_i \leq \bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i)$ uvek je ispunjena, pa je dovoljno dokazati $a \vee \bigwedge_{i \in I} x_i \geq \bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i)$.

Neka je c kokompaktan elementat za koji važi $c \geq a \vee \bigwedge_{i \in I} x_i$. Iz toga sledi da je $c \geq a$ i $c \geq \bigwedge_{i \in I} x_i$. Iz kokompaktnosti elementa c i toga da je $c \geq \bigwedge_{i \in I} x_i$ sledi da je $c \geq \bigwedge_{i \in J} x_i$ za konačan podskup J od I. Pošto je $\{x_i | i \in J\}$ lanac, $\bigwedge_{i \in J} x_i = x_d$, za $x_d \in \{x_i | i \in J\} \subseteq \{x_i | i \in I\}$, odakle sledi da je $c \geq a \vee x_d \geq \bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i)$.

Dobijeno je da je svaki kokompaktni elementat koji je veći od $a \vee \bigwedge_{i \in I} x_i$ veći i od $\bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i)$, takode. Sledi da je $a \vee \bigwedge_{i \in I} x_i$ koji je infimum kokompaktnih elementata, pa prema tome i infimum svih kokompaktnih elementata većih od njega, veći od $\bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i)$, odnosno, $a \vee \bigwedge_{i \in I} x_i \geq \bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i)$, što je i trebalo dokazati. ■

Lema 1.11 Svaki beskonačno distributivni elementat je v -nepreki-

dan.

Dokaz. Sledi direktno iz definicije. ■

Lema 1.12 Neka je a v -neprekidan element (kompletne) mreže L i za $S \subseteq L$ neka je \mathcal{F} familija svih konačnih podskupova od S . Tada je $a \wedge S = \bigwedge_{F \in \mathcal{F}} a \wedge F$.

Dokaz. Uočimo prvo da, ako je $S = \{x_\alpha \mid \alpha < \lambda\}$, gde je λ beskonačan kardinal i, za $\alpha < \lambda$, $S_\alpha = \{x_\beta \mid \beta < \alpha\}$, onda $\wedge S = \bigwedge_{\alpha < \lambda} (\wedge S_\alpha)$. Inkluzija \leq je očigledna. S druge strane, za svako $\beta < \lambda$, $a \wedge S_{\beta+1} \geq \bigwedge_{\alpha < \beta} (\wedge S_\alpha)$, pa je i $\wedge S \geq \bigwedge_{\alpha < \lambda} (\wedge S_\alpha)$.

Tvrđenje očito važi ako je S konačan skup.

Dokazuje se indukcijom po kardinalnosti od S .

Ako je $S = \{x_n \mid n \in \omega\}$, prema prethodnom, važi:

$$\begin{aligned} a \wedge S &= a \wedge \bigwedge_{n \in \omega} (\wedge S_n) = \bigwedge_{n \in \omega} (a \wedge S_n) = (\text{s obzirom da su } S_n, n \in \omega, \text{ konačni} \\ &\text{skupovi}) = \bigwedge_{n \in \omega} \left(\bigwedge_{F \in \mathcal{F}_n} (a \wedge F) \right) \text{ (gde je } \mathcal{F}_n \text{ skup konačnih podskupova od } S_n) \\ &= \bigwedge_{F \in \mathcal{F}} (a \wedge F). \end{aligned}$$

Pretpostavimo, dalje, da je tvrđenje tačno za sve skupove kardinalnosti manje od λ ($> \aleph_0$) i neka je $S = \{x_\alpha \mid \alpha < \lambda\}$, $S_\alpha = \{x_\beta \mid \beta < \alpha\}$. Tada je prema induktivnoj pretpostavci i ranijoj napomeni:

$$a \wedge S = a \wedge \bigwedge_{\alpha < \lambda} (\wedge S_\alpha) = \bigwedge_{\alpha < \lambda} (a \wedge S_\alpha) = \bigwedge_{\alpha < \lambda} \left(\bigwedge_{X \in \mathcal{F}_\alpha} (a \wedge X) \right) = \bigwedge_{X \in \mathcal{F}} (a \wedge X), \text{ gde je } \mathcal{F}_\alpha \text{ skup svih konačnih podskupova od } S_\alpha. \quad \blacksquare$$

Očigledno je da važe i tvrđenja dualna tvrđenjima iz Lema 1.10, 1.11 i 1.12.

U Primeru 1.1 element a nije v -neprekidan, pa zato nije ni beskonačno distributivan.

Tvrđenje 1.10 a je v -neprekidan i distributivan element kompletne mreže L ako i samo ako je a beskonačno distributivan element.

Dokaz. (\leftarrow) Sledi direktno iz Leme 1.11.

(\longrightarrow) Neka je a v -neprekidan i distributivan element mreže L i neka je $\{x_i \mid i \in I\}$ proizvoljna familija elemenata iz L . Tada je (koristeći Lemu 1.12),

$$av \wedge_{i \in I} x_i = \bigwedge_{F \in \mathcal{F}} av \wedge F,$$
 gde je \mathcal{F} familija svih konačnih podskupova od $\{x_i \mid i \in I\}$.

Iz distributivnosti elementa a sledi:

$$av \wedge F = \bigwedge_{x_j \in F} avx_j, \text{ za svako } F \in \mathcal{F}, \text{ odakle sledi:}$$

$$\bigwedge_{F \in \mathcal{F}} av \wedge F = \bigwedge_{F \in \mathcal{F}} \bigwedge_{x_j \in F} avx_j = \bigwedge_{i \in I} (avx_i). \quad \blacksquare$$

1.7 O IZOMORFIZMIMA NEKIH INTERVALA U MREŽI [77]

Kod modularnih mreža poznato je sledeće tvrđenje:

Tvrđenje 1.11. Ako su a i b elementi modularne mreže, tada je $[a, avb] \cong [a \wedge b, b]$ u odnosu na izomorfizam $f: x \rightarrow x \wedge b$. \blacksquare

U radu [75], dokazano je tvrđenje koje navodimo u nastavku. Iz njega se mogu izvesti neka svojstva izomorfni modularnih mreža, kao i izvesne algebarske posledice.

Tvrđenje 1.12 [75] Neka je L modularna mreža i neka su a, a', b, b' i d elementi mreže koji zadovoljavaju sledeće uslove:

1. $a' \leq a$ i $b' \leq b$;
2. $a \leq a' \vee d$; $b \leq b' \vee d$;
3. $a \wedge d = b \wedge d$.

Tada je interval $[a, a' \vee d]$ projektivno izomorfan sa intervalom $[b, b' \vee d]$. \blacksquare

Uvođenjem specijalnih elemenata, umesto zahteva da mreža bude modularna, dobijaju se lokalna svojstva sličnog tipa.

Lema 1.13 Ako je a standardan element mreže L i $b \in L$, tada je

$[a \wedge b, b] \cong [a, a \vee b]$ u odnosu na izomorfizam $f: x \rightarrow x \vee a$. ■

Dokaz. Preslikavanje f zaista preslikava interval $[a \wedge b, b]$ u interval $[a, a \vee b]$. Prema Lemi 1.2 a je distributivan i skrativ element. Iz distributivnosti elementa a sledi da je f homomorfizam. Neka je $f(x) = f(y)$, odnosno $x \vee a = y \vee a$. Za x i y iz intervala $[a \wedge b, b]$ važi da je $x \wedge a = y \wedge a$ (jer je $x \leq b$, pa $x \wedge a \leq b \wedge a$, a kako je $b \wedge a \leq x$, to je $x \wedge a = b \wedge a$ za svako x iz tog intervala). Sada iz skrativosti elementa a sledi da je $x = y$, odnosno, preslikavanje f je injekcija. Preslikavanje f je i surjektivno, jer za svaki element y iz intervala $[a, a \vee b]$ važi da se element $b \wedge y$ preslikava u njega. Zaista, $(b \wedge y) \vee a = (b \vee a) \wedge (y \vee a) = (b \vee a) \wedge y = y$. ■

Lema 1.13'. Ako je b kostandardan element mreže L i $b \in L$ tada je $[a, a \vee b] \cong [a \wedge b, b]$ u odnosu na izomorfizam $f: x \rightarrow x \wedge b$. ■

Dokaz. Dokazuje se slično kao u prethodnoj lemi. ■

Lema 1.13". Ako je a modularan i skrativ element mreže L i $b \in L$, tada je $[a \wedge b, b] \cong [a, a \vee b]$ u odnosu na izomorfizam $f: x \rightarrow x \vee a$.

Dokaz. f je injektivno i surjektivno preslikavanje, što se pokazuje slično kao u Lemi 1.13. Neka $x, y \in [a \wedge b, b]$. Tada je:

$$(x \vee a) \wedge (y \vee a) = a \vee ((x \vee a) \wedge y) = a \vee ((y \vee a) \wedge x).$$

Kako je $a \wedge ((x \vee a) \wedge y) = a \wedge ((y \vee a) \wedge x)$, jer je $a \wedge x = a \wedge y$,

i a je skrativ element, važi da je $(x \vee a) \wedge y = (y \vee a) \wedge x$.

Kako je $(x \vee a) \wedge y \wedge (y \vee a) \wedge x = x \wedge y$, to je

$$(x \vee a) \wedge y = (y \vee a) \wedge x = x \wedge y, \text{ pa je}$$

$$(x \vee a) \wedge (y \vee a) = a \vee (x \wedge y).$$

Znači, f je izomorfizam.

Tvrđenje 1.13. Neka su a, a', b, b' proizvoljni elementi mreže L i d kostandardan element mreže L tako da važe sledeći uslovi:

1. $a' \leq a$ i $b' \leq b$;
2. $a \leq a' \vee d$; $b \leq b' \vee d$;

$$3. \quad a \wedge d = b \wedge d.$$

Tada je interval $[a, a' \vee d]$ projektivno izomorfan sa intervalom $[b, b' \vee d]$. ■

Dokaz. Prema Lemi 1.13' važi da je $[a, a \vee d] \cong [a \wedge d, d]$ u odnosu na izomorfizam $f: x \rightarrow x \wedge d$, kao i $[b, b \vee d] \cong [b \wedge d, d]$ u odnosu na izomorfizam $f: x \rightarrow x \wedge d$. Iz uslova 3 sledi da je $[a \wedge d, d] = [b \wedge d, d]$, pa je $[a, a \vee d] \cong [b, b \vee d]$. Iz uslova 1 i 2 sledi da je $a' \vee d = a \vee d$ i $b' \vee d = b \vee d$, odakle sledi da je $[a, a' \vee d] \cong [b, b' \vee d]$, što je i trebalo pokazati. ■

Važi i dualno tvrđenje.

Tvrđenje 1.14 Neka su a, a', b, b' proizvoljni elementi mreže L i d standardan element mreže L tako da važe sledeći uslovi:

1. $a \leq a'$ i $b \leq b'$;
2. $a \geq a' \wedge d$; $b \geq b' \wedge d$;
3. $a \vee d = b \vee d$.

Tada je interval $[a' \wedge d, a]$ projektivno izomorfan sa intervalom $[b' \wedge d, b]$. ■

Gornja tvrđenja biće primenjena u razmatranju mreža slabih kongruencija u III poglavlju.

1.8 O IZOMORFIZMIMA IDEALA I FILTERA GENERISANIH SPECIJANIM ELEMENTIMA

Sledeća mrežna tvrđenja će se koristiti u dokazima tvrđenja koja karakterišu svojstva mreže slabih kongruencija nekih specijalnih klasa algebri. U mreži slabih kongruencija Δ (dijagonalna relacija) ima istaknutu ulogu, i mnoga svojstva algebri su u vezi sa položajem dijagonale u mreži slabih kongruencija. Δ je uvek kodistributivan

element u toj mreži, i zato pretpostavljamo da je u sledećim tvrdenjima a kodistributivan element, i to takav da klase kongruencije indukovane sa m_a imaju najveće elemente (razlozi za ovaj uslov su takode algebarski, jer to važi u mreži slabih kongruencija proizvoljne algebre - ti najveći elementi su kvadrati podalgebri). Neka je skup tih najvećih elemenata označen sa M_a , i za svako $x \in L$ neka je \bar{x} element iz M_a takav da je $m_a(x) = m_a(\bar{x})$.

Tvrđenje 1.15 Sledeća tvrđenja su ekvivalentna:

(1) a je izuzetan;

(2) (i) za svako $x \in [a]$ važi da je $[x, \bar{x}] \cong [a, \bar{x}va]$ u odnosu na $n_a : y \rightarrow yva$;

(ii) preslikavanje $f_a : x \rightarrow \bar{x}va$ je homomorfizam iz $[a]$ u $[a]$.

Napomena 1.1 $[x, y]$ je oznaka za interval, tj. $[x, y] = \{z \mid x \leq z \leq y\}$.

Dokaz. (1) \rightarrow (2)

Neka je a izuzetan element (distributivan, kodistributivan, komodularan i skup najvećih elemenata u klasama indukovanim sa m_a (M_a) je podmreža od L). Preslikavanje n_a zaista preslikava interval $[x, \bar{x}]$ u interval $[a, \bar{x}va]$, jer je $n_a(\bar{x}) = \bar{x}va$ i $n_a(x) = a$, a n_a je očito izotono preslikavanje. n_a je injekcija, jer za dva elementa $y, z \in [x, \bar{x}]$ važi da je $y \wedge a = z \wedge a$, pa ako je $yva = zva$, iz komodularnosti elementa a i Tvrđenja 1.5 sledi da je $y = z$. Dalje se pokazuje da je n_a surjektivno preslikavanje. Neka $y \in [a, \bar{x}va]$. Iz $a \leq y \leq \bar{x}va$ sledi da je

$$x = a \wedge \bar{x} \leq y \wedge \bar{x} \leq (\bar{x}va) \wedge \bar{x} = \bar{x}.$$

$y \wedge \bar{x}$ je element koji se preslikava na y u odnosu na preslikavanje n_a .

Zaista, iz distributivnosti elementa a sledi:

$$(y \wedge \bar{x})va = (yva) \wedge (\bar{x}va) = y \wedge (\bar{x}va) = y.$$

Preslikavanje n_a je izomorfizam, jer:

$$n_a(x \wedge y) = (x \wedge y)va = (xva) \wedge (yva) = n_a(x) \wedge n_a(y), \text{ i}$$

$$n_a(x \vee y) = (x \vee y)va = (xva) \vee (yva) = n_a(x) \vee n_a(y).$$

Uslov (ii) takode važi jer je M_a podmreža, odnosno, $\overline{x\lambda y} = \overline{x\lambda y}$ (jer je $\overline{x\lambda a} = x\lambda a$ i $\overline{y\lambda a} = y\lambda a$, pa je $x\lambda y\lambda a = \overline{x\lambda y}\lambda a$, pa $x\lambda y$ pripada istoj klasi u odnosu na m_a kao i $\overline{x\lambda y}$, i pošto je to maksimalni element neke klase, tražena jednakost važi) i $\overline{x\nu y} = \overline{x\nu y}$ (slično kao u dokazu prethodne jednakosti, pri čemu se koristi još i kodistributivnost elementa a), pa je:

$$f_a(x\lambda y) = \overline{x\lambda y}va = (\overline{x\lambda y})va = (\overline{x}va)\wedge(\overline{y}va) = f_a(x)\wedge f_a(y), \text{ i}$$

$$f_a(x\nu y) = \overline{x\nu y}va = (\overline{x\nu y})va = (\overline{x}va)\vee(\overline{y}va) = f_a(x)\vee f_a(y).$$

$$(2) \rightarrow (1)$$

a je po pretpostavci kodistributivan element i postoje najveći elementi u klasama ekvivalencije indukovanim preslikavanjem m_a . Prvo se pokazuje komodularnost elementa a .

Neka za elemente $x, y \in L$ važi:

$x\lambda a = y\lambda a$ i $x\nu a = y\nu a$. Iz $x\lambda a = y\lambda a$ sledi da x i y pripadaju istoj klasi kongruencije indukovane sa m_a , odnosno postoji $z \in (a)$, takav da $x, y \in [z, \overline{z}]$. Iz uslova da je n_a izomorfizam intervala $[z, \overline{z}]$ i $[a, \overline{z}va]$ sledi da iz $x\nu a = y\nu a$ sledi $x = y$.

Dalje se pokazuje da je M_a podmreža. Pošto je f_a homomorfizam, sledi da je:

$$\overline{x\lambda y}va = (\overline{x}va)\wedge(\overline{y}va) \text{ i } \overline{x\nu y}va = (\overline{x}va)\vee(\overline{y}va).$$

Uvek je ispunjeno: $\overline{x\lambda y} \geq \overline{x\lambda y}$ (jer je $x \geq x\lambda y$ i $y \geq x\lambda y$, pa je $\overline{x} \geq \overline{x\lambda y}$ i $\overline{y} \geq \overline{x\lambda y}$). Pošto $\overline{x\lambda y}$ pripada istoj klasi kongruencije indukovanoj sa m_a kao i $x\lambda y$, a $\overline{x\lambda y}$ veći je od najvećeg elementa te klase, sledi da mora važiti: $\overline{x\lambda y} = \overline{x\lambda y}$. Dalje je:

$$(\overline{x\nu y})va = (\overline{x}va)\vee(\overline{y}va) = (\overline{x\nu y})va, \text{ i}$$

$$(\overline{x\nu y})\lambda a = (x\nu y)\lambda a = (x\lambda a)\vee(y\lambda a) = (\overline{x\lambda a})\vee(\overline{y\lambda a}) = (\overline{x\nu y})\lambda a, \text{ jer je } a$$

kodistributivan element, pa primenom dokazane komodularnosti, sledi da je $(\overline{x\nu y}) = (\overline{x\nu y})$.

(f_a je, po pretpostavci homomorfizam iz (a) u $[a]$). Medutim, pošto je $\overline{x} = \overline{t}$, ako $t \in (a)$ i $x\lambda a = t\lambda a$, i $\overline{y} = \overline{u}$, za $u \in (a)$ i $y\lambda a = u\lambda a$, pa važi i:

$\overline{x\lambda y}va = (\overline{xva})\wedge(\overline{yva})$ i $\overline{xv\lambda y}va = (\overline{xva})\vee(\overline{yva})$. Ovo se koristi i u dokazu za distributivnost elementa- (*).

Još treba pokazati distributivnost elementa a. Neka $x, y \in L$. Tada $(xva)\wedge(yva) \in [a]$. Iz $a \leq xva \leq \overline{xva}$ i $a \leq yva \leq \overline{yva}$ sledi: $a \leq (xva)\wedge(yva) \leq (\overline{xva})\wedge(\overline{yva}) = (\overline{x\lambda y})va$ (jer je f_a homomorfizam i vredi razmatranje (*)). Po pretpostavci n_a je preslikavanje iz $[t\lambda u, \overline{x\lambda y}]$ (gde je $t\lambda a = x\lambda a$ i $t \in [a]$ i $u\lambda a = y\lambda a$ i $u \in [a]$) na $[a, \overline{x\lambda y}va]$, pa postoji element $p \in [t\lambda u, \overline{x\lambda y}]$, takav da je $pva = (xva)\wedge(yva)$. Element $x\lambda y$ takode pripada istoj klasi $[t\lambda u, \overline{x\lambda y}]$, pa pošto je n_a izomorfizam, važi sledeće:

$$(x\lambda y\lambda p)va = ((x\lambda y)va)\wedge(pva) = ((x\lambda y)va)\wedge(xva)\wedge(yva) = (x\lambda y)va.$$

Iz komodularnosti sledi da je $x\lambda y\lambda p = x\lambda y$, odakle, $x\lambda y \leq p$.

Dalje, iz $pva = (xva)\wedge(yva)$ sledi da je $pva \leq xva$. Takode je i $p\lambda a \leq x\lambda a$ (jer je $p\lambda a = \overline{x\lambda y\lambda a} \leq \overline{x\lambda a} = x\lambda a$). Sledi da je:

$$(pvx)va = (pva)\vee(xva) = xva, \text{ i}$$

$(pvx)\lambda a = (p\lambda a)\vee(x\lambda a) = x\lambda a$, odakle je, primenom komodularnosti, $x = pvx$, odnosno, $p \leq x$. Na isti način dokazuje se da je $p \leq y$, pa je $p \leq x\lambda y$, odnosno, $p = x\lambda y$, pa važi da je $(xva)\wedge(yva) = (x\lambda y)va$. ■

Lema 1.15 Ako je

(i) $[a] \cong [a]$ u odnosu na $f_a : x \rightarrow \overline{xva}$ ($x \in [a]$), i

(ii) iz $x\lambda a = y\lambda a$ i $xva = yva$ implicira $x = y$ (za x i y iz L),

tada je za $x \in [a]$,

$$[x, \overline{x}] \cong [a, \overline{xva}] \text{ u odnosu na } n_a : y \rightarrow yva \text{ (} y \in [x, \overline{x}]).$$

Dokaz.

Ako y i z pripadaju $[x, \overline{x}]$ tada je $y\lambda a = z\lambda a$. Ako je $yva = zva$, tada iz (ii) sledi da je $y = z$, odnosno preslikavanje n_a je injektivno. Neka je y proizvoljan element iz $[a, \overline{xva}]$. Pošto $y \in [a]$, a prema (i) f_a je izomorfizam, sledi da postoji $z \in [a]$, takvo da je $y = \overline{zva}$. \overline{zvx} pripada intervalu $[x, \overline{x}]$, jer je $\overline{zvx} \geq x$ i $\overline{zvx} \leq \overline{x}$ (zbog $x \leq \overline{x}$ i $\overline{z} \leq \overline{x}$). Naime, iz

$y \in [a, \bar{x}va]$, sledi da je $y = \bar{z}va \leq \bar{x}va$, a pošto je f_a izomorfizam, sledi da je $z \leq x$. Iz $z \leq x$ i kodistributivnosti sledi $\bar{z} \leq \bar{x}$. Pošto je $\bar{n}_a(\bar{z}vx) = y$, preslikavanje je surjektivno.

Neka $u, v \in [x, \bar{x}]$. Iz $u \leq v$ sledi da je $n_a(u) \leq n_a(v)$. Pretpostavimo da je $n_a(u) \leq n_a(v)$, tj. $uva \leq vva$. Sada je $(uvv)va = (uva)v(vva) = vva$. Iz kodistributivnosti elementa a sledi da je $(uvv) \wedge a = (u \wedge a)v(v \wedge a) = v \wedge a$ (jer u i v pripadaju istoj klasi od m_a), odakle iz uslova (ii) sledi $uvv = v$, odnosno $u \leq v$. Sledi da je n_a izomorfizam. ■

Tvrđenje 1.16 Tvrđenja (1) i (2) su ekvivalentna:

- (1) a) $[a] \cong [a]$ u odnosu na $f_a: x \rightarrow \bar{x}va$ (za $x \in [a]$);
 b) iz $x \wedge a = y \wedge a$ i $xva = yva$ sledi $x = y$;

(2) a je izuzetan i beskonačno distributivan element od L i skup svih minimalnih elemenata klasa kongruencije određenih sa $n_a: x \rightarrow \bar{x}va$ je M_a .

Dokaz. (1) \rightarrow (2)

Iz uslova a) i b), prema Lemi 1.15, sledi uslov (2)(i) Tvrđenja 1.15. Uslov (1)a) jači je od uslova (2)(ii) Tvrđenja 1.15, pa prema tom tvrđenju sledi da je a izuzetan.

Neka je b proizvoljan element iz $[a]$. Prema (1)a) postoji $z \in [a]$ takav da je $b = \bar{z}va$. Pokazaće se da je \bar{z} najmanji element odgovarajuće klase kongruencije definisane sa n_a . Pretpostavimo da je $y \leq \bar{z}$ za neko y za koje je $yva = \bar{z}va$. Sada je $\bar{z}va = yva \leq \bar{y}va \leq \bar{z}va$, pa je $\bar{y}va = \bar{z}va$. Ako je sada $u = y \wedge a$, onda je $\bar{u} = \bar{y}$, pa iz $\bar{u}va = \bar{z}va$ sledi na osnovu (1)a) da je $u = z$. Odatle $y \wedge a = \bar{z} \wedge a$ i $yva = \bar{z}va$, pa prema b), sledi da je $y = \bar{z}$. Tako je \bar{z} minimalan element odgovarajuće klase u odnosu na n_a i kako je ta klasa podmreža u L , \bar{z} je njen najmanji element. Na osnovu Tvrđenja 1.9 i 1.15 a je beskonačno distributivan, a skup najmanjih elemenata je upravo M_a .

(2) \rightarrow (1)

Prema Tvrdenju 1.9 klase kongruencije indukovane sa n_a imaju najmanje elemente, a po pretpostavci skup tih elemenata poklapa se sa M_a . Odatle sledi da je $M_a \cong [a]$ u odnosu na $\bar{x} \rightarrow \bar{x}va$. $[a] \cong M_a$ u odnosu na $x \rightarrow \bar{x}$, što sledi iz činjenice da je a izuzetan. Sledi da je preslikavanje f_a izomorfizam između $[a]$ i $[a]$, kao kompozicija dva izomorfizma. Uslov b) sledi direktno iz neutralnosti elementa a . ■

1.9 O MREŽNIM IDENTITETIMA, ZAKONIMA

Specijalni elementi mreže (distributivni, kodistributivni, neutralni, i sl.), u vezi sa odgovarajućim homomorfizmima n_a i m_a indukuju relacije kongruencije (Leme 1.1, 1.1', 1.2, 1.3, 1.8 i 1.15). Sledećih nekoliko tvrdjenja razmatraju problem: ako mrežni identitet važi na faktor skupu u odnosu na te kongruencije, pod kojim uslovima on važi na celoj mreži. Iz tih tvrdjenja slede značajne algebarske posledice u vezi sa identitetima na mreži slabih kongruencija algebre (poglavlje III).

U sledećim tvrdjenjima pod proizvoljnim mrežnim termom će se podrazumevati term na jeziku mreže (sa dve binarne operacije). (Videti, na primer, [7]).

Lema 1.16 Ako je a distributivan element mreže L i $f(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljan mrežni term, za sve $x_1, \dots, x_n \in L$,

$$f(x_1, \dots, x_n)va = f(x_1va, \dots, x_nva).$$

Dokaz.

Sledi indukcijom po broju operacijskih simbola (k).

Za $k=0$, $f(x)=x$, pa je $f(xva)=f(x)va$. Za $k=1$, $f(x,y)=x\lambda y$ ili $f(x,y)=xvy$. U prvom slučaju, $f(x,y)va = (x\lambda y)va = (xva)\wedge(yva) = f(xva,yva)$. U drugom slučaju, $f(x,y)va = (xvy)va = (xva)v(yva) =$

$f(x_1, \dots, x_n)$. Pretpostavimo da tvrđenje važi za sve terme sa manje od k operacijskih simbola, i neka f ima k operacijskih simbola. Tada je $f(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1, \dots, x_n) \vee f_2(x_1, \dots, x_n)$, ili $f(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1, \dots, x_n) \wedge f_2(x_1, \dots, x_n)$, gde su f_1 i f_2 termi sa manje od k operacijskih simbola, pa za njih važi indukcijska pretpostavka. Tako je:

$$f(x_1, \dots, x_n) \vee a = (f_1(x_1, \dots, x_n) \vee a) \vee (f_2(x_1, \dots, x_n) \vee a) = f_1(x_1 \vee a, \dots, x_n \vee a) \vee f_2(x_1 \vee a, \dots, x_n \vee a) = f(x_1 \vee a, \dots, x_n \vee a),$$

$$f(x_1, \dots, x_n) \wedge a = (f_1(x_1, \dots, x_n) \wedge a) \wedge (f_2(x_1, \dots, x_n) \wedge a) = (f_1(x_1, \dots, x_n) \wedge a) \wedge (f_2(x_1, \dots, x_n) \wedge a) = f_1(x_1 \wedge a, \dots, x_n \wedge a) \wedge f_2(x_1 \wedge a, \dots, x_n \wedge a) = f(x_1 \wedge a, \dots, x_n \wedge a).$$

Važi i dualno tvrđenje:

Lema 1.16'. Ako je a kodistributivan element mreže L i $f(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljan mrežni term, za sve $x_1, \dots, x_n \in L$,

$$f(x_1, \dots, x_n) \wedge a = f(x_1 \wedge a, \dots, x_n \wedge a).$$

Sledeće tvrđenje govori o prenošenju proizvoljnog mrežnog zakona sa $[a]$ i $[a]$ na celu mrežu L ($a \in L$).

Tvrđenje 1.17. Ako je a neutralan element mreže L tada proizvoljni mrežni identitet važi na L ako i samo ako važi na filtru $[a]$ i idealu $[a]$.

Dokaz. (\rightarrow)

Očigledno.

(\leftarrow)

Neka identitet $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ važi na $[a]$ i na $[a]$.

Tada za $y_1, \dots, y_n \in L$:

$$f(y_1 \wedge a, \dots, y_n \wedge a) = g(y_1 \wedge a, \dots, y_n \wedge a), \text{ jer } y_i \wedge a \in [a], \text{ i}$$

$$f(y_1 \vee a, \dots, y_n \vee a) = g(y_1 \vee a, \dots, y_n \vee a), \text{ jer } y_i \vee a \in [a].$$

Prema Lemama 1.16 i 1.16' sledi da je:

$$f(y_1, \dots, y_n) \wedge a = g(y_1, \dots, y_n) \wedge a, \text{ i}$$


$f(y_1, \dots, y_n)va = g(y_1, \dots, y_n)va$, pa iz Leme 1.3 i neutralnosti elementa a sledi da je:

$$f(y_1, \dots, y_n) = g(y_1, \dots, y_n). \quad \blacksquare$$

Obratna implikacija u opštem slučaju ne važi. Naime, postoje mreže u kojima postoji elemenat a takav da je ispunjen uslov da mrežni zakon važi na mreži ako i samo ako važi na idealu (a) i filtru $[a]$, a elemenat a nije neutralan, pa čak ne mora biti ni distributivan, ni kodistributivan, niti zadovoljavati svojstvo skraćivanja. Jedna takva mreža opisana je u sledećem primeru:

Primer 1.3

Data je mreža L , i $a \in L$, takva da su (a) i $[a]$ izomorfne slobodnoj mreži sa tri generatora $FL(3)$. To je moguće, pošto slobodna mreža sa tri generatora ima najmanji i najveći elemenat. Mreža $FL(3)$ sadrži kao podmreže proizvoljne slobodne mreže $FL(n)$, pa i slobodnu mrežu sa prebrojivo mnogo generatora ([18]). Na mreži $FL(3)$ ne važi ni jedan mrežni zakon koji se ne može izvesti iz aksioma mreže. Znači, svi zakoni koji važi na (a) i na $[a]$ važe na proizvoljnoj mreži. Neka mreža L ima podmreže kao na slici 1.3. Očigledno je da tada elemenat a nije ni distributivan, ni kodistributivan, ni komodularan, a važi uslov da se proizvoljni mrežni zakon prenosi sa (a) i $[a]$ na mrežu L .



Slika 1.3

Medutim, ako je data mreža L , i elemenat $a \in L$ se posmatra kao

konstanta u jeziku, odnosno posmatra se algebra (L, \wedge, \vee, a) , tada važi i obratno tvrđenje:

Tvrđenje 1.18 Ako proizvoljan identitet važi na mreži (L, \wedge, \vee, a) ako i samo ako on važi na filtru $[a]$ i na idealu $(a]$, tada je element a neutralan.

Dokaz. Na filtru $[a]$ važi:

$$a \wedge (x \vee y) = a = a \wedge a = (a \wedge x) \vee (a \wedge y);$$

$$a \vee (x \wedge y) = x \wedge y = (a \vee x) \wedge (a \vee y);$$

$$\text{iz } a \wedge x = a \wedge y \text{ i } x = a \vee x = a \vee y = y, \text{ sledi } x = y.$$

Iz Tvrđenja 1.5 svojstvo skraćivanja je, uz kodistributivnost elementa a , što je ispunjeno, ekvivalentan sa identitetom:

$$x \vee (a \wedge y) = (x \vee a) \wedge (x \vee y), \text{ pa i ovaj identitet važi.}$$

Na idealu $(a]$ važi:

$$a \wedge (x \vee y) = x \vee y = (a \wedge x) \vee (a \wedge y);$$

$$a \vee (x \wedge y) = a = a \vee a = (a \vee x) \wedge (a \vee y);$$

$$\text{iz } x = a \wedge x = a \wedge y = y \text{ i } a \vee x = a \vee y, \text{ sledi } x = y, \text{ pa važi i}$$

$$\text{identitet: } x \vee (a \wedge y) = (x \vee a) \wedge (x \vee y).$$

Po uslovu tvrđenja, svi identiteti se prenose sa filtra $[a]$ i ideala $(a]$ na celu mrežu, pa za svako $x, y \in L$ važi da je:

$$a \wedge (x \vee y) = (a \wedge x) \vee (a \wedge y);$$

$$a \vee (x \wedge y) = (a \vee x) \wedge (a \vee y) \text{ i}$$

$$x \vee (a \wedge y) = (x \vee a) \wedge (x \vee y), \text{ odnosno, element } a \text{ je neutralan.} \quad \blacksquare$$

Leme 1.16, 1.16' i Tvrđenje 1.17 ne važe u opštem slučaju u kompletnoj mreži ako za operacije smatramo proizvoljne infimume i supremume ($\wedge S$ i $\vee S$, za proizvoljni skup $S \subseteq L$). Za mrežu L u Primeru 1.1 Tvrđenje 1.17 ne važi (ako uzimamo u obzir i proizvoljne infimume i supremume), jer su $[a]$ i $(a]$ kompletno-distributivne mreže (jer je svaki lanac kompletno distributivna mreža), a mreža L nije čak ni beskonačno distributivna, pa ni kompletno distributivna.

U sledećem delu daće se proširenje tih tvrđenja i za slučaj sa beskonačnomesnim operacijama.

Lema 1.17 Ako je a beskonačno kodistributivan element mreže L i $f(x_1, x_2, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljan mrežni izraz¹ (koji može da sadrži i beskonačnomesne operacije), tada za sve $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in L$,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) \wedge a = f(x_1 \wedge a, x_2 \wedge a, \dots, x_\alpha \wedge a, \dots).$$

Napomena 1.2 Niz $x_1, \dots, x_\alpha, \dots$ može biti i neprebrojiv.

Dokaz. Indukcijom po broju operacijskih simbola. ■

Lema 1.17' Ako je a beskonačno kodistributivan element mreže L i $f(x_1, x_2, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljan mrežni izraz (koji može da sadrži i beskonačnomesne operacije), tada za sve $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in L$,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) \wedge a = f(x_1 \wedge a, x_2 \wedge a, \dots, x_\alpha \wedge a, \dots). \quad \blacksquare$$

Tvrđenje 1.19 Ako je a neutralan i neprekidan element kompletne mreže L tada proizvoljni mrežni identitet (koji može da sadrži i beskonačnomesne operacije) važi na L ako i samo ako važi na filtru $[a]$ i idealu $[a]$.

Dokaz. Dokazuje se slično kao i Tvrđenje 1.17, koristeći Leme 1.17 i 1.17', i Tvrđenje 1.10, i činjenicu da je svaki distributivan i v -neprekidan element i beskonačno distributivan, kao i da je svaki kodistributivan i \wedge -neprekidan element i beskonačno kodistributivan. ■

1.10 O JEDNAKOSTI ALGEBARSKIH FUNKCIJA

Do sada su razmatrani mrežni identiteti i njihovo prenošenje sa podmreže (filtra, ideala) na mrežu. U nastavku se sličan problem

¹ Definisan kao mrežni term koji uključuje i beskonačnomesne operacije.

razmatra za jednakost algebarskih funkcija, tj. izraza u kojima se javljaju neke konstante ili fiksni elementi mreže. (U algebarskoj primeni ovih tvrdenja ti fiksni elementi biće neke istaknute podalgebre ili kongruencije date algebre).

Lema 1.18. Neka je 1 najveći elemenat mreže L, b proizvoljni elemenat mreže L i $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljni mrežni identitet. Ako za sve $x_1, \dots, x_{n-1} \in L$

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, 1),$$

tada za sve $y_1, \dots, y_{n-1} \in (b)$

$$f(y_1, \dots, y_{n-1}, b) = g(y_1, \dots, y_{n-1}, b).$$

Dokaz.

~~Sledi iz činjenice da je 1 najveći elemenat mreže L, a b najveći u (b). Za proizvoljne elemente, $y_1, \dots, y_{n-1} \in (b)$ važi da je~~

$$f(y_1, \dots, y_{n-1}, 1) = g(y_1, \dots, y_{n-1}, 1).$$

Indukcijom po broju operacijskih simbola se pokazuje da se taj zakon svodi na zakon koji ne sadrži 1, ili na $1=1$ (sledi iz $1 \wedge x = x$ i $1 \vee x = 1$). Kada umesto 1 u identitetu zamenimo b (iz $b \wedge x = x$ i $b \vee x = b$ za $x \in (b)$) taj zakon se takode svodi ili na zakon koji ne sadrži b (i to isti kao i u prvom slučaju, pa on važi), ili na $b=b$ (u slučajevima kada smo u prvom slučaju dobili $1=1$). U svakom slučaju, identitet važi. ■

Važi i dualno tvrđenje:

Lema 1.18' Neka je 0 najmanji elemenat mreže L, b proizvoljni elemenat mreže L i $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljni mrežni identitet. Ako za sve $x_1, \dots, x_{n-1} \in L$

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, 0),$$

tada za sve $y_1, \dots, y_{n-1} \in (b)$

$$f(y_1, \dots, y_{n-1}, b) = g(y_1, \dots, y_{n-1}, b). \quad \blacksquare$$

Tvrđenje 1.20 Neka je a neutralan elemenat mreže L takav da

klase kongruencije indukovane preslikavanjem m_a imaju najveće elemente i $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljni mrežni identitet. Za $b \in [a]$ označimo sa \bar{b} najveći element klase kongruencije određene sa m_a kojoj pripada b .

Ako jednakost

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, a) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, a)$$

važi na $[a]$ i $\{a\}$, tada:

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, b) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, b)$$

važi na idealu $\{\bar{b}\}$ (odnosno za sve $x_1, \dots, x_{n-1} \in \{\bar{b}\}$).

Dokaz.

Neka $x_1, \dots, x_{n-1} \in \{\bar{b}\}$. Prema Lemama 1.16' i 1.18 važi:

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, b) \wedge a = f(x_1 \wedge a, \dots, x_{n-1} \wedge a, b) = g(x_1 \wedge a, \dots, x_{n-1} \wedge a, b) = \\ = g(x_1, \dots, x_{n-1}, b) \wedge a,$$

jer $x_1 \wedge a, \dots, x_{n-1} \wedge a \in [a]$, a po pretpostavci odgovarajuća jednakost važi na $[a]$. Slično, prema Lemama 1.16 i 1.18':

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, b) \vee a = f(x_1 \vee a, \dots, x_{n-1} \vee a, a) = g(x_1 \vee a, \dots, x_{n-1} \vee a, a) = \\ = g(x_1, \dots, x_{n-1}, b) \vee a,$$

pošto odgovarajuća jednakost važi na filtru $[a]$.

Prema Lemi 1.3, iz neutralnosti elementa a sledi da za sve $x_1, \dots, x_{n-1} \in \{\bar{b}\}$ važi:

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, b) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, b). \quad \blacksquare$$

Važi i dualno tvrđenje:

Tvrđenje 1.20' Neka je a neutralan element mreže L takav da klase kongruencije indukovane preslikavanjem n_a imaju najmanje elemente i $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljni mrežni identitet. Za $b \in [a]$ označimo sa \underline{b} najmanji element klase kongruencije određene sa n_a kojoj pripada b .

Ako jednakost

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, a) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, a)$$

važi na $[a]$ i $[a]$, tada:

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, b) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, b)$$

važi na filtru $[b]$ (odnosno za sve $x_1, \dots, x_{n-1} \in [b]$). ■

Tvrđenje 1.21 Neka je a distributivan element mreže L i b pripada filtru $[a]$. Ako je f mrežni zakon oblika:

$$\bigwedge_{i=1}^n (b \vee f_1^i(x_1, \dots, x_n)) = \bigwedge_{j=1}^r (b \vee f_2^j(x_1, \dots, x_n)),$$

i ako f važi za $x_1, \dots, x_n \in [a]$, tada on važi za sve $x_1, \dots, x_n \in L$.

Napomena 1.3 Mrežni zakoni u ovom tvrđenju su svi oni zakoni u kojima se sva pojavljivanja b javljaju isključivo uz operaciju \vee .

Dokaz.

Neka je $\bigwedge_{i=1}^n (b \vee f_1^i(x_1, \dots, x_n)) = \bigwedge_{j=1}^r (b \vee f_2^j(x_1, \dots, x_n))$, za sve $x_1, \dots, x_n \in [a]$. Neka $y_1, \dots, y_n \in L$. Iz $b \vee a = b$, distributivnosti elementa a i Leme 1.16, i $a \vee y_k \in [a]$ (za $k \in \{1, \dots, n\}$), sledi:

$$\begin{aligned} \bigwedge_{i=1}^n (b \vee f_1^i(y_1, \dots, y_n)) &= \bigwedge_{i=1}^n (b \vee a \vee f_1^i(y_1, \dots, y_n)) = \\ \bigwedge_{i=1}^n (b \vee f_1^i(y_1 \vee a, \dots, y_n \vee a)) &= \bigwedge_{j=1}^r (b \vee f_2^j(y_1 \vee a, \dots, y_n \vee a)) = \\ \bigwedge_{j=1}^r (b \vee a \vee f_2^j(y_1, \dots, y_n)) &= \bigwedge_{j=1}^r (b \vee f_2^j(y_1, \dots, y_n)) \end{aligned}$$

Važi i dualno tvrđenje:

Tvrđenje 1.21' Neka je a kodistributivan element mreže L i b pripada idealu $[a]$. Ako je f mrežni zakon oblika:

$$\bigvee_{i=1}^n (b \wedge f_1^i(x_1, \dots, x_n)) = \bigvee_{j=1}^r (b \wedge f_2^j(x_1, \dots, x_n)),$$

i ako f važi za $x_1, \dots, x_n \in [a]$, tada on važi za sve $x_1, \dots, x_n \in L$. ■

Sledeća tvrđenja se primenjuju na mreže slabih kongruencija i daju odgovor na pitanje kada se neki mrežni zakon u kome učestvuju i konstante prenosi sa mreže kongruencija, odnosno mreže podalgebri na mrežu slabih kongruencija.

Tvrđenje 1.22 Neka je a neutralan element mreže L . Ako $b \in [a]$ i mrežni zakon $f_1(x_1, \dots, x_n, b) = f_2(x_1, \dots, x_n, b)$ važi za $x_1, \dots, x_n \in [a]$ i $f_1(x_1, \dots, x_n, a) = f_2(x_1, \dots, x_n, a)$ važi za $x_1, \dots, x_n \in [a]$, tada $f_1(x_1, \dots, x_n, b) = f_2(x_1, \dots, x_n, b)$ važi za $x_1, \dots, x_n \in L$.

Dokaz.

Neka $x_1, \dots, x_n \in L$. Primenom distributivnosti i kodistributivnosti elementa a i Lema 1.16 i 1.16', dobijamo:

$$f_1(x_1, \dots, x_n, b)va = f_1(x_1 va, \dots, x_n va, b) = f_2(x_1 va, \dots, x_n va, b) = f_2(x_1, \dots, x_n, b)va, \text{ jer zakon važi}$$

na $[a]$ za b , i

$$f_1(x_1, \dots, x_n, b)\wedge a = f_1(x_1 \wedge a, \dots, x_n \wedge a, a) = f_2(x_1 \wedge a, \dots, x_n \wedge a, b\wedge a) = f_2(x_1, \dots, x_n, b)\wedge a, \text{ jer zakon}$$

važi na $[a]$ za a .

Iz komodularnosti elementa a sada sledi da je :

$$f_1(x_1, \dots, x_n, b) = f_2(x_1, \dots, x_n, b). \quad \blacksquare$$

Tvrđenje 1.22' Neka je a neutralan element mreže L . Ako $b \in [a]$ i mrežni zakon $f_1(x_1, \dots, x_n, b) = f_2(x_1, \dots, x_n, b)$ važi za $x_1, \dots, x_n \in [a]$ i $f_1(x_1, \dots, x_n, a) = f_2(x_1, \dots, x_n, a)$ važi za $x_1, \dots, x_n \in [a]$, tada $f_1(x_1, \dots, x_n, b) = f_2(x_1, \dots, x_n, b)$ važi za $x_1, \dots, x_n \in L$. ■

U III poglavlju će se ispitivati kada se neka algebarska svojstva (koja se svode na beskonačne mrežne zakone, kao *CIP, na primer) prenose sa algebre na njenu podalgebru, ili faktor algebru. U tom cilju potrebno je prethodna tvrđenja dokazati za identitete koji sadrže i beskonačno-mesne operacije.

Dokazi za sledećih nekoliko tvrđenja su analogni dokazima odgovarajućih tvrđenja za identitete sa konačno-mesnim operacijama.

Lema 1.19 Neka je 1 najveći element mreže L , b proizvoljni

element mreže L i $f(x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = g(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljni mrežni identitet (koji može da sadrži i beskonačnomesne operacije).
Ako za sve $x_2, \dots, x_\alpha, \dots \in L$

$$f(1, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(1, x_2, \dots, x_\alpha, \dots),$$

tada za sve $y_2, \dots, y_\alpha, \dots \in [b]$

$$f(b, y_2, \dots, y_\alpha, \dots) = g(b, y_2, \dots, y_\alpha, \dots).$$

Dokaz. Analogno Lemi 1.18. ■

Važi i dualno tvrđenje:

Lema 1.19' Neka je 0 najmanji element mreže L , b proizvoljni element mreže L i $f(x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = g(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljni mrežni identitet (koji može da sadrži i beskonačnomesne operacije).

Ako za sve $x_2, \dots, x_\alpha, \dots \in L$

$$f(0, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(0, x_2, \dots, x_\alpha, \dots),$$

tada za sve $y_2, \dots, y_\alpha, \dots \in [b]$

$$f(b, y_2, \dots, y_\alpha, \dots) = g(b, y_2, \dots, y_\alpha, \dots). \quad \blacksquare$$

Tvrđenje 1.23 Neka je a neutralan i neprekidan element mreže L takav da klase kongruencije indukovane preslikavanjem m_a imaju najveće elemente i $f(x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = g(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljni mrežni identitet (koji može da sadrži i beskonačnomesne operacije). Za $b \in [a]$ označimo sa \bar{b} najveći element klase kongruencije određene sa m_a kojoj pripada b .

Ako jednakost

$$f(a, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(a, x_2, \dots, x_\alpha, \dots),$$

važi na $[a]$ i $[a]$, tada:

$$f(b, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(b, x_2, \dots, x_\alpha, \dots),$$

važi na idealu (\bar{b}) (odnosno za sve $x_2, \dots, x_\alpha \in (\bar{b})$).

Dokaz. Slično kao dokaz Tvrđenja 1.20. ■

Važi i dualno tvrđenje:

Tvrđenje 1.23' Neka je a neutralan i neprekidan element mreže L

takav da klase kongruencije indukovane preslikavanjem n_a imaju najveće elemente i $f(x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = g(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljni mrežni identitet (koji može da sadrži i beskonačnomesne operacije). Za $b \in [a]$ označimo sa \underline{b} najmanji element klase kongruencije određene sa n_a kojoj pripada b .

Ako jednakost

$$f(a, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(a, x_2, \dots, x_\alpha, \dots),$$

važi na $[a]$ i $[a]$, tada:

$$f(\underline{b}, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(\underline{b}, x_2, \dots, x_\alpha, \dots),$$

važi na filtru $[\underline{b}]$ (odnosno za sve $x_2, \dots, x_\alpha \in [\underline{b}]$). ■

Tvrđenje 1.24 Neka je a beskonačno distributivan element mreže L i b pripada filtru $[a]$. Ako je f mrežni zakon oblika:

$$\bigwedge_{i \in I} (b \vee f_1^i(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)) = \bigwedge_{j \in J} (b \vee f_2^j(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)),$$

i ako f važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in [a]$, tada on važi za sve $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in L$. (I i J su proizvoljni indeksni skupovi).

Napomena 1.4. Mrežni zakoni u ovom tvrđenju su svi oni zakoni u kojima se sva pojavljivanja b javljaju isključivo uz operaciju \vee .

Dokaz. Analogno sa dokazom Tvrđenja 1.21. ■

Važi i dualno tvrđenje:

Tvrđenje 1.24' Neka je a beskonačno kodistributivan element mreže L i b pripada idealu $[a]$. Ako je f mrežni zakon oblika:

$$\bigvee_{i \in I} (b \wedge f_1^i(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)) = \bigvee_{j \in J} (b \wedge f_2^j(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)),$$

i ako f važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in [a]$, tada on važi za sve $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in L$. ■

Tvrđenje 1.25 Neka je a neutralan i neprekidan element mreže L . Ako $b \in [a]$ i mrežni zakon $f_1(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in [a]$ i $f_1(a, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(a, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in [a]$, tada $f_1(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) =$

$f_2(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in L$.

Dokaz. Analogno dokazu Tvrdjenja 1.22. ■

Tvrđenje 1.25' Neka je a neutralan i neprekidan element mreže L . Ako $b \in [a]$ i mrežni zakon $f_1(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in [a]$ i $f_1(a, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(a, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in [a]$, tada $f_1(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(b, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi za $x_1, \dots, x_\alpha, \dots \in L$. ■

1.11. KADA JE L_b PODMREŽA OD L ? [106]

Neka je u sledećim tvrđenjima a kodistributivan element mreže L , takav da klase kongruencije indukovane sa $m_a: x \rightarrow x \wedge a$ imaju najveće elemente. Kolekcija tih maksimalnih elemenata se označava sa M_a , i neka je za svako $x \in L$, \bar{x} odgovarajući element iz M_a , odnosno, $m_a(x) = m_a(\bar{x})$.

Pošto je a kodistributivni element mreže L , imamo da je

$$L = \bigcup ([a \wedge \bar{x}, \bar{x}] \mid x \in L),$$

gde su intervali $[a \wedge \bar{x}, \bar{x}]$ klase kongruencije indukovane sa m_a .

Za proizvoljno $b \in [a]$, neka je $L_b = \bigcup ([b \wedge \bar{x}, \bar{x}] \mid x \in L)$. L_b nije uvek i podmreža od L i sledeća tvrdjenja daju neke dovoljne uslove pod kojima L_b jeste podmreža od L .

Ova tvrdjenja primenjivaće se u poglavlju III pri utvrđivanju potrebnih i dovoljnih uslova za mrežu slabih kongruencija faktor algebre da bude podmreža mreže slabih kongruencija te algebre.

Tvrđenje 1.26 Neka je a modularan i komodularan element mreže L , i neka je M_a podmreža od L . Ako je b kodistributivan element u filtru $[a]$, tada je L_b podmreža od L .

Dokaz.

Neka $u, v \in \bigcup \{ [b \wedge \bar{x}, \bar{x}] \mid x \in L \}$. Tada $u \in [b \wedge \bar{y}, \bar{y}]$ i $v \in [b \wedge \bar{z}, \bar{z}]$ za neke elemente $y, z \in L$, odnosno, $b \wedge \bar{y} \leq u \leq \bar{y}$ i $b \wedge \bar{z} \leq v \leq \bar{z}$. Sledi:

$$b \wedge \overline{y \wedge z} = b \wedge \bar{y} \wedge \bar{z} \leq u \wedge v \leq \bar{y} \wedge \bar{z} = \overline{y \wedge z},$$

pa $u \wedge v \in [b \wedge \overline{y \wedge z}, \overline{y \wedge z}]$.

Dalje je:

$$(b \wedge \bar{y}) \vee (b \wedge \bar{z}) \leq u \vee v \leq \bar{y} \vee \bar{z} = \overline{y \vee z},$$

pošto je M_a podmreža od L .

Iz modularnosti elementa a u L i distributivnosti elementa b u $\{a\}$, sledi da je:

$$\begin{aligned} ((b \wedge \bar{y}) \vee (b \wedge \bar{z})) \vee a &= ((b \wedge \bar{y}) \vee a) \vee ((b \wedge \bar{z}) \vee a) = (b \wedge (\bar{y} \vee a)) \vee (b \wedge (\bar{z} \vee a)) \\ &= b \wedge (\bar{y} \vee \bar{z} \vee a) = (b \wedge (\bar{y} \vee \bar{z})) \vee a. \end{aligned}$$

Takode važi i da je:

$$((b \wedge \bar{y}) \vee (b \wedge \bar{z})) \wedge a = b \wedge (\bar{y} \vee \bar{z}) \wedge a, \text{ jer je } b \geq a, \text{ i } a \text{ je}$$

~~kodistributivan~~ element mreže L .

Pošto je a komodularan element, sledi da je:

$$(b \wedge \bar{y}) \vee (b \wedge \bar{z}) = b \wedge (\bar{y} \vee \bar{z}) = b \wedge \overline{y \vee z},$$

odakle sledi da:

$$u \vee v \in [b \wedge \overline{y \vee z}, \overline{y \vee z}]. \quad \blacksquare$$

Tvrđenje 1.27 Neka je M_a podmreža od L , i $b \in \{a\}$. Ako za $y, z \in L_b$ važi da je:

$$b \wedge (y \vee z) = (b \wedge y) \vee (b \wedge z)$$

tada je L_b podmreža od L .

Dokaz. Neka $u, v \in L_b$, i $u \in [b \wedge \bar{y}, \bar{y}]$ i $v \in [b \wedge \bar{z}, \bar{z}]$ za neke elemente $y, z \in L$. Kao u prethodnom tvrđenju pokazuje se da $u \wedge v \in [b \wedge \overline{y \wedge z}, \overline{y \wedge z}]$, odnosno, $u \wedge v \in L_b$. Dalje, iz $b \wedge \bar{y} \leq u \leq \bar{y}$ i $b \wedge \bar{z} \leq v \leq \bar{z}$, sledi:

$$b \wedge (\overline{y \vee z}) = b \wedge (\bar{y} \vee \bar{z}) = (b \wedge \bar{y}) \vee (b \wedge \bar{z}) \leq u \vee v \leq \overline{y \vee z},$$

odakle sledi da je L_b podmreža od L . ■

1.12 DEFINICIJE NERAZLOŽIVIH ELEMENATA MREŽE I JOŠ NEKE
DEFINICIJE IZ TEORIJE MREŽA [4,18,41]

U ovom delu date su definicije još nekih klasa specijalnih elemenata mreže, kao što su \wedge -nerazloživi, \vee -nerazloživi, elementi, itd., navedena su neka poznata tvrdenja reprezentacija mreže preko skupa njenih \wedge -(\vee -)nerazloživih elemenata, posebno distributivnih mreža.

U sledećim definicijama neka je L proizvoljna mreža, i $a, b, c \in L$.

Element a je \vee -nerazloživ ako je različit od 0 (ako mreža ima 0) i iz $b \vee c = a$ sledi $b = a$ ili $c = a$.

Element a je \wedge -nerazloživ ako je različit od 1 (ako mreža ima 1) i iz $b \wedge c = a$ sledi $b = a$ ili $c = a$.

Element a je \wedge -prost ako iz $a \geq b \wedge c$ sledi $a \geq b$ ili $a \geq c$.

Element a je \vee -prost ako iz $a \leq b \vee c$ sledi $a \leq b$ ili $a \leq c$.

Element a je strogo \wedge -nerazloživ ako skup svih $x > a$ ima najmanji element.

Lema 1.20 U distributivnoj mreži element je \wedge -nerazloživ ako i samo ako je \wedge -prost. ■

Pošto će u pretpostavkama za neka od sledećih tvrdenja biti potrebni neki uslovi konačnosti, slede neke poznate definicije iz teorije mreža koje su u vezi sa tim.

Mreža L ima uslov opadajućih lanaca (descending chain condition-DCC) ako svaki njen neprazan podskup sadrži minimalni element. Ovaj uslov je ekvivalentan sa sledećim: ne postoji beskonačan niz elemenata x_1, x_2, \dots iz L takav da je $x_1 > x_2 > \dots$.

Dualno, mreža L zadovoljava uslov rastućih lanaca (ascending chain condition-ACC) ako svaki njen neprazni podskup sadrži maksimalni element, ili ekvivalentno, ako ne postoji beskonačan niz x_1, x_2, \dots elemenata iz L takav da je $x_1 < x_2 < \dots$.

Mreža koja zadovoljava uslov rastućih lanaca zove se i Neterina mreža.

Analogne definicije važe i za parcijalno-uređene skupove.

Lema 1.21 U Neterinoj mreži L svaki element se može izraziti u obliku neskrativog infimuma konačnog broja \wedge -nerazloživih elemenata. ■

Važi i dualno tvrđenje.

Lema 1.21' U mreži L koja ispunjava uslov opadajućih lanaca svaki element se može izraziti u obliku neskrativog supremuma konačnog broja \vee -nerazloživih elemenata. ■

Lema 1.22 Svaki element u distributivnoj mreži ima najviše jedno predstavljanje u obliku neskrativog infimuma konačnog broja \wedge -nerazloživih elemenata i najviše jedno predstavljanje u obliku neskrativog supremuma konačnog broja \vee -nerazloživih elemenata. ■

Posledica 1.1 Svaki element u distributivnoj Neterinoj mreži jedinstveno se može predstaviti u obliku neskrativog konačnog infimuma \wedge -nerazloživih elemenata. ■

Posledica 1.2 Svaki element u distributivnoj mreži sa uslovom opadajućih lanaca jedinstveno se može predstaviti u obliku neskrativog konačnog supremuma \vee -nerazloživih elemenata. ■

Tvrđenje 1.28 U algebarskoj mreži L svaki element može se predstaviti u obliku infimuma strogo \wedge -nerazloživih elemenata. ■

1.13 O BIRKOFOVOJ TEOREMI REPREZENTACIJE [4,18,41]

U sledećem delu daje se karakterizacija proizvoljne mreže preko familije njenih \wedge -nerazloživih elemenata (odnosno, preko familije ideala na parcijalno uređenom skupu njenih \wedge -nerazloživih elemenata). Ovo tvrdjenje je uopštenje Birkofove teoreme reprezentacije za distributivne mreže.

Dalje je razmatrana kolekcija mreža koje imaju isti parcijalno uređeni skup \wedge -nerazloživih elemenata. Pokazano je da je ta kolekcija i sama mreža u odnosu na inkluziju, i ispitana su neka njena svojstva.

Napomena 1.5 Poznato je da je parcijalno uređeni skup v -nerazloživih elemenata distributivne mreže izomorfan parcijalno uređenom skupu \wedge -nerazloživih elemenata. Zato će se u sledećem delu paralelno koristiti i jedan i drugi taj parcijalno-uređeni skup.

Neka je (P, \leq) parcijalno uređeni skup. Ideal je parcijalno uređeni skup $I \subseteq P$, takav da na njemu važi:

ako $x \in I$ i $y \leq x$ onda i $y \in I$.

Ideal generisan elementom x , ili glavni ideal parcijalno uređenog skupa (P, \leq) , u oznaci $(x]$ je skup $\{y | y \leq x\}$.

Dualno se definišu pojmovi filtra i glavnog filtra.

Neposredno se pokazuje da svi ideali parcijalno-uređenog skupa čine mrežu, koja je podmreža mreže $(\mathcal{P}(P), \cap, \cup)$ (presek dva ideala i unija dva ideala su takode ideali, a i skup P i \emptyset su po definiciji uvek ideali). Ta mreža svih ideala nekog parcijalno-uređenog skupa je očito distributivna mreža. Može se uočiti da su v -nerazloživi elementi te mreže baš glavni ideali (lako se pokazuje da se neki glavni ideal ne može prikazati u obliku unije dva druga ideala od koji su oba različita od tog glavnog ideala).

Dalje, na prirodan način može se uspostaviti izomorfizam između mreže tih ideala i mreže svih antiizotoničnih funkcija na parcijalno-uređenom skupu od koga smo krenuli. Neki ideal se, tim izomorfizmom preslikava na njegovu karakterističnu funkciju (za koju se pokazuje da je anti-izotona).

Iz ovih razmatranja može se izvesti poznata Teorema Birkhoffa.

Teorema 1.1 Neka je L distributivna mreža dužine n . Parcijalno uređeni skup X \vee -nerazloživih elemenata ima red n i $L \cong 2^{\bar{X}}$. ■

Napomena 1.6 Ovde je $2^{\bar{X}}$ skup svih izotoničnih funkcija na dualnom parcijalno-uređenom skupu od X , što predstavlja skup svih antiizotoničnih funkcija na X .

Posledica 1.3 Distributivna mreža L je izomorfna mreži ideala na parcijalno uređenom skupu njenih \vee -nerazloživih elemenata. ■

U skladu sa Napomenom 1.5 ova posledica i gornje tvrdjenje važi i za skup \wedge -nerazloživih elemenata.

1.14 UOPŠTENJE TEOREME BIRKOFFA

Dalje se može pokazati uopštenje Teoreme Birkoffa za proizvoljnu mrežu konačne dužine.

Tvrđenje 1.29 Dat je parcijalno uređeni skup (X, \leq) čiji su svi lanci konačni i neka je (I, \subseteq) mreža svih njegovih ideala. Neka je $J \subseteq I$ takav da:

(i) ako $x, y \in J$ onda $x \vee y \in J$

(ii) $X \in J$

(iii) svi glavni ideali od X pripadaju J ali nikada kao

supremum familije elemenata iz J koja ne sadrži i taj ideal.

Tada je (J, \subseteq) mreža čiji je skup \vee -nerazloživih elemenata

izomorfan sa X .

Dokaz. Pošto je prema (i) i (ii) skup J zatvoren u odnosu na infimume i najveći element mu pripada, on je mreža. Još treba pokazati da su glavni ideali od X takode v -nerazloživi elementi i od J , i da J nema drugih v -nerazloživih elemenata.

Pretpostavimo da je neki neglavni ideal $Y \in J$ v -nerazloživi element od J . To je nemoguće, jer je Y svakako unija nekih glavnih ideala, koji su svi u J , pa bi on bio supremum nekih elemenata različitih od njega samog.

Dalje, pretpostavimo da je Z neki glavni ideal od X , i treba pokazati da je Z v -nerazloživi element od J . Ali, to je očigledno prema uslovu (iii), jer Z pripada J , ali nije supremum nekih drugih elemenata iz J različitih od njega samog.

Traženi izomorfizam između skupa (X, \leq) i v -nerazloživih elemenata mreže J je takav da se svaki element iz X preslikava u ideal koji generiše, i poredak je sa tim preslikavanjem saglasan, pa je to zaista izomorfizam. ■

Sledeće tvrdjenje je uopštenje Teoreme reprezentacije Birkofa za proizvoljnu mrežu konačne dužine.

Tvrđenje 1.30 Neka je L proizvoljna mreža konačne dužine, i X skup njenih v -nerazloživih elemenata. Mreža L može se izomorfno preslikati u mrežu svih ideala nad skupom X , pri čemu se svaki v -nerazloživi element preslikava u ideal generisan tim elementom, a proizvoljno $x = x_1 \vee \dots \vee x_n$ (gde su x_i v -nerazloživi elementi) se preslikava u ideal generisan elementima x_1, \dots, x_n , tako da poredak ostaje očuvan.

Napomena 1.7 Razlaganje svakog elementa u obliku supremuma v -nerazloživih elemenata sledi iz Leme 1.21'.

Dokaz. Direktna posledica prethodnog tvrđenja. ■

Prethodna tvrdenja, kao što je rečeno važe analogno i za skup \wedge -nerazloživih elemenata neke mreže.

1.15 O KOLEKCIJI SVIH MREŽA SA IZOMORFNIM SKUPOVIMA \wedge -NERAZLOŽI- VIH ELEMENATA [112]

Neka je (X, \leq) parcijalno uređeni skup konačne dužine i $\mathcal{L}(X)$ kolekcija mreža koje imaju X kao skup svojih \wedge -nerazloživih elemenata (odnosno, čiji je skup \wedge -nerazloživih elemenata izomorfan sa X). Prema Tvrdenju 1.30 svaka mreža iz familije $\mathcal{L}(X)$ može se predstaviti kao kolekcija ideala nad skupom X . Pošto je (prema Teoremi Birkofa) distributivna mreža izomorfnu sa familijom svih izotonih funkcija iz X u 2 , odnosno familijom ideala od X , sledi da kolekcija mreža $\mathcal{L}(X)$ ima najveći element, i to je distributivna mreža koja ima X za parcijalno-uređeni skup \wedge -nerazloživih elemenata. Označimo tu, distributivnu mrežu sa $L_D(X)$. Iz prethodnog razmatranja sledi da se svaka mreža iz familije $\mathcal{L}(X)$ može posmatrati kao podskup od $L_D(X)$, pa $\mathcal{L}(X)$ odgovara parcijalno-uređenoj kolekciji $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ podskupova od $L_D(X)$. Međutim, može se primetiti da ni jedna mreža iz kolekcije $\mathcal{L}(X)$ nije podmreža mreže $L_D(X)$, jer među njima nema distributivnih.

Lema 1.23 Neka je (X, \leq) parcijalno uređeni skup konačne dužine i $L \in \mathcal{L}(X)$. Za svako $x \in X$ važi:

$$\bigwedge_D \{y \in X \mid x < y\} \in L,$$

gde je \bigwedge_D infimum u mreži L_D .

Dokaz. Neka je $\bigwedge_L \{y \in X \mid x < y\}$ infimum u mreži L . Ovo je i element mreže $L_D(X)$, pa važi da je:

$$x < \bigwedge_L \{y \in X \mid x < y\} \leq \bigwedge_D \{y \in X \mid x < y\}.$$

(x je \wedge -nerazloživ element u konačnoj mreži L , pa ne može biti jednak infimumu elemenata koji ne sadrže x), odakle sledi da je:

$$\bigwedge_L \{y \in X \mid x < y\} = \bigwedge_D \{y \in X \mid x < y\}. \quad \blacksquare$$

Neka u nastavku, za $x \in X$ z_x označava $\bigwedge_D \{y \in X \mid x < y\}$, odnosno, infimum u $L_D(X)$ (pa prema prethodnoj lemi i u ostalim mrežama u kolekciji $\mathcal{L}(X)$) svih \wedge -nerazloživih elemenata iznad x . Ako je x maksimalni \wedge -nerazloživ element, neka tada z_x označava x .

Lema 1.24 Ako za $x \in X$ važi da je $z_x \neq x$, tada važi da $z_x \succ x$ (u $L_D(X)$) (gde je \succ relacija pokrivanja).

Dokaz. Ako ne bi važilo da $z_x \succ x$, to bi značilo da postoji element $a \in L_D(X)$ takav da $x < a < z_x$. Element a nije \wedge -nerazloživ, i manji je ili jednak od infimuma svih \wedge -nerazloživih elemenata iznad njega, a pošto je z_x infimum svih \wedge -nerazloživih elemenata iznad x , dobija se kontradikcija. \blacksquare

Lema 1.25 Neka je (X, \leq) parcijalno-uređeni skup konačne dužine i $L \in \mathcal{L}(X)$. Za sve $x, y \in L$ važi da $xv_D y \in L$. (odnosno, $xv_L y = xv_D y$).

Dokaz. Ako je $xv_D y$ \wedge -nerazloživ element, tada on svakako pripada mreži L . Ako to nije slučaj tada postoje elementi $a, b \in L_D(X)$ takvi da $a \succ xv_D y$ i $b \succ xv_D y$. Sledi da je $a \wedge_D b = xv_D y$. Postoje elementi $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m$ iz X takvi da je $a = \bigwedge_D x_i$ i $b = \bigwedge_D y_j$. Pošto je $\bigwedge_L x_i \geq x$, $\bigwedge_L x_i \geq y$, $\bigwedge_L y_j \geq x$ i $\bigwedge_L y_j \geq y$ (za $i \in \{1, \dots, n\}$ i $j \in \{1, \dots, m\}$), važi:

$$\bigwedge_L x_i \wedge_L \bigwedge_L y_j \geq xv_L y.$$

Dalje važi da je:

$$xv_D y = \bigwedge_D x_i \wedge_D \bigwedge_D y_j \geq \bigwedge_L x_i \wedge_L \bigwedge_L y_j \geq xv_L y.$$

Pošto uvek važi da je $xv_D y \leq xv_L y$, važi da je $xv_D y = xv_L y$, odnosno $xv_D y \in L$. \blacksquare

Napomena 1.8 Ovo tvrđenje može se izvesti i iz tvrđenja dualnog

Tvrdenju 1.29.

Sa X' označimo skup $X \cup \{z_x \mid x \in X\} \cup \{y \in L_D(X) \mid y = \vee_D X_i\}$, gde je $X_i \subseteq X$, gde je (X, \leq) parcijalno uređeni skup i $L_D(X)$ odgovarajuća distributivna mreža.

Sledeće tvrđenje dokazuje da svaka kolekcija $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ ima najmanji elemenat.

Tvrđenje 1.31 Za parcijalno uređeni skup (X, \leq) konačne dužine postoji najmanji elemenat $L_m(X)$ kolekcije $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$, gde je:

$$L_m(X) = (X' \cup \{0, 1\}, \leq)$$

(\leq je uređenje iz $L_D(X)$).

Dokaz. Prema Lemi 1.23 za svaku mrežu $L \in \mathcal{L}(X)$, i svako $x \in X$, $z_x \in L$. Po konstrukciji svi supremumi (u $L_D(X)$) elemenata iz X su u svakoj mreži L . Iz Tvrđenja o reprezentaciji mreže preko kolekcije ideala (Tvrđenja 1.30) sledi da 0 i 1 iz $L_D(X)$ pripadaju svakoj mreži te kolekcije. Sledi da se $X' \cup \{0, 1\}$ nalazi u preseku svih mreža kolekcije $\mathcal{L}(X)$. Dalje se pokazuje da je skup $X' \cup \{0, 1\}$ zatvoren u odnosu na supremume iz $L_D(X)$. Prema Lemi 1.25 to važi za dva elementa iz X . Prema Lemi 1.24 ako je jedan elemenat oblika z_x , za $x \in X$, tada je $z_x \vee y = x \vee y$, za svako y koje nije uporedivo sa z_x (ako je uporedivo, supremum se svakako nalazi u tom skupu). Odatle sledi da supremum svaka dva elementa (u $L_D(X)$) iz $X' \cup \{0, 1\}$ ponovo pripada tom skupu.

Znači da $L_m(X)$ sadrži najmanji elemenat (0) , i njegova svaka dva elementa imaju supremum u odnosu na poredak u $L_D(X)$, pa je $L_m(X)$ mreža, a pošto je sadržana u svakoj mreži familije $\mathcal{L}(X)$, ona je najmanja mreža te familije. ■

U sledećem razmatranju daće se opis proizvoljne mreže iz kolekcije $\mathcal{L}(X)$.

Neka je (X, \leq) parcijalno-uređeni skup konačne dužine, $\mathcal{L}(X)$ odgovarajuća kolekcija mreža, $L_D(X)$ najveća, a $L_m(X)$ najmanja mreža u

toj kolekciji, $X' = X \cup \{z_x \mid x \in X\} \cup \{y \in L_D(X) \mid y = \vee_D X_1, \text{ gde je } X_1 \subseteq X\}$, i $Y(X) = L_D(X) \setminus L_m(X)$ (razlika u skupovnom smislu). $Y(X)$ je podskup od $L_D(X)$ i može biti jednak i praznom skupu, u kom slučaju kolekcija $\mathcal{L}(X)$ sadrži samo jednu, i to distributivnu mrežu.

Tvrđenje 1.32 Neka je (X, \leq) parcijalno uređeni skup konačne dužine, i $L \subseteq L_D(X)$, $L \neq \emptyset$. (L, \leq) je (u odnosu na uređenje \leq u $L_D(X)$) mreža iz familije $\mathcal{L}(X)$ ako i samo ako je $L = L_m \cup Z$, gde je $Z \subseteq Y(X)$ i iz $x, y \in Z \cup X'$ i $x \vee_D y \in Y$ sledi da $x \vee_D y \in L$.

Dokaz. (\longrightarrow)

Ako $L \in \mathcal{L}(X)$, tada je ona očigledno jednaka sa $L_m \cup Z$, za neko $Z \subseteq Y$. Prema Lemi 1.25 L je zatvorena u odnosu na supremume iz L_D i traženi uslov je ispunjen.

(\longleftarrow)

Sa druge strane pretpostavimo da je $L = L_m \cup Z$ za proizvoljan skup $Z \subseteq Y$ i da iz $x, y \in Z \cup X'$ i $x \vee_D y \in Y$ sledi da $x \vee_D y \in L$. Odatle sledi da je (L, \leq) zatvoreno u odnosu na supremume iz L_D , i pošto ima i najmanji element (L, \leq) je mreža, koja, po konstrukciji ima X za skup njenih \wedge -nerazloživih elemenata. ■

Prethodno tvrđenje daje algoritam za konstrukciju proizvoljne mreže iz kolekcije $\mathcal{L}(X)$. Naime, znajući parcijalno-uređeni skup X , možemo, dodavanjem traženih supremuma i infimuma dobiti parcijalno uređeni skup X' , i mrežu $L_m = X' \cup \{0, 1\}$. Dalje je $Y = L_D \setminus L_m$. Tvrđenje 1.28 nam kaže dodavanjem kojih podskupova od Y na L_m dobijamo mreže iz kolekcije $\mathcal{L}(X)$. U sledećem tvrđenju pokazuje se da je $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ mreža.

Tvrđenje 1.33 Za parcijalno uređen skup konačne dužine (X, \leq) , $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ je mreža (u odnosu na skupovnu inkluziju).


Dokaz. $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ ima najveći element, i to je distributivna

mreža L_D . Takode, skup $\mathcal{L}(X)$ je zatvoren u odnosu na preseke. Naime, ako su L_1 i L_2 dve mreže iz $\mathcal{L}(X)$, tada je $L_1 \cap L_2$ takode mreža iz kolekcije, jer je $L_1 \cap L_2$ neprazan skup, sadrži elemenat 0, i zatvoren je u odnosu na supremume, prema Tvrdenju 1.32. ■

U sledećem primeru data je konstrukcija mreže $\mathcal{L}(X)$ za jedan parcijalno-uređen skup X .


Primer 1.4

Dat je parcijalno-uređeni skup (X, \leq) na slici 1.4




slika 1.4

Najveća (distributivna) mreža, i najmanja mreža iz kolekcije $\mathcal{L}(X)$ su sledeće:



slika 1.5







tako da je Y sledeći parcijalno-uređeni skup:




slika 1.6

Prema Tvrdenju 1.32, mreže iz kolekcije $\mathcal{L}(X)$ dobijaju se kada se mreži L_m dodaju podskupovi skupa Y koji zadovoljavaju uslove tog tvrdjenja, i to su: \emptyset , $\{f\}$, $\{g\}$, $\{h\}$, $\{e\}$, $\{f, g\}$, $\{f, h\}$, $\{f, e\}$, $\{e, g\}$.


$\{e, h\}$, $\{f, g, e\}$, $\{f, e, h\}$, $\{g, e, h\}$, $\{e, f, g, h\}$. Pored L_D i L_m neizomorfne mreže iz kolekcije $\mathcal{L}(X)$ su:





slika 1.7

$L_m \setminus \{g\}$ je izomorfno sa $L_m \setminus \{h\}$; $L_m \setminus \{f, h\}$ je izomorfno sa $L_m \setminus \{f, g\}$,
 $L_m \setminus \{e, g\}$ je izomorfno sa $L_m \setminus \{e, h\}$ i $L_m \setminus \{e, f, g\}$ je izomorfno sa
 $L_m \setminus \{f, e, h\}$, tako da u familiji $\mathcal{L}(X)$ ima ukupno 14 elemenata, i
 $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ je mreža na sledećoj slici:




slika 1.8

U sledećem primeru dat je parcijalno-uređeni skup za koji je $L_m = L_D$, pa je familija $\mathcal{L}(X)$ jednočlana.


Primer 1.5

Na slici predstavljen je parcijalno-uređen skup (X, \leq) :



slika 1.9

čija je mreža L_D i L_m na slici 1.10.




slika 1.10

pa je, prema tome mreža $\mathcal{L}(X)$ jednočlana.

Sledeće tvrđenje daje potreban i dovoljan uslov za parcijalno uređeni skup (X, \leq) da bi njegova mreža $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ bila jednočlana.

Tvrđenje 1.34 $(\mathcal{L}(X), \subseteq)$ je jednoelementna mreža ako i samo ako (X, \leq) ne sadrži tri neuporediva elementa, niti podgraf, kao na slici 1.11.




slika 1.11


Napomena 1.9 Može se uočiti da su parcijalno uređeni skupovi koji zadovoljavaju ovaj uslov ili lanci, ili se sastoje samo od dva neuporediva elementa, ili su analogna parcijalnom uređenju na slici 1.9.


Dokaz. (\leftarrow)


Pretpostavimo da (X, \leq) ne sadrži tri neuporediva elementa, niti podgraf sa slike. Ono što se dokazuje je da je L_m distributivna mreža, pa je tada $L_m = L_D$, odnosno, $\mathcal{L}(X)$ je jednoelementna mreža. Dokaz se izvodi indukcijom po dužini parcijalno-uređenog skupa (dužini najdužeg lanca u X). Za $d=1$ X je ili jednočlan, a mreža L_m je tada \mathcal{L} , pa je distributivna, ili se sastoji od dva neuporediva

elementa \circ \circ , pa je L_m Bulova algebra: , znači $L_m = L_D$.


Pretpostavi se da tvrđenje važi za parcijalno uređene skupove sa dužinom manjom od n elemenata, i dokazuje se za $d=n$. Mogući su sledeći slučajevi:


a) X ima jedan maksimalni elemenat m , a $X \setminus \{m\}$ ima dva maksimalna elementa, što je prikazano na slici: 

Po induktivnoj pretpostavci minimalna mreža koja ima za parcijalno-uređeni skup svojih \wedge -nerazloživih elemenata skup $X \setminus \{m\}$ (L'_m je distributivna, i po konstrukciji je oblika: . Mreža L_m


se može dobiti (po konstrukciji za minimalnu mrežu familije $\mathcal{L}(X)$ na sledeći način: . To je mreža izomorfna mreži L'_m , sa dodatkom

jednog elementa prema gore, pa pošto je L'_m distributivna mreža i L_m je distributivna mreža.

b) X ima jedan maksimalni elemenat m , a $X \setminus \{m\}$ ima jedan maksimalni elemenat: . Na sličan način kao u prethodnom slučaju, po induktivnoj pretpostavci mreža L'_m (minimalna mreža familije $\mathcal{L}(X \setminus \{m\})$) je distributivna. L_m se dobija od L'_m dodavanjem jednog elementa, slično kao za slučaj pod a), pa je i L_m distributivna.



c) X ima dva maksimalna elementa m_1 i m_2 , a $X \setminus \{m_1, m_2\}$ ima jedan maksimalan elemenat, kao na sledećoj slici: 

je L'_m (minimalna mreža familije $\mathcal{L}(X \setminus \{m_1, m_2\})$) distributivna, a po

konstrukciji L_m se dobija od L'_m na sledeći način: , gde je mreža $L_m \setminus \{1, m_1, m_2\}$ izomorfna sa L'_m , a kako je L'_m


po induktivnoj pretpostavci distributivna mreža, tada je i L_m distributivna mreža.

d) X ima dva maksimalna elementa m_1 i m_2 , a $X \setminus \{m_1, m_2\}$ takode ima dva maksimalna elementa, pa prema uslovima iz tvrđenja X

izgleda kao na slici . Mreža L'_m (kao u prethodnim slučajevima) je distributivna, a mreža L_m se dobija od mreže L'_m na sledeći način: , pa kako je L'_m izomorfna sa $L_m \setminus \{m_1, m_2, 1\}$, iz distributivnosti mreže L'_m sledi da je L_m distributivna.


Ovim su ispitane sve mogućnosti, jer X ne sadrži tri neuporediva elementa, niti podgraf datog oblika.

(\rightarrow)

Pretpostavimo da X sadrži ili tri neuporediva elementa, ili podgraf . Lako se može utvrditi, ispitujući sve mogućnosti, da L_m sadrži kao podmrežu pentagon, ili dijamant, što znači da L_m nije distributivna mreža, pa kolekcija $\mathcal{L}(X)$ sadrži bar dva elementa. ■

Sledeće tvrđenje govori o tome kada je $\mathcal{L}(X)$ Bulova mreža

Tvrđenje 1.35 Mreža $(\mathcal{L}(X), \leq)$ ima maksimalan broj elemenata $(2^{|Y|})$ elemenata ako i samo ako $(Y \cup X', \leq)$ ne sadrži podgraf kao na slici 1.12,



slika 1.12

pri čemu su bar b i c u Y .

Napomena 1.10 Može se uočiti da je mreža $\mathcal{L}(X)$ u tom slučaju Bulova mreža.

Dokaz. Prema Tvrđenju 1.32 svaki podskup Z od Y određuje jednu mrežu L iz $\mathcal{L}(X)$ ako i samo ako je $L = L_m \cup Z$, gde je $Z \subseteq Y(X)$ i iz $x, y \in Z \cup X'$ i $x \vee_D y \in Y$ sledi da $x \vee_D y \in L$. Ovaj uslov je ispunjen ako i samo ako se podgraf na slici ne javlja u $Y \cup X'$, čime je tvrđenje dokazano. ■

POGLAVLJE II

SPECIJALNI ELEMENTI BIPOLUMREŽE

2.1 UVOD I OSNOVNE DEFINICIJE O BIPOLUMREŽAMA [2,60,74,82,89,92]

U prethodnom poglavlju ispitivani su neki specijalni elementi mreže sa ciljem da se čitav mrežni zakon (distributivnost, modularnost itd.) zameni odgovarajućim svojstvom samo jednog elementa. Specijalni elementi ne zahtevaju uvek razmatranje svih svojstava mreže. Prirodno je zato takve elemente razmatrati i na slabijoj algebarskoj strukturi od same mreže.

Jerzy Plonka je 1967. godine uveo pojam kvazi mreže, kao algebre $\mathcal{A}=(A,+,\cdot)$ sa dve binarne operacije, na kojoj važe idempotentni, komutativni i asocijativni zakon za obe operacije (odnosno i $(A,+)$ i (A,\cdot) su polumreže). Ako važe i oba distributivna zakona, takva algebarska struktura nazvana je distributivna kvazi

mreža. Kvazi mreža je generalizacija pojma mreže, a distributivna kvazi mreža je generalizacija pojma distributivne mreže (kvazi mreža na kojoj važi zakon apsorpcije je mreža).

R. Padmanabhan je 1971. kvazimrežu nazvao bipolumreža (bi-semilattice), a bipolumrežu $(A, +, \cdot)$ koja ispunjava sledeće:

$$x+y=x \text{ implicira } x \cdot z + y \cdot z = x \cdot z \text{ i}$$

$$x \cdot y = x \text{ implicira } (x+z) \cdot (y+z) = x+z,$$

nazvao je kvazimreža.

On je pokazao da su kvazimreže jednakosno definibilne identitetima za bipolumreže, i

$$(x+y) \cdot z + y \cdot z = (x+y) \cdot z;$$

$$(x \cdot y + z) \cdot (x+z) = x \cdot y + z.$$

Bipolumreža $(A, +, \cdot)$ na kojoj važi identitet:

$$x+y \cdot x = (x+y) \cdot x,$$

nazvana je Birkofov sistem.

Za bipolumrežu $(A, +, \cdot)$ mogu se definisati dva parcijalna uređenja:

$$x \leq_y y \text{ akko } x \cdot y = x$$

$$x \leq_+ y \text{ akko } x+y = y.$$

Ana Romanowska je u [89], bipolumrežu sa distributivnim zakonom:

$$x \cdot (y+z) = x \cdot y + x \cdot z,$$

nazvala \cdot -distributivna bipolumreža, a onu sa zakonom

$$(x+y) \cdot (x+z) = x+y \cdot z,$$

je nazvala $+$ -distributivna bipolumreža.

Bilanac je bipolumreža $(A, +, \cdot)$ u kojoj su i $(A, +)$ i (A, \cdot) lanci.

Tačkasta \cdot -polumreža $(A, \cdot, 0)$ je \cdot -polumreža (A, \cdot) sa elementom 0 koji ima osobinu da je za svako $x \in V$, $0 \leq x$.

Tačkasta bipolumreža $(A, +, \cdot, 0)$ je bipolumreža $(A, +, \cdot)$, gde

je $(A, \cdot, 0)$ tačkasta \cdot -polumreža sa svojstvom $0 \leq_+ x$, za svako $x \in A$.

Ove definicije uvedene su u radu [92]. U nastavku će se tačkasta bipolumreža nazivati bipolumreža sa nulom, a bipolumreža $(A, +, \cdot)$ u kojoj postoji element 1, za koji važi: $x \leq_+ 1$ i $x \leq_+ 1$ za svako $x \in A$, zvaće se bipolumreža sa jedinicom.

Filter F u bipolumreži $(A, +, \cdot)$ je neprazan podskup od A za koji važi:

ako $x \in F$ i $x \leq_+ y$, onda i $y \in F$;

ako $x, y \in F$, onda i $x \cdot y \in F$.

Ako je $F \neq A$, i iz $x + y \in F$ sledi da $x \in F$ ili $y \in F$, onda je F prosti filter.

Ideal i prosti ideal se definišu analogno.

Ako je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža, i $S \subseteq A$, filter generisan skupom S je najmanji filter koji sadrži S , a to je

$\{y \in A \mid y \geq_+ x_1 \cdot \dots \cdot x_n, \text{ za neke elemente } x_i \in S\}$.

Filter generisan elementom x je $[x] = \{y \mid y \geq_+ x\}$, i obeležava se sa $[x]$.

Filter generisan jednim elementom naziva se glavni filter.

Analogno se definišu ideal generisan nekim skupom, i glavni ideal. Glavni ideal generisan elementom x je $(x)_+ = \{y \mid y \leq_+ x\}$.

Može se primetiti da ideal, odnosno filter nije u opštem slučaju i podbipolumreža, jer ne moraju biti zatvoreni u odnosu na drugu operaciju.

Dualno se definišu filter, odnosno ideal u odnosu na drugu operaciju, i obeležavaju se sa $[x]_+$ i $(x)_+$.

2.2 DEFINICIJE I OSOBINE SPECIJALNIH ELEMENATA BIPOLUMREŽE

U ovom poglavlju definišaće se i ispitivati specijalni elementi bipolumreže, i raznih klasa bipolumreže koji se ovde uvode analogno specijalnim elementima mreže, i daće se neka osnovna tvrđenja

o tim elementima, i neke teoreme reprezentacije bipolumreže preko direktnih proizvoda nekih filtara (ideala) generisanih tim specijalnim elementima.

Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža, i $a \in A$.

Kazaćemo da je element a distributivan ako za sve x i y iz L važi:

$$a+(x \cdot y) = (a+x) \cdot (a+y).$$

Element a je kodistributivan ako za sve x i y iz L važi:

$$a \cdot (x+y) = (a \cdot x) + (a \cdot y),$$

Element a je beskonačno distributivan ako za svaku familiju $\{x_i \mid i \in I\}$ elemenata iz L

$$a + \prod_{i \in I} x_i = \prod_{i \in I} (a + x_i).$$

Element a je beskonačno kodistributivan ako za svaku familiju $\{x_i \mid i \in I\}$ elemenata iz L

$$a \cdot \sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} (a \cdot x_i).$$

Element a je standardan ako za sve $x, y \in L$ važi:

$$x \cdot (a+y) = (x \cdot a) + (x \cdot y).$$

Element a je kostandardan ako za sve $x, y \in L$ važi:

$$x + (a \cdot y) = (x+a) \cdot (x+y).$$

Element a je neutralan ako za sve $x, y \in L$ važi:

$$(a \cdot x) + (x \cdot y) + (y \cdot a) = (a+x) \cdot (x+y) \cdot (y+a).$$

Lema 2.1 Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža i $x, y, z, t \in A$.

(i) $x \cdot y \leq x.$

(ii) $x \leq_+ x+y.$

(iii) Ako je $x \leq y$ i $x \leq z$, onda je $x \leq y \cdot z.$

(iv) Ako je $y \leq_+ x$ i $z \leq_+ x$, onda je $y+z \leq_+ x.$

(v) Ako je $x \leq y$ i $z \leq t$, tada je $x \cdot z \leq y \cdot t.$

(vi) Ako je $x \leq_+ y$ i $z \leq_+ t$, tada je $x+z \leq_+ y+t.$

Dokaz. Sledi jednostavno iz definicija poretka. Na primer,

(v) $x \leq y$ je ekvivalentno sa $x \cdot y = x$, a $z \leq t$ je ekvivalentno sa $z \cdot t = z$. Odatle sledi $x \cdot y \cdot z \cdot t = x \cdot z$, što je ekvivalentno sa $x \cdot z \leq y \cdot t$. ■

Lema 2.2 Ako je x kodistributivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada iz $y \geq x$ i $z \geq x$, sledi $y+z \geq x$.

Dokaz. Iz $y \cdot x = x$ i $z \cdot x = x$ sledi $y \cdot x + z \cdot x = x$, pa pošto je x kodistributivan, sledi da je $(y+z) \cdot x = x$, odnosno, $y+z \geq x$. ■

Lema 2.3 Ako je x distributivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada iz $x \geq y$ i $x \geq z$ sledi $x \geq y \cdot z$.

Dokaz. Dualno prethodnoj lemi. ■

Lema 2.4 Nula i jedinica su uvek distributivni i kodistributivni elementi u bipolumreži, nula je uvek standardan element, a jedinica kostandardan.

Dokaz. Direktno prema definicijama. ■

Tvrđenje 2.1 Ako je a kodistributivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada je filter $[a]$ podbipolumreža bipolumreže A .

Dokaz. Ako $x, y \in [a]$, tada očito $x+y \in [a]$, i $x \cdot y \in [a]$, što sledi iz Leme 2.2. ■

Važi i dualno tvrđenje:

Tvrđenje 2.2 Ako je a distributivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$, tada je ideal $(a]_+$ podbipolumreža bipolumreže A . ■

Tvrđenje 2.3 Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža, i $a \in A$. Tada su sledeći uslovi ekvivalentni:

(i) a je distributivan element i filter $[a]$ je podbipolumreža;

(ii) filter $[a]_0$ je podbipolumreža za $(A, +, \cdot)$ i preslikavanje $f: A \rightarrow [a]_0$, definisano sa $f(x) = a+x$ je homomorfizam bipolumreže A na taj filter .

Dokaz. (i) \rightarrow (ii)

Prema uslovu (i), filter $[a]_0$ je podbipolumreža, pa je definisano preslikavanje homomorfizam bipolumreža. Takođe za $x \in A$ sledi da $f(x) \in [a]_0$ (što sledi iz Leme 2.1 (i)). Dalje je, koristeći distributivnost elementa a :

$$f(x+y) = a+(x+y) = (a+x)+(a+y) = f(x)+f(y);$$

$$f(x \cdot y) = a+(x \cdot y) = (a+x) \cdot (a+y) = f(x) \cdot f(y).$$

(ii) \rightarrow (i)

$a+(x \cdot y) = f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y) = (a+x) \cdot (a+y)$, jer je f homomorfizam. ■

Tvrđenje 2.4 Ako je a distributivni elemenat bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada je binarna relacija ρ_a na A definisana sa:

$$x \rho_a y \text{ akko } a+x = a+y$$

relacija kongruencije na bipolumreži.

Dokaz. Ako je $x \rho_a y$ i $z \rho_a t$, odnosno, $a+x = a+y$ i $a+z = a+t$, tada je: $a+x+a+z = a+y+a+z$, odnosno, $a+(x+z) = a+(y+z)$, tj. $(x+z) \rho_a (y+z)$, kao i: $a+(x \cdot z) = (a+x) \cdot (a+z) = (a+y) \cdot (a+t) = a+(y \cdot t)$, tj. $(x \cdot z) \rho_a (y \cdot t)$, znači ρ_a je kongruencija. ■

Tvrđenje 2.5 Data je bipolumreža $(A, +, \cdot)$. Ako je binarna relacija ρ_a na A definisana sa: $x \rho_a y$ akko $a+x = a+y$, relacija kongruencije, tada važi sledeće: $a+(x \cdot y) = a((a+x) \cdot (a+y))$, za sve $x, y \in A$. ■

Dokaz. Iz $a+(a+x) = a+x$ sledi $(a+x) \rho_a x$. Na isti način se dobija i $(a+y) \rho_a y$. Odatle sledi $((a+x) \cdot (a+y)) \rho_a (x \cdot y)$, pa je $a+(x \cdot y) = a((a+x) \cdot (a+y))$, što je i trebalo dokazati. ■

Sledeće tvrđenje je dualno Tvrđenju 2.3.

Tvrđenje 2.6 Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža, i $a \in A$. Tada su sledeći uslovi ekvivalentni:

(i) a je kodistributivan element; i ideal $(a]_+$ je podbipolumreža;

(ii) ideal $(a]$ je podbipolumreža za $(A, +, \cdot)$ i preslikavanje $f: A \rightarrow (a]$, definisano sa $f(x) = a \cdot x$ je homomorfizam bipolumreže A na taj ideal. ■

Sledeće tvrđenje je dualno Tvrđenju 2.4:

Tvrđenje 2.7 Ako je a kodistributivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada je binarna relacija ρ_a na A definisana sa:

$$x \rho_a y \text{ akko } a \cdot x = a \cdot y$$

je relacija kongruencije na bipolumreži. ■

Lema 2.5 Neka je $(A, +, \cdot)$ proizvoljna bipolumreža. Skup svih distributivnih elemenata bipolumreže A je zatvoren u odnosu na operaciju $+$, i dualno skup svih kodistributivnih elemenata bipolumreže A je zatvoren u odnosu na \cdot .

Dokaz.

Neka su a i b distributivni elementi bipolumreže A , odnosno, $a+(x \cdot y) = (a+x) \cdot (a+y)$ i $b+(x \cdot y) = (b+x) \cdot (b+y)$ za sve $x, y \in A$. Tada je:

$$\begin{aligned} (a+b)+(x \cdot y) &= a+(b+(x \cdot y)) = a+((b+x) \cdot (b+y)) = \\ &((a+b)+x) \cdot ((a+b)+y), \text{ odnosno i } a+b \text{ je distributivni element. } \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Kod mreža važi da za svaki standardni element, kao i za svaki neutralni element važi zakon skraćivanja (Lema 1.2 i 1.3 iz I poglavlja). To kod bipolumreža nije slučaj, pa se može definisati element za koji to važi:

Element a bipolumreže $(A, +, \cdot)$ je **skrativ** ako za njega važi:

iz $a \cdot x = a \cdot y$ i $a+x = a+y$ sledi $x=y$, za sve $x, y \in A$.

U sledećem primeru element b je distributivan, kodistributivan, standardan, kostandardan, i neutralan, ali on nije skrativ.

Primer 2.1

Neka je $A = \{a, b, c\}$ i operacije $+$ i \cdot na skupu A zadate sa:

$+$	a	b	c
a	a	b	a
b	b	b	b
c	a	b	c

\cdot	a	b	c
a	a	b	b
b	b	b	b
c	b	b	c

$(A, +, \cdot)$ je bipolumreža.

Element b je distributivan, kodistributivan, standardan, kostandardan, neutralan, ali ne važi zakon skraćivanja, jer je:

$$b+a=b=b+c \text{ i } b \cdot a=b=b \cdot c, \text{ a } a \neq c.$$

Napomena 2.1 Pošto se bipolumreža sastoji od dve polumreže, dalje u primerima će se bipolumreža, kada to bude pogodno prikazivati preko dva Hasse-dijagrama njenih polumreža, pri čemu će se poredak crtati na prirodan način (tj. ako je $x \leq y$, u Hasse-dijagramu polumreže (A, \cdot) će x biti ispod y , a ako je $x \leq_+ y$, tada će na Hasse dijagramu polumreže $(A, +)$, x takode biti ispod y .

Tako će bipolumreža iz prethodnog primera biti predstavljena Hasse-dijagramom na slici 2.1



slika 2.1

2.3 TEOREMA REPREZENTACIJE ZA BIPOLUMREŽE

Sledeće tvrđenje je jedna teorema reprezentacije bipolumreže preko podmreže direktnog proizvoda ideala i filtra generisanog nekim specijalnim elementima bipolumreže.

Teorema 2.1 Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža. Element $a \in A$ je distributivan, kodistributivan i skrativ ako i samo ako je $[a] \times (a]_+$ bipolumreža i preslikavanje $g: A \rightarrow [a] \times (a]_+$ definisano sa $g(x) = (x+a, x \cdot a)$

potapanje.

Dokaz. (\longrightarrow)

Iz distributivnosti i kodistributivnosti elementa a i Tvrdjenja 2.1 i 2.2 sledi da su ideal $[a]_+$ i filter $[a]_*$ podbipolumreže, pa je $[a]_* \times [a]_+$ kao direktan proizvod dve bipolumreže i sama bipolumreža.

Neka $x \in A$. Tada $g(x) \in [a]_* \times [a]_+$, jer je $a \leq_+ x+a$, pa $x+a \in [a]_*$, i $x \cdot a \leq_* a$, pa $x \cdot a \in [a]_+$. Dalje je:

$$g(x+y) = (x+y+a, (x+y) \cdot a) = ((x+a)+(y+a), (x \cdot a)+(y \cdot a)) = (x+a, x \cdot a) + (y+a, y \cdot a) = g(x) + g(y);$$

$$g(x \cdot y) = (x \cdot y + a, (x \cdot y) \cdot a) = ((x+a) \cdot (y+a), (x \cdot a) \cdot (y \cdot a)) = (x+a, x \cdot a) \cdot (y+a, y \cdot a) = g(x) \cdot g(y).$$

Preslikavanje je injektivno, jer iz $g(x)=g(y)$, što je ekvivalentno sa $(x+a, x \cdot a) = (y+a, y \cdot a)$, sledi $x+a=y+a$ i $x \cdot a=y \cdot a$, odakle iz skrativosti elementa a sledi da je $x=y$.

(\longleftarrow)

Neka je preslikavanje $g: A \rightarrow [a]_* \times [a]_+$ definisano sa $g(x) = (x+a, x \cdot a)$ potapanje. Iz $g(x+y) = g(x) + g(y)$ sledi:

$$(x+y+a, (x+y) \cdot a) = (x+a, x \cdot a) + (y+a, y \cdot a) = ((x+a)+(y+a), (x \cdot a)+(y \cdot a)),$$

odakle zbog jednakosti uredenih parova sledi da je $(x+y) \cdot a = (x \cdot a) + (y \cdot a)$, što važi za sve $x, y \in A$, odnosno, a je kodistributivan element.

Dualno, iz $g(x+y) = g(x) + g(y)$ sledi da je a distributivan element.

Pošto je g injektivno preslikavanje, iz $g(x)=g(y)$, odnosno $(x+a, x \cdot a) = (y+a, y \cdot a)$ sledi $x=y$, što znači da je a skrativ element. ■

2.4 DEFINICIJE I KARAKTERIZACIJA APSORPTIVNIH ELEMENATA BIPOLUMREŽE

U bipolumrežama ne važe apsorptivni zakoni. Da bi se pokazala neka svojstva nekih klasa bipolumreža u vezi sa prethodno definisanim specijalnim elementima, potrebno je uvesti nekoliko novih tipova specijalnih elemenata, koji nemaju analogone kod mreža, a u vezi su sa apsorptivnim zakonima. Uvodimo zato sledeće definicije:

Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža, i $a \in A$.

Element a je $+$ -apsorptivan ako za svako $x \in A$ važi:

$$a + (x \cdot a) = a.$$

Element a je \cdot -apsorptivan ako za svako $x \in A$ važi:

$$a \cdot (x + a) = a.$$

Element a je $+$ -koapsorptivan ako za svako $x \in A$ važi:

$$x + (a \cdot x) = x.$$

Element a je \cdot -koapsorptivan ako za svako $x \in A$ važi:

$$x \cdot (a + x) = a.$$

Element a je skoro apsorptivan ako za svako $x \in A$ važi:

$$a + (x \cdot a) = (a + x) \cdot a.$$

Element a je skoro koapsorptivan ako za svako $x \in A$ važi:

$$x + (a \cdot x) = (x + a) \cdot x.$$

Element a koji je \cdot -apsorptivan i $+$ -apsorptivan je apsorptivan.

Element a koji je \cdot -koapsorptivan i $+$ -koapsorptivan je koapsorptivan.

Lema 2.6 U bipolumreži $(A, +, \cdot)$ za $a \in A$ važi sledeće:

- (i) Ako je a distributivan, tada je a skoro apsorptivan.
- (ii) Ako je a kodistributivan, tada je a skoro apsorptivan.

- (iii) Ako je a standardan, tada je a skoro apsorptivan.
- (iv) Ako je a kostandardan, tada je a skoro apsorptivan.
- (v) Ako je a neutralan, tada je a skoro apsorptivan.

Dokaz. (v) $a+(a \cdot y) = (a \cdot a)+(a \cdot y)+(y \cdot a) = (a+a) \cdot (a+y) \cdot (y+a) = a \cdot (a+y)$.

(i)-(iv) se dokazuju slično. ■

Lema 2.7 Ako je a \cdot -koapsorptivan i standardan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada je a skrativ.

Dokaz. Neka je $a+x=a+y$ i $a \cdot x=a \cdot y$. Tada je:

$$x = x \cdot (a+x) = x \cdot (a+y) = (x \cdot a)+(x \cdot y) = (y \cdot a)+(x \cdot y) = y \cdot (a+x) = y \cdot (a+y) = y.$$

Važi i dualno tvrđenje.

Lema 2.8 Ako je a $+$ -koapsorptivan i kostandardan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada je a skrativ. ■

Lema 2.9 Ako je a \cdot -apsorptivan, i ima bar jednu od sledećih osobina: distributivan, kodistributivan, standardan ili kostandardan, onda je on i $+$ -apsorptivan, odnosno, on je apsorptivan.

Dokaz. Ako je $a \cdot (a+x)=a$, tada je $a+(a \cdot x) = (a+a) \cdot (a+x) = a \cdot (a+x) = a$ ■

Važi i dualno tvrđenje.

Lema 2.10 Ako je a standardan i apsorptivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada je a distributivan.

Dokaz. $(a+x) \cdot (a+y) = ((a+x) \cdot a)+((x+a) \cdot y) = a+(a \cdot y)+(x \cdot y) = a+(x \cdot y)$, koristeći, redom, standardnost elementa a , pa apsorptivnost i standardnost i ponovo apsorptivnost. ■

Važi i dualno tvrđenje.

Lema 2.11 Ako je a kostandardan i apsorptivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$, tada je on kodistributivan. ■

Lema 2.12. Ako je a apsorptivan element bipolumreže $(A, +, \cdot)$ tada iz $x \in [a]_+$ i $y \in [a]$, sledi $x \leq_+ y$ i $x \leq_- y$. ■

Dokaz. Neka je $x \leq_+ a$, i $a \leq_+ y$. Tada je $x+y = (x \cdot a) + a + y = a + y = y$. Slično je $x \cdot y = (x \cdot a) \cdot (a + y) = x \cdot a = x$, odakle slede tražene nejednakosti. ■

2.5 TEOREMA REPREZENTACIJE BIPOLUMREŽE PREKO DIREKTOG PROIZVODA

Dalje, da bi se dala teorema reprezentacije bipolumreže u obliku direktnog proizvoda nekih njenih podbipolumreža, potrebno je uvesti još neke definicije.

Neka je $(A, +, \cdot, 0, 1)$ bipolumreža sa nulom i jedinicom. Element $x' \in A$ je komplement elementa x , ako je ispunjeno sledeće:

$$x \cdot x' = 0 \text{ i } x + x' = 1.$$

Tvrđenje 2.8 U bipolumreži $(A, +, \cdot, 0, 1)$ sa nulom i jedinicom svaki standardni element koji ima komplement, ima jedinstven komplement. Takođe i svaki kostandardni element sa komplementom ima jednoznačan komplement.

Dokaz. Neka je x kostandardan element sa komplementima x' i x'' , odnosno, neka je $x \cdot x' = 0$ i $x + x' = 1$, i $x \cdot x'' = 0$ i $x + x'' = 1$. Tada je:

$$x' = x' + 0 = x' + (x \cdot x'') = (x' + x) \cdot (x' + x'') = (x'' + x) \cdot (x'' + x') = x'' + (x \cdot x') = x'' + 0 = x''.$$

Znači, komplement je jedinstven.

Slično se pokazuje i za standardan element. ■

Sledeće tvrđenje je Teorema reprezentacije bipolumreže preko

direktnog proizvoda njenih podbipolumreža.

Teorema 2.2 Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža sa jedinicom i nulom, i neka je a distributivan, kodistributivan, skrativ, komplementiran i $(\cdot -$ ili $+ -)$ apsorptivan element bipolumreže A . Tada je preslikavanje $g: A \rightarrow [a]_x \times [a]_+$ definisano sa $g(x) = (x+a, x \cdot a)$ izomorfizam.

Dokaz. U Teoremi 2.1 dokazano je da je preslikavanje g potapanje. Još treba pokazati da je g surjektivno preslikavanje.

Neka je b komplement elementa a , i neka je (y, x) proizvoljan element iz $[a]_x \times [a]_+$. Pokazaće se da se na taj element preslikavanjem g preslikava element $z = x + (y \cdot b)$. Zaista,

$$z \cdot a = (x + (y \cdot b)) \cdot a = (x \cdot a) + (y \cdot b \cdot a) = (x \cdot a) + (y \cdot 0) = x \cdot a + 0 = x \cdot a = x$$
 (koristeći kodistributivnost elementa a , osobine nule, komplementa, i činjenice da $x \in [a]_+$. Takođe je:

$$z + a = (x + (y \cdot b)) + a = x + (y \cdot a) + (b + a) = x + ((y + a) \cdot (b + a)) = x + ((y + a) \cdot 1) = x + y + a = (x \cdot a) + a + y = a + y = y$$
 (koristeći distributivnost elementa a , osobine komplementa, jedinice i apsorptivnosti elementa a). Ovim je pokazano da je g izomorfizam. ■


Primer 2.2 Data je bipolumreža $(A, +, \cdot)$, gde je $A = \{0, 1, x, y, z, u, v, w\}$ (slika 2.2)



slika 2.2

Ova bipolumreža ima nulu i jedinicu, a element v je distributivan, kodistributivan, skrativ, ima komplement (y) , i apsorptivan je, tako da zadovoljava uslove prethodnog tvrdenja.

Bipolumreža $(A, +, \cdot)$ može se predstaviti u obliku direktnog proizvoda filtra $[v]$ i ideala $(v]$ (koji su podbipolumreže, i prikazani su na slici 2.3)



slika 2.3

Pretpostavimo da se neka bipolumreža sa jedinicom i nulom može predstaviti u obliku direktnog proizvoda dve bipolumreže. Može se pokazati da te dve bipolumreže takode imaju jedinicu i nulu. Zaista, ako je $(A, +, \cdot) = (B, +, \cdot) \times (C, +, \cdot)$ (skraćeno, $A=B \times C$) i $1=(b_1, c_1)$, tada je $(b_1, c_1) \geq_+(x, y)$, za sve $(x, y) \in B \times C$, pa je $(b_1, c_1) + (x, y) = (b_1, c_1)$, odnosno $b_1 + x = b_1$ i $c_1 + y = c_1$, pa je $b_1 \geq_+ x$ i $c_1 \geq_+ y$. Na sličan način, iz $(b_1, c_1) \geq_.(x, y)$ za sve $(x, y) \in B \times C$, sledi $b_1 \geq_.(x, y)$ i $c_1 \geq_.(x, y)$. Znači, b_1 je jedinica bipolumreže B , a c_1 je jedinica bipolumreže C . Ako je (b_0, c_0) nula bipolumreže A , analogno se pokazuje da je b_0 nula bipolumreže B , a c_0 nula bipolumreže C .

Posmatramo elemente $a=(b_0, c_1)$ i $a'=(b_1, c_0)$ iz $A=B \times C$. Ti elementi su jedan drugom komplementi, jer je $(b_0, c_1) \cdot (b_1, c_0) = (b_0, c_0) = 0$, i $(b_0, c_1) + (b_1, c_0) = (b_1, c_1) = 1$. Element a je kodistributivan, jer:

$$\begin{aligned} (b_0, c_1) \cdot ((x, y) + (z, t)) &= (b_0 \cdot (x+z), c_1 \cdot (y+t)) = ((b_0 \cdot x) + (b_0 \cdot z), \\ (c_1 \cdot y) + (c_1 \cdot t)) &= (b_0 \cdot x, c_1 \cdot y) + (b_0 \cdot z, c_1 \cdot t) = ((b_0, c_1) \cdot (x, y)) + ((b_0, c_1) \cdot \\ (z, t)). \end{aligned}$$

(Iskorišćena je Lema 2.4 po kojoj su nula i jedinica kodistributivni elementi).

Analogno se pokazuje da je element a distributivan.

Dalje se može pokazati skrativost elementa a . Neka je $(b_0, c_1) \cdot (x, y) = (b_0, c_1) \cdot (z, t)$ i $(b_0, c_1) + (x, y) = (b_0, c_1) + (z, t)$. Odatle sledi da je $(b_0, y) = (b_0, t)$ i $(x, c_1) = (z, c_1)$, odakle je $y=t$ i $x=z$, tj. $(y, x) = (t, z)$.

Element a je \cdot -apsorptivan, jer: $(b_0, c_1) \cdot ((b_0, c_1) + (x, y)) = (b_0, c_1) \cdot (x, c_1) = (b_0, c_1)$. Na sličan način pokazuje se da je a i $+$ -apsorptivan.

Pošto je a distributivan i kodistributivan element bipolumreže L , ideal $(a]_+$ i filter $[a)$, su podbipolumreže te bipolumreže. Takođe se pokazuje da je ideal $(a]_+$ izomorfan sa bipolumrežom C . Zaista, preslikavanje $f: C \rightarrow (a]_+$ definisano sa $f(x) = (b_0, x)$ je izomorfizam. Za svako $x \in C$ važi $(b_0, x) \leq (b_0, c_1) = a$, tj. $(b_0, x) \in (a]_+$. Za svako $x, y \in C$ je $f(x) \cdot f(y) = (b_0, x) \cdot (b_0, y) = (b_0, x \cdot y) = f(x \cdot y)$ i $f(x) + f(y) = (b_0, x) + (b_0, y) = (b_0, x + y) = f(x + y)$. f je injektivno preslikavanje, jer iz $f(x) = f(y) \iff (b_0, x) = (b_0, y)$, sledi $x = y$. Dalje, neka $(b_0, x) \in (a]_+$, tada je $x \leq c_1$ i $x \in C$.

Na sličan način se pokazuje da je i filter $[a)$ izomorfan sa bipolumrežom B .

Gornje razmatranje i prethodna teorema pokazuju sledeće tvrđenje:

Teorema 2.3 Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža sa nulom (0) i jedinicom (1) . Postoji uzajamno jednoznačno preslikavanje između svih razlaganja bipolumreže A u obliku direktnog proizvoda dve bipolumreže i svih elemenata bipolumreže A koji su distributivni, kodistributivni, skrativi, apsorptivni i imaju komplemente. ■

Bipolumreža $(A, +, \cdot)$ je direktno nerazloživa ako se ne može predstaviti u obliku $B \times C$, gde su $(B, +, \cdot)$ i $(C, +, \cdot)$ bipolumreže sa više od jednog elementa.

Dužina bipolumreže $(A, +, \cdot)$ je dužina dužeg lanca od najdužih

lanaca u polumrežama $(A,+)$ i (A,\cdot) .

Teorema 2.4 Svaka bipolumreža sa nulom i jedinicom konačne dužine izomorfna je direktnom proizvodu direktno nerazloživih bipolumreža.

Dokaz. Sledi iz prethodne teoreme, i činjenice da kada je $A=B \times C$, za bipolumreže A, B i C da je dužina bipolumreža B i C uvek strogo manja od dužine bipolumreže A . ■

2.6 IDENTITETI NA BIPOLUMREŽI

U sledećem delu će se ispitivati problemi koji su ekvivalentni problemima rešenim u poglavlju I za mreže: ako identitet važi na nekom idealu (filtru) u bipolumreži, kada on važi na celoj bipolumreži.

U tom cilju, na analogan način kao kod mreža (indukcijom po broju operacija u termu f) mogu se pokazati sledeće leme:

Lema 2.13 Ako je a distributivan element bipolumreže $(A,+,\cdot)$ i $f(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljan term (na jeziku bipolumreže), za sve $x_1, \dots, x_n \in A$,

$$f(x_1, \dots, x_n) + a = f(x_1 + a, \dots, x_n + a). \quad \blacksquare$$

Lema 2.14 Ako je a kodistributivan element bipolumreže A i $f(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljan term, za sve $x_1, \dots, x_n \in A$

$$f(x_1, \dots, x_n) \cdot a = f(x_1 \cdot a, \dots, x_n \cdot a). \quad \blacksquare$$

Sledeće tvrđenje govori o prenošenju proizvoljnog identiteta sa $(a)_\cdot$ i $(a)_+$ na celu bipolumrežu A ($a \in A$).

Tvrđenje 2.9 Ako je a distributivan, kodistributivan i skrativ element bipolumreže A tada proizvoljni mrežni identitet važi na A ako

i samo ako važi na filtru $[a]_+$ i idealu $[a]_+$.

Dokaz. (\longrightarrow)

Pošto je element a distributivan i kodistributivan, prema Tvrdenjima 2.1 i 2.2 sledi da su filter $[a]_+$ i ideal $[a]_+$ podbipolumreže bipolumreže A , pa ako mrežni identitet važi na A , tada svakako važi i na $[a]_+$ i $[a]_+$.

(\longleftarrow)

Neka identitet $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ važi na $[a]_+$ i na $[a]_+$.

Tada za $y_1, \dots, y_n \in A$:

$$f(y_1 \cdot a, \dots, y_n \cdot a) = g(y_1 \cdot a, \dots, y_n \cdot a), \text{ jer } y_i \cdot a \in [a]_+, \text{ i}$$

$$f(y_1 + a, \dots, y_n + a) = g(y_1 + a, \dots, y_n + a), \text{ jer } y_i + a \in [a]_+.$$

Prema Lemama 2.13 i 2.14 sledi da je:

$$f(y_1, \dots, y_n) \cdot a = g(y_1, \dots, y_n) \cdot a, \text{ i}$$

$$f(y_1, \dots, y_n) + a = g(y_1, \dots, y_n) + a, \text{ pa iz skrativosti}$$

elementa a sledi da je:

$$f(y_1, \dots, y_n) = g(y_1, \dots, y_n). \quad \blacksquare$$

Napomena 2.2 Prethodno tvrđenje sledi i direktno iz Teoreme 2.2 (o potapanju), jer pošto je element a distributivan, kodistributivan i skrativ element bipolumreže A bipolumreža A može se potopiti u $[a]_+ \times [a]_+$. Stoga ako neki identitet važi na $[a]_+ \times [a]_+$, on važi i na A .

Posledica 2.1 Neka je $(A, +, \cdot)$ bipolumreža i $a \in A$ distributivan, kodistributivan i skrativ element. Ako su $[a]_+$ i $[a]_+$, redom, kvazimreža, Birkofov sistem, \cdot -distributivna, ili $+$ -distributivna bipolumreža, tada je i A , redom, kvazimreža, Birkofov sistem, \cdot -distributivna, ili $+$ -distributivna bipolumreža. \blacksquare

POGLAVLJE III

PRIMENE U ALGEBRI: MREZE KONGRUENCIJA, PODALGEBRI, SLABIH KONGRUENCIJA

3.1 MREŽE SLABIH KONGRUENCIJA I NEKA SVOJSTVA ALGEBRI (CEP, CIP, wCIP, *CIP) [4, 7, 21, 104, 105, 107, 120-123, 127, 130]

Data je algebra $\mathcal{A}=(A,F)$, gde je A neprazan skup (nosač), a F familija finitarnih operacija na skupu A . Kongruencija ρ algebre \mathcal{A} je relacija ekvivalencije na skupu A koja je i kompatibilna (saglasna sa operacijama), što znači da za svaku operaciju $f \in F$ ranga n ($n > 0$), i za sve $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in A$ važi da iz $x_1 \rho y_1, \dots, x_n \rho y_n$ sledi $f(x_1, \dots, x_n) \rho f(y_1, \dots, y_n)$, a za svaku nularnu operaciju (konstantu) $c \in F$ važi da je $c \rho c$). Skup svih kongruencija jedne algebre u odnosu na inkluziju čini algebarsku mrežu (koja se obeležava sa $\text{Con}\mathcal{A}$). Skup svih poduniverzuma jedne algebre (poduniverzum je podskup nosača te algebre koji je zatvoren u odnosu na operacije) je, u odnosu na skupovnu inkluziju takode algebarska mreža, i označava se sa $\text{Sub}\mathcal{A}$. Slaba kongruencija ρ algebre \mathcal{A} je simetrična, tranzitivna i kompatibilna relacija na algebri \mathcal{A} (ovaj pojam prvi je definisao Tran Duc Mai [120-123] pod nazivom kongruencije u algebri, i ispitivao ih je za

grupe i Ω -grupe). Ovde će se pod slabim kongruencijama (po dogovoru i zbog jednostavnosti) posmatrati sve relacije kongruencije na podalgebrama algebre \mathcal{A} , sa dodatkom \emptyset , ali samo ako se time kompletira mreža. (Ako je mreža podalgebri već i sama kompletna mreža \emptyset se neće dodavati kao "rep" toj mreži). Ova konvencija je već uvedena, mada i nedovoljno objašnjena, u radu [130], u kome je i prvi put uveden naziv slaba kongruencija.

Za proizvoljnu algebru \mathcal{A} sa $Cw\mathcal{A}$ označava se familija svih slabih kongruencija algebre \mathcal{A} . Pošto je familija $Cw\mathcal{A}$ zatvorena u odnosu na preseke i sadrži najveći elemenat (A^2 je takode slaba kongruencija), sledi da je $(Cw\mathcal{A}, \leq)$ kompletna mreža.

Lema 3.1 [130] $(Cw\mathcal{A}, \leq)$ je algebarska mreža.

Dokaz. Neka je \mathcal{A} algebra. Posmatramo skup $A \times A$ i na njemu definišemo operacije:

za svaku n -arnu operaciju $f \in F$ ($n \neq 0$).

$$f((a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)) = (f(a_1, \dots, a_n), f(b_1, \dots, b_n)).$$

Definišemo i nularne operacije (c, c) , za svaku konstantu c iz A (nularnu operaciju iz F).

Zbog simetričnosti uvodimo novu unarnu operaciju s :

$$s((a, b)) = (b, a),$$

kao i binarnu operaciju t koja očuvava tranzitivnost:

$$t((a, b), (c, d)) = \begin{cases} (a, d), & \text{ako je } b=c, \\ (a, b), & \text{u ostalim slučajevima.} \end{cases}$$

Neposredno se proverava da se podalgebre ove algebre $(A \times A, F \cup \{t, s\})$ poklapaju sa slabim kongruencijama na \mathcal{A} . Budući da je mreža podalgebri algebarska, algebarska je i mreža $Cw\mathcal{A}$. ■

Data je algebra \mathcal{A} i neka je $Cw\mathcal{A}$ njena mreža slabih kongruencija. Istaknutu ulogu u $Cw\mathcal{A}$ ima dijagonala: $\Delta = \{(x, x) \mid x \in A\}$.

Lema 3.2 Δ je beskonačno kodistributivan elemenat mreže $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. Neka je $\{\rho_i | i \in I\}$ proizvoljna familija slabih kongruencija algebre \mathcal{A} . Treba pokazati da je:

$$\Delta \wedge \bigvee_{i \in I} \rho_i = \bigvee_{i \in I} (\Delta \wedge \rho_i).$$


Neka $\rho_i \in \text{Con } \mathcal{B}_i$, za $\mathcal{B}_i \in \text{Sub } \mathcal{A}$, za svako i . Tada je $\bigvee_{i \in I} \rho_i$ kongruencija na podalgebri $\bigvee_{i \in I} \mathcal{B}_i$, pa je $\Delta \wedge \bigvee_{i \in I} \rho_i = \{(x, x) | x \in \bigvee_{i \in I} \mathcal{B}_i\}$.

Sa druge strane, $\Delta \wedge \rho_i = \{(x, x) | x \in \mathcal{B}_i\}$, pa je $\bigvee_{i \in I} (\Delta \wedge \rho_i) = \bigvee_{i \in I} \{(x, x) | x \in \mathcal{B}_i\}$, odnosno, tražena jednakost je ispunjena. ■

Tvrđenje 3.1 [130] Neka je $Cw\mathcal{A}$ mreža slabih kongruencija algebre \mathcal{A} , i Δ dijagonala. Mreža kongruencija algebre \mathcal{A} ($\text{Con } \mathcal{A}$) je podmreža mreže $Cw\mathcal{A}$ i $\text{Con } \mathcal{A} = [\Delta]$, a mreža podalgebri algebre \mathcal{A} ($\text{Sub } \mathcal{A}$) je izomorfna sa idealom (Δ) , u odnosu na izomorfizam $\mathcal{B} \rightarrow \{(x, x) | x \in \mathcal{B}, \mathcal{B} \in \text{Sub } \mathcal{A}\}$. Štaviše, za svaku podalgebru \mathcal{B} algebre \mathcal{A} , njena mreža kongruencija $\text{Con } \mathcal{B}$ je interval $[\Delta_{\mathcal{B}}, \mathcal{B}^2]$, gde je $\Delta_{\mathcal{B}} = \{(x, x) | x \in \mathcal{B}\}$. ■

Iz ovog tvrđenja sledi da se u mreži slabih kongruencija neke algebre nalaze istovremeno i mreža podalgebri i mreža kongruencija te algebre i svih njenih podalgebri. Znači sva svojstva algebre pokazana sredstvima ovih mreža ($\text{Sub } \mathcal{A}$ i $\text{Con } \mathcal{A}$) mogu se pokazati i pomoću mreže $Cw\mathcal{A}$, a mreža $Cw\mathcal{A}$ je još sveobuhvatnija nego te dve mreže, i mnoga druga algebarska svojstva se mogu proučavati metodima mreže slabih kongruencija.

Na slici 3.1 je šematski prikazan odnos mreža slabih kongruencija, kongruencija, podalgebri i kongruencija na podalgebri.



Slika 3.1

Iz Leme 1.1' iz Poglavlja I sledi da je preslikavanje $m_a: \rho \rightarrow \rho \wedge \Delta$ homomorfizam iz CwA u $(\Delta]$, koji određuje relaciju kongruencije na CwA . U jednoj klasi kongruencije su sve one slabe kongruencije, koje su istovremeno i kongruencije na istoj podalgebri (zadovoljavaju $\rho \wedge \Delta = \theta \wedge \Delta$). Svaka takva klasa kongruencije ima najveći element (ako je \mathcal{B} odgovarajuća podalgebra najveći element te klase je, kao što smo gore naveli, B^2 kad se posmatra kao kongruencija na B).

Napomena 3.1 Budući da se $SubA$ potapa u CwA , odgovarajuće slike podalgebri- dijagonalne relacije često ćemo obeležavati kao same podalgebre: pišaćemo \mathcal{B} umesto $\Delta_{\mathcal{B}}$, ako je \mathcal{B} podalgebra od A .

U sledećem delu biće navedene definicije nekih od osnovnih svojstava algebri, koja će se karakterisati metodama mreže slabih kongruencija.

Algebra A ima svojstvo proširenja kongruencija (CEP) ako je svaka kongruencija na podalgebri od A restrikcija kongruencije na A .

Algebra A ima svojstvo preseka kongruencija (CIP) ako za sve $\rho, \theta \in CwA$ važi da je:

$$(\rho \cap \theta)_A = \rho_A \cap \theta_A,$$

gde je ρ_A najmanja kongruencija na A koja sadrži ρ . [130].

Algebra A ima beskonačno svojstvo preseka kongruencija (*CIP) ako za svaku familiju $\{\rho_i \mid i \in I\} \subseteq CwA$, važi:

$$\left(\bigcap_{i \in I} \rho_i \right)_A = \bigcap_{i \in I} (\rho_i)_A.$$

Algebra A ima jako svojstvo proširenja kongruencija (strong CEP) ako za svaku $\rho \in CwA$ $\rho \vee \Delta \in CwA$.

Očigledno, ako algebra ima jako svojstvo proširenja kongruencija, ona ima i svojstvo proširenja kongruencija. Obratno ne mora da važi, na primer Hamiltonove grupe imaju CEP, a nemaju jaki CEP. Očigledno je da jako svojstvo proširenja kongruencija implicira i CIP, kao i *CIP.

Algebra A ima slabo svojstvo preseka kongruencija (wCIP) ako za

svako $\rho \in \text{CwA}$ i svako $\theta \in \text{ConA}$ važi da je

$$(\rho \circ \theta)_A = \rho_A \circ \theta. [130].$$

Ako algebra ima CIP, ne mora da ima i *CIP, što pokazuje sledeći primer:

Primer 3.1

Neka je N skup prirodnih brojeva, i $\oplus_k, k \in N$, binarne operacije na skupu N , i $f_i, i \in N$, unarne operacije na skupu N , definisane sa:

$$x \oplus_1 y = \begin{cases} 1, & \text{za } x=y=1; \\ x+y-2, & \text{za } x>1 \text{ ili } y>1. \end{cases}$$

$$x \oplus_k y = \begin{cases} k, & \text{za } x \leq k, y \leq k; \\ x+y-(k+1) & \text{za } x > k \text{ ili } y > k \end{cases} \quad k \in N \setminus \{1\}.$$


$$f_i(x) = \begin{cases} x, & \text{za } x=i, \\ x+1, & \text{za } x \neq i \end{cases} \quad i \in N.$$

Algebra $(N, \oplus_k (k \in N), f_i (i \in N))$ ima svojstvo CIP, a nema *CIP.

Zaista, podalgebre ove algebre su : $N_k = \{x | x > k\}$, za $k \in N$.

Kongruencije algebre $(N, f_i (i \in N))$, su sledeće: $\rho_k = \{\{1\}, \dots, \{k\}, \{k+1, k+2, \dots\}\}$, za $k \in N$, a te kongruencije nisu saglasne sa \oplus_1 , jer iz $1 \rho_k 1$ i $k+1 \rho_k k+2$ sledilo bi $(1 \oplus_1 (k+1)) \rho_k (1 \oplus_1 (k+2))$, odnosno, $k \rho_k k+1$, što nije tačno. Znači, jedine kongruencije algebre $(N, \oplus_k (k \in N), f_i (i \in N))$ su Δ i N^2 .

Jedine kongruencije na podalgebrama $N_k (k \in N)$ su Δ_{N_k} i N_k^2 , što se utvrđuje na isti način. Znači, mreža slabih kongruencija je prikazana na slici 3.2:



Slika 3.2

CIP očigledno važi, a *CIP ne, jer je:

$$\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} N_k^2\right) \vee \Delta = 0 \vee \Delta = \Delta \neq N^2 = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} (N_k^2 \vee \Delta). \quad \blacksquare$$

Pošto je u mreži CwA $\rho_A = \rho \vee \Delta$, važi sledeće:

Lema 3.3 Algebra A ima CIP ako i samo ako je Δ distributivni element u mreži CwA . ■

Lema 3.3' Algebra A ima *CIP ako i samo ako je Δ beskonačno distributivni element u mreži CwA . ■

Lema 3.3" Algebra A ima slabi CIP ako i samo ako je Δ modularan element u mreži CwA . ■

Sledeća tvrđenja su posledice mrežnih tvrđenja iz poglavlja I:

Tvrđenje 3.2 Sledeći uslovi su ekvivalentni za algebru A :

- (0) A ima CEP.
- (i) Za $\rho, \theta \in CwA$ iz $\rho \vee \Delta = \theta \vee \Delta$ i $\rho \wedge \Delta = \theta \wedge \Delta$ sledi $\rho = \theta$.
- (ii) Δ je komodularan element mreže CwA .
- (iii) Za $\rho \in CwA$ i $B \in \text{Sub}A$, iz $\rho \leq B^2$ sledi

$$\rho \vee (\Delta \wedge B^2) = (\rho \vee \Delta) \wedge B^2.$$
- (iv) Δ je kostandardan element mreže CwA .

Dokaz.

Pošto je Δ kodistributivan element mreže CwA i klase kongruencije indukovane homomorfizmom $n_A: \rho \rightarrow \rho \wedge \Delta$ imaju najveće elemente (ti najveći elementi su kvadrati podalgebri), primenom Tvrđenja 1.5 iz poglavlja I dobija se da su uslovi (i)-(iv) ekvivalentni.

(iii) \rightarrow (0)

Neka algebra A nema CEP, odnosno, neka postoji podalgebra B i na njoj kongruencija ρ , takva da ρ nije restrikcija neke kongruencije na A . Pošto $\rho \in \text{Con}B$, važi da je $B^2 \wedge \Delta \leq \rho \leq B^2$, pa je $\rho \vee (\Delta \wedge B^2) = \rho$. $\rho \vee \Delta \in \text{Con}A$, pa je $(\rho \vee \Delta) \wedge B^2$ restrikcija kongruencije $\rho \vee \Delta$ na B , što je po pretpostavci različito od ρ , pa je $\rho \vee (\Delta \wedge B^2) \neq (\rho \vee \Delta) \wedge B^2$.

(0) \rightarrow (i)

Pretpostavimo da postoje $\rho, \theta \in CwA$, takve da je $\rho \vee \Delta = \theta \vee \Delta$ i $\rho \wedge \Delta = \theta \wedge \Delta$ i $\rho \neq \theta$. Sledi da su ρ i θ iz iste $ConB$, za $B \in SubA$. Bez gubljenja opštosti možemo pretpostaviti da je $\rho < \theta$ (ista svojstva kao i ρ i θ imaju ρ i $\rho \vee \theta$, na pr.). Pokazaćemo da ρ nije restrikcija nijedne kongruencije na A .

Ako je ρ restrikcija kongruencije $\sigma \in ConA$, onda je ona restrikcija i kongruencije $\rho \vee \Delta$ (zaista, iz $\sigma \geq \rho$ i $\sigma \geq \Delta$ sledi $\sigma \geq \rho \vee \Delta$, pa iz $B^2 \wedge \sigma \geq B^2 \wedge (\rho \vee \Delta) \geq \rho$ i $B^2 \wedge \sigma = \rho$ proizilazi $B^2 \wedge (\rho \vee \Delta) = \rho$). Međutim, $B^2 \wedge (\rho \vee \Delta) = B^2 \wedge (\theta \vee \Delta) \geq \theta > \rho$. Kontradikcija. Dakle A nema CEP. ■

Posledica 3.1 Algebra A ima CEP i CIP ako i samo ako je Δ neutralan element u mreži CwA .

Dokaz. Δ je uvek kodistributivan element u CwA , svojstvo CIP je ekvivalentno sa distributivnošću, a CEP sa zakonom skraćivanja, pa prema Lemi 1.3 iz Poglavlja I sledi traženo tvrđenje. ■

Posledica 3.2 Ako je CwA modularna mreža, tada algebra A ima CEP i CIP.

Dokaz. Prema Lemi 1.6 iz Poglavlja I u modularnoj mreži element je neutralan ako i samo ako je distributivan ili kodistributivan. Kako je Δ uvek kodistributivan element, Δ je i neutralan element, pa prema prethodnoj posledici algebra ima CEP i CIP. ■

Lema 3.4 Ako algebra A ima CEP svaka podalgebra B algebre A ima CEP. ■

Tvrđenje 3.3 Algebra A ima *CIP ako i samo ako za svaku kongruenciju $\theta \in ConA$, familija $\{\rho \in CwA \mid \rho \geq \theta\}$ ima najmanji element.

Dokaz. Prema Lemi 3.3' Δ je beskonačno distributivni

elemenat u mreži CwA , pa dokaz sledi direktno iz Tvrdjenja 1.8, iz poglavlja I. ■

Tvrdjenje 3.4 Algebra A ima *CIP ako i samo ako su zadovoljeni sledeći uslovi:

(i) za svako $\theta \in \text{Con}A$, familija $\{\rho \in CwA \mid \rho_A = \theta\}$ ima najmanji elemenat;

(ii) A ima slabi CIP.

Dokaz. Sledi iz Tvrdjenja 1.9 iz poglavlja I. ■

Tvrdjenje 3.5 [127] Algebra A ima CEP i CIP ako i samo ako je preslikavanje $f: CwA \rightarrow \text{Sub}A \times \text{Con}A$ definisano sa: $f(\rho) = (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ potapanje. ■

Dokaz. Sledi iz Posledice 1.1 i Leme 1.3 iz Poglavlja I. ■

Sledeće tvrdjenje daje potrebne i dovoljne uslove za preslikavanje f iz prethodnog tvrdjenja da bude izomorfizam:

Tvrdjenje 3.6 [127] Za algebru A , preslikavanje $f: CwA \rightarrow \text{Sub}A \times \text{Con}A$ definisano sa: $f(\rho) = (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ je izomorfizam ako i samo ako algebra A ima CEP i CIP i Δ je komplementiran elemenat u mreži CwA .

Dokaz. Sledi iz Leme 1.5 iz Poglavlja I (o centru). ■

Posledica 3.3 [127] Za algebru A , preslikavanje $f: CwA \rightarrow \text{Sub}A \times \text{Con}A$ definisano sa: $f(\rho) = (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ je izomorfizam ako i samo ako je mreža kongruencija $\text{Con}B$, za svako $B \in \text{Sub}A$ izomorfna sa mrežom kongruencija $\text{Con}A$ u odnosu na preslikavanje $\rho \rightarrow \rho \vee \Delta$. ■

Dalje, može se ispitati kada je elemenat Δ (\wedge -, \vee -) neprekidan elemenat u mreži slabih kongruencija. Očigledno je da ako algebra A ima *CIP da je tada Δ \vee -neprekidan elemenat mreže CwA . Obratno ne mora

da važi, jer je Δ \vee -neprekidan element u svakoj konačnoj mreži, ali Δ ne mora da bude distributivan, pa ni beskonačno distributivan element. Ali, ako je Δ \vee -neprekidan i distributivan, tada je on takode i beskonačno distributivan.

Sledeća dva tvrđenja su direktne posledice Tvrđenja 1.10 iz poglavlja I.

Tvrđenje 3.7 Za proizvoljnu algebru \mathcal{A} Δ je \wedge -neprekidan element mreže $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. Prema tvrđenju dualnom Tvrđenju 1.10 element je \wedge -neprekidan i kodistributivan ako i samo ako je beskonačno kodistributivan. Kako je Δ uvek beskonačno kodistributivan element, on je i Δ -neprekidan. ■

Tvrđenje 3.8 Algebra \mathcal{A} ima *CIP ako i samo ako ona ima CIP i Δ je \vee -neprekidan element mreže $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. *CIP je ekvivalentan sa beskonačnom distributivnošću, a CIP sa distributivnošću elementa Δ , pa je tvrđenje posledica Tvrđenja 1.10. ■

3.2 KADA JE MREŽA $Cw\mathcal{A}$ PODMREŽA MREŽE $Ew\mathcal{A}$, A KADA SE SA NJOM POKLAPA? [110]

Poznato je da je mreža kongruencija algebre \mathcal{A} uvek podmreža mreže ekvivalencija algebre \mathcal{A} . Međutim, za mrežu slabih kongruencija to nije uvek slučaj. Naime, mreža $Cw\mathcal{A}$ nije u opštem slučaju podmreža mreže $Ew\mathcal{A}$ (mreže slabih ekvivalencija, odnosno mreže svih simetričnih i tranzitivnih relacija na skupu A , odnosno mreže particija u skupu A).

U sledećem delu dati su potrebni i dovoljni uslovi pod kojima je mreža $Cw\mathcal{A}$ podmreža mreže $Ew\mathcal{A}$, i potrebni i dovoljni uslovi pod kojima se te dve mreže poklapaju.

Odmah se može uočiti (što će biti primenjeno u sledećim

tvrdenjima) da je infimum u mrežama EwA i CwA isti, i da je to presek).

Sa EA označena je mreža relacija ekvivalencije na skupu A .

Lema 3.5 Ako je $A \neq \emptyset$ i $\rho \in EwA$, tada je $\rho \cup \Delta$ element EA . ■

Tvrđenje 3.9 Dijagonala Δ je neutralni element u mreži EwA .

Dokaz.

Neka $\rho, \theta \in EwA$. Tada je:

$$(\Delta \wedge \rho) \vee (\Delta \wedge \theta) = (\Delta \wedge \rho) \vee (\Delta \wedge \theta) = (\Delta \wedge \rho) \cup (\Delta \wedge \theta) = \Delta \wedge (\rho \cup \theta) = \Delta \wedge (\rho \vee \theta),$$

pošto se infimum poklapa sa presekom, supremum dve dijagonalne relacije sa unijom, i $\rho \cup \theta$ i $\rho \vee \theta$ su ekvivalencije na istim podalgebrama. Znači, Δ je kodistributivan.

Prema sličnom razmatranju, i prema Lemi 3.5, dobija se da je:

$$\Delta \vee (\rho \wedge \theta) = \Delta \vee (\rho \wedge \theta) = (\Delta \vee \rho) \wedge (\Delta \vee \theta) = (\Delta \vee \rho) \wedge (\Delta \vee \theta),$$

pa je Δ distributivan element.

Iz $\rho \wedge \Delta = \theta \wedge \Delta$ i $\rho \vee \Delta = \theta \vee \Delta$, sledi da je $\rho = \theta$, jer je $(\mathcal{P}(A \times A), \cap, \cup)$ distributivna mreža, a zakon skraćivanja (iz $x \wedge z = y \wedge z$ i $x \vee z = y \vee z$ sledi $x = y$) je ekvivalentan sa distributivnošću u mreži.

Prema Lemi 1.3 iz Poglavlja I sledi da je Δ neutralan element. ■

Posledica 3.4. Preslikavanje $\rho \rightarrow (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ je potapanje iz EwA u $\mathcal{P}(A) \times EA$.

Dokaz. Sledi iz neutralnosti elementa Δ , Leme 1.3 iz poglavlja I i činjenice da je $\mathcal{P}(A) \cong [\Delta]$ u odnosu na preslikavanje $B \rightarrow \{(x, x) \mid x \in B\}$, za $B \subseteq A$, i $[\Delta] = EA$. ■

Posledica 3.5 Proizvoljni mrežni identitet važi na EwA ako i samo ako važi na EA .

Dokaz. Δ je neutralni element mreže EwA, pa mrežni identitet važi na EwA ako i samo ako važi na EA i $\mathcal{P}(A)$, a poznato je da identitet važi na Bulovoj algebri ako i samo ako važi na dvoelementnoj. ■

Tvrđenje 3.10 Δ je beskonačno distributivni element u mreži slabih ekvivalencija EwA, proizvoljnog skupa A.

Dokaz.

Neka je $\{\rho_i \mid i \in I\}$ proizvoljna familija slabih ekvivalencija na A. Tada je:

$$\Delta v \bigwedge_{i \in I} \rho_i = \Delta v \bigcap_{i \in I} \rho_i = \bigcap_{i \in I} (\Delta v \rho_i) = \bigwedge_{i \in I} (\Delta v \rho_i). \quad \blacksquare$$

Tvrđenje 3.11 Za proizvoljan neprazan skup A postoji algebra $\mathcal{A}=(A, F)$ takva da se mreža slabih kongruencija $Cw\mathcal{A}$ poklapa sa mrežom slabih ekvivalencija EwA.

Dokaz. Neka je A proizvoljan neprazan skup. Traženi uslov zadovoljava idempotentna algebra, $\mathcal{A}=(A, f)$, gde je f unarna operacija definisana sa $(\forall x \in A)(f(x)=x)$. ■

Tvrđenje 3.12 Neka je $\mathcal{A}=(A, F)$ algebra čija je mreža slabih kongruencija $Cw\mathcal{A}$ podmreža mreže slabih ekvivalencija EwA. Tada \mathcal{A} ima jaki CEP, CEP, CIP i *CIP.

Dokaz. Prema Lemi 3.5 ako je $Cw\mathcal{A}$ podmreža od mreže EwA, tada je $\rho v \Delta = \rho v \Delta$, pa \mathcal{A} ima jaki CEP. Prema Tvrđenju 3.9 sledi da \mathcal{A} ima CEP, a prema Tvrđenju 3.10 sledi da \mathcal{A} ima *CIP. ■

Lema 3.6 Ako je $Cw\mathcal{A}$ podmreža od EwA tada je \mathcal{A} \cup -algebra.

Napomena 3.2 \cup -algebra je algebra čija je mreža podalgebri zatvorena u odnosu na skupovnu uniju.

Dokaz. Prema Tvrđenju 3.1 $Sub\mathcal{A}$ je izomorfna podmreži od $Cw\mathcal{A}$, pa

je izomorfna i podmreži od EwA , podmreži dijagonalnih relacija na podskupovima od A koji su i podalgebre od A . Pošto je unija dve dijagonalne relacije na podskupovima od A takode dijagonalna relacija na uniji tih podskupova, sledi da taj podskup mora biti i podalgebra, odnosno, A je \cup -algebra. ■

Tvrđenje 3.13 Ako je A Risova algebra koja ima CEP, onda A ima i jaki CEP.

Napomena 3.3 Risova algebra je algebra A za koju je za svako $B \in \text{Sub}A$, $B^2 \cup \Delta$ kongruencija na A .

Dokaz. Neka je A Risova algebra koja ima CEP i $\rho \in CwA$ za $\rho \in \text{Con}B$. Tada je prema Tvrđenju 3.2:

$\rho \vee (\Delta \wedge B^2) = (\rho \vee \Delta) \wedge B^2$, a pošto je $\rho \geq \Delta \wedge B^2$, sledi da je $\rho = \rho \vee (\Delta \wedge B^2) = (\rho \vee \Delta) \wedge B^2$, pa je:

$$(B^2 \wedge (\rho \vee \Delta)) \cup \Delta = \rho \cup \Delta,$$

Koristeći uslov da je A Risova algebra, i iz $B^2 \vee \Delta \geq \rho \vee \Delta$, dobija se:

$$(B^2 \cup \Delta) \wedge ((\rho \vee \Delta) \cup \Delta) = (B^2 \cup \Delta) \wedge (\rho \vee \Delta) = (B^2 \vee \Delta) \wedge (\rho \vee \Delta) = \rho \vee \Delta.$$

Iz distributivnosti Δ u EwA sledi da je:

$$\rho \cup \Delta = (B^2 \wedge (\rho \vee \Delta)) \cup \Delta = (B^2 \cup \Delta) \wedge ((\rho \vee \Delta) \cup \Delta) = \rho \vee \Delta,$$

pa algebra A ima jaki CEP. ■

Tvrđenje 3.14 Ako je A Risova \cup -algebra koja ima CEP tada je CwA podmreža od EwA .

Dokaz. Neka je supremum u EwA označen sa $+$, a u CwA , uobičajeno, sa \vee (\cup je skupovna unija, a \wedge je skupovni presek, kao i infimum u obe mreže.

Neka $\rho, \theta \in CwA$, odnosno neka $\rho \in \text{Con}B$ i $\theta \in \text{Con}C$, za $B, C \in \text{Sub}A$. Supremum relacija ρ i θ , u mreži slabih ekvivalencija je

slaba ekvivalencija koja ima dijagonalu koja je jednaka uniji dijagonala od ρ i θ , pa zato $\rho + \theta \in \text{Ew}(\mathcal{B} \cup \mathcal{C})$.

Iz $\rho + \theta \in \text{Ew}(\mathcal{B} \cup \mathcal{C})$, $\rho \vee \theta \in \text{Con}(\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$, $\mathcal{B} \cup \mathcal{C} = \mathcal{B} \vee \mathcal{C}$ sledi da je:

$$(*) \quad (\rho + \theta) \wedge \Delta = (\rho \vee \theta) \wedge \Delta,$$

Prema Tvrdenju 3.13, algebra \mathcal{A} ima jaki CEP, i iz te činjenice sledi da je za svako $\rho \in \text{Cw}\mathcal{A}$:

$$\rho \vee \Delta = \rho + \Delta = \rho \cup \Delta.$$

Prema tome, dobija se:

$$(\rho + \theta) + \Delta = (\rho + \Delta) + (\theta + \Delta) = (\rho \cup \Delta) + (\theta \cup \Delta) = (\rho \vee \Delta) + (\theta \vee \Delta)$$

$\text{Con}\mathcal{A}$ je podmreža od $\text{Ew}\mathcal{A}$, pa je:

$$(\rho \vee \Delta) + (\theta \vee \Delta) = (\rho \vee \Delta) \vee (\theta \vee \Delta) = (\rho \vee \theta) \vee \Delta = (\rho \vee \theta) + \Delta,$$

Sledi da je:

$$(**) \quad (\rho + \theta) + \Delta = (\rho \vee \theta) + \Delta.$$

Pošto važi CEP, prema Tvrdenju 3.2, dobija se:

$$\rho + \theta = \rho \vee \theta. \quad \blacksquare$$

Sledeća dva tvrđenja daju potrebne i dovoljne uslove za algebru \mathcal{A} da njena mreža slabih kongruencija bude podmreža mreže slabih ekvivalencija na skupu A .

Tvrđenje 3.15 Za algebru \mathcal{A} važi da je njena mreža slabih kongruencija $\text{Cw}\mathcal{A}$ podmreža mreže slabih ekvivalencija $\text{Ew}\mathcal{A}$ ako i samo ako je \mathcal{A} Risova \cup -algebra koja ima CEP.

Dokaz.

Iz Tvrdjenja 3.13 sledi jedna implikacija, a iz Tvrdjenja 3.12 i Leme 3.6 druga (koristeći činjenicu da je svaka algebra koja ima jaki CEP Risova algebra). \blacksquare

Tvrđenje 3.16 Za algebru \mathcal{A} važi da je njena mreža slabih

kongruencija CwA podmreža mreže slabih ekvivalencija EwA ako i samo ako je A \cup -algebra koja ima jaki CEP. ■

U sledećem delu daće se karakterizacija algebri za koje se mreža slabih kongruencija poklapa sa mrežom slabih ekvivalencija na tom skupu. Radi se o algebrama kod kojih je svaka slaba ekvivalencija istovremeno i slaba kongruencija, odnosno, svaki podskup je istovremeno i podalgebra, a svaka relacija ekvivalencije na tom skupu je saglasna sa operacijama te algebre.

Lema 3.7 Ako je za algebru A $CwA = EwA$ i $|A| > 1$, tada A nema nularnih operacija.

Dokaz. Kada bi u algebri A postojale konstante tada bi one morale biti u svakoj podalgebri, pa bi postojala najmanja neprazna podalgebra. Znači prazan skup ne bi bio podalgebra pa ne bi važio da je $CwA = EwA$. ■

Jednostavno je utvrditi da važi sledeća lema:

Lema 3.8 Svaki podskup od A je i podalgebra od A ako i samo ako za svako n , za svaku n -arnu operaciju na A i za sve $x_1, \dots, x_n \in A$ važi:

$$f(x_1, \dots, x_n) \in \{x_1, \dots, x_n\}. \quad \blacksquare$$

Lema 3.9 Ako je $|A|=2$ za algebru A , tada je $CwA = EwA$ ako i samo ako je $f(x, \dots, x)=x$ za svaku n -arnu operaciju f na A .

Dokaz. Prema Lemi 3.8, ako je $A=\{a, b\}$, dobijamo da je za svako $f \in F$: $f(a, \dots, a)=a$ i $f(b, \dots, b)=b$. Neka je $f(x, \dots, x)=x$ za svako $f \in F$. Svaki podskup je očigledno podalgebra, a takode i svaka relacija ekvivalencije na podskupu od A je kongruencija, pa je $CwA=EwA$. ■

Lema 3.10 Ako je A algebra za koju je $|A|=3$ i $CwA=EwA$, jedine

binarne operacije na \mathcal{A} su projekcije.

Dokaz. Neka je $A = \{a, b, c\}$ i algebra $\mathcal{A} = (A, F)$. Neka je $f \in F$ binarna operacija na A . Prema Lemi 3.8, važi da je $f(a, a) = a$, $f(b, b) = b$, $f(c, c) = c$ i $f(a, b) \in \{a, b\}$. Neka je $f(a, b) = a$. Particija $\{\{a\}, \{b, c\}\}$ indukuje kongruenciju ρ algebre \mathcal{A} . Pošto $(a, a) \in \rho$ i $(b, c) \in \rho$, sledi da i $(f(a, b), f(a, c)) \in \rho$, odnosno, $(a, f(a, c)) \in \rho$, pa je $f(a, c) = a$. Na sličan način, koristeći druge particije od A , dobija se da je za sve $x, y \in A$, $f(x, y) = x$. Pod pretpostavkom da je $f(a, b) = b$, na sličan način se dobija da je za sve $x, y \in A$ $f(x, y) = y$. ■

Lema 3.11 Neka je $\mathcal{A} = (A, F)$ algebra za koju važi da je $Cw\mathcal{A} = Ew\mathcal{A}$. Ako za n -arnu operaciju f na \mathcal{A} i $a_1, \dots, a_n \in A$ važi da je:

$$f(a_1, \dots, a_1, \dots, a_n) = a_1,$$

tada je:

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_1$$

za sve $x_1, \dots, x_n \in A$, tako da je $x_j = a_1$ kadgod je $a_j = a_1$ za $j \in \{1, \dots, n\}$.

Dokaz. Posmatra se relacija ekvivalencije ρ , određena particijom $\{\{a_1\}, A \setminus \{a_1\}\}$. U skupu $A \setminus \{a_1\}$ svaki element je u relaciji ρ sa svakim, pa je odatle, $(a_k, x_k) \in \rho$, ako je $x_k \neq a_1$. Ako je $x_k = a_1$, tada je i $a_k = a_1$, pa opet $(a_k, x_k) \in \rho$. Znači, $(a_k, x_k) \in \rho$, za svako $k \in \{1, \dots, n\}$. Pošto je ρ i kongruencija na \mathcal{A} , važi uslov saglasnosti, pa je:

$$(f(a_1, \dots, a_n), f(x_1, \dots, x_n)) \in \rho, \quad \text{odnosno,}$$

$(a_1, f(x_1, \dots, x_n)) \in \rho$, pa je $f(x_1, \dots, x_n) = a_1$. ■

Tvrđenje 3.17 Za algebru $\mathcal{A} = (A, F)$ za koju je $|A| \geq 3$, mreža slabih kongruencija poklapa se sa mrežom slabih ekvivalencija skupa A ako i samo ako skup operacija F sadrži samo projekcije.

Dokaz. Ako su sve operacije iz F projekcije algebre \mathcal{A} , tada očigledno važi da je $\text{Sub}\mathcal{A} = \mathcal{P}(A)$.

Neka je ρ proizvoljna ekvivalencija na podskupu B skupa A. Ono što treba da se pokaže je da je ρ i kongruencija podalgebre \mathcal{B} . Neka je f proizvoljna n -arna operacija iz F i neka je za $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in B, (x_i, y_i) \in \rho$. Pošto je restrikcija projekcije na skup B takode projekcija, dobija se da je:

$$(f(x_1, \dots, x_n), f(y_1, \dots, y_n)) \in \rho, \quad \text{pa je } f$$

kongruencija podalgebre \mathcal{B} , odnosno, f je slaba kongruencija na \mathcal{A} .

Obratno, pretpostavimo da je $CwA = EwA$ i da postoji operacija f na \mathcal{A} koja nije projekcija. To bi značilo da postoje elementi a_1, \dots, a_n i b_1, \dots, b_n iz A , takvi da je za neke $i, j \in \{1, \dots, n\}$ gde je $i \neq j$

- (1) $f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) = a_i,$
- (2) $f(b_1, \dots, b_i, \dots, b_j, \dots, b_n) = b_j, \quad i$
- (3) $a_k \neq a_i$ ili $b_k \neq b_j$, za svako $k=1, \dots, n$.

(Iz Leme 3.8 sledi da $f(a_1, \dots, a_n) \in \{a_1, \dots, a_n\}$, i $f(b_1, \dots, b_n) \in \{b_1, \dots, b_n\}$).

Mogu se posmatrati sledeći slučajevi:

$$a) \quad a_i \neq b_j \quad i \quad b) \quad a_i = b_j.$$

a) Neka je $a_i \neq b_j$. Posmatramo $x_1, \dots, x_n \in A$ takve da je $x_k = a_i$ kadgod je $a_k = a_i$ i $x_k = b_j$ kadgod je $b_k = b_j$, za $k=1, \dots, n$. Prema Lemi 3.11 iz (1) sledi da je $f(x_1, \dots, x_n) = a_i$ a iz (2) $f(x_1, \dots, x_n) = b_j$, a pošto je $a_i \neq b_j$ dobija se kontradikcija.

b) Neka je $a_i = b_j = a$. Iz (1), (2) i (3) sledi da je: $f(a_1, \dots, a_n) = f(b_1, \dots, b_n) = a$, gde $a_k = b_k$ implicira da je $a_k \neq a$.

Iz $|A| \geq 3$ sledi da postoje $x, y \in A$ takvi da su a, x i y medusobno različiti elementi. Prema Lemi 3.11 i (1) dobijamo da je:

$$(1') \quad f(x_1, \dots, x_n) = a,$$

gde je

$$x_k = \begin{cases} a, & \text{za } a_k = a \\ y, & \text{za } b_k = a \\ x, & \text{u ostalim slučajevima.} \end{cases}$$

Iz (2) sledi da je:

(2') $f(y_1, \dots, y_n) = a$, gde je:

$$y_k = \begin{cases} a, & \text{za } b_k = a \\ x, & \text{u ostalim slučajevima.} \end{cases}$$

Neka je ρ kongruencija određena particijom $\{\{a, x\}, A \setminus \{a, x\}\}$.

Neka je
$$z_k = \begin{cases} x, & \text{za } x_k = a \\ x_k, & \text{u ostalim slučajevima, za } k \in \{1, \dots, n\}. \end{cases}$$

Posto je $x_k \rho z_k$, za sve $k \in \{1, \dots, n\}$, a ρ je kongruencija, sledi da je:

$$(f(x_1, \dots, x_n), f(z_1, \dots, z_n)) \in \rho.$$

$$z_i \in \{x, y\}, \text{ za svako } i, \text{ pa } f(z_1, \dots, z_n) \in \{x, y\}.$$

Iz $f(x_1, \dots, x_n) = a$, $(a, x) \in \rho$, $(a, y) \notin \rho$ i $f(z_1, \dots, z_n) \in \{x, y\}$ sledi da je

$$(*) \quad f(z_1, \dots, z_n) = x.$$

Ako posmatramo kongruenciju θ određenu particijom $\{\{a, y\}, A \setminus \{a, y\}\}$, na sličan način kao u prethodnom slučaju dobija se:

$$(f(y_1, \dots, y_n), f(z_1, \dots, z_n)) \in \theta.$$

$$\text{Iz } f(y_1, \dots, y_n) = a, \quad f(z_1, \dots, z_n) \in \{x, y\}, \quad (a, y) \in \theta$$

i $(a, x) \notin \theta$, sledi:

$$f(z_1, \dots, z_n) = y,$$

što je u kontradikciji sa uslovom (*).

Ovo znači da pretpostavka da u F postoje druge operacije osim projekcija vodi u kontradikciju, što dokazuje da su sve operacije iz F projekcije. ■

Posledica 3.6 Za algebru \mathcal{A} važi da se njena mreža slabih kongruencija poklapa sa mrežom slabih ekvivalencija na skupu \mathcal{A} ako i samo ako je svaka ekvivalencija na A i kongruencija algebre \mathcal{A} , a svaki podskup od A , i podalgebra od \mathcal{A} .

Dokaz. Ako je $\text{Sub}\mathcal{A} = \mathcal{P}(A)$ i $\text{Con}\mathcal{A} = EA$, onda je svako $f \in F$ projekcija, pa dokaz sledi direktno iz Tvrdjenja 3.14. ■

3.3 O MREŽI SLABIH KONGRUENCIJA DIREKTOG PROIZVODA ALGEBRI

Neka su A_1 i A_2 proizvoljne algebre istog tipa. Poznato je da se mreža $\text{Con}A_1 \times \text{Con}A_2$ može potopiti u $\text{Con}(A_1 \times A_2)$ (mrežu kongruencija direktnog proizvoda te dve algebra) sledećim preslikavanjem: $f(\rho_1, \rho_2) = \rho$, za $(\rho_1, \rho_2) \in \text{Con}A_1 \times \text{Con}A_2$, gde je ρ relacija na skupu $A_1 \times A_2$, definisana sa: $(x, y) \rho (z, t)$ akko $x \rho_1 z$ i $y \rho_2 t$. Direktno se proverava da je ρ kongruencija algebre $A_1 \times A_2$, kao i da je f potapanje. To sledi iz činjenice da je $EA_1 \times EA_2$ podmreža, do na izomorfizam, od $E(A_1 \times A_2)$ i toga da je $\text{Con}A$ uvek podmreža od EA , za svaku algebru A .

Postavlja se pitanje da li slično važi i za mreže slabih kongruencija. Odgovor je odrećan, čak i u slučajevima kada je CwA podmreža od EwA (za šta su uslovi ispitani u prethodnom delu). Naime, u opštem slučaju nije ni $EwA_1 \times EwA_2$ podmreža, do na izomorfizam (u odnosu na analognu funkciju f), od $Ew(A_1 \times A_2)$, što se vidi iz sledećeg primera.

Primer 3.2 Dati su skupovi $A_1 = \{a, b\}$ i $A_2 = \{1, 2\}$. Mreže EwA_1 i EwA_2 su izomorfne, i prikazane na slici 3.3:



Slika 3.3

$A_1 \times A_2 = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$ i mrežu $Ew(A_1 \times A_2)$ čine sve simetrične i tranzitivne relacije na skupu $A_1 \times A_2$ (gde je ρ označena relacija $\{(a, a)\}$, slično i za $b, 1$ i 2 , a sa Δ_1 je označena relacija $\{(a, a), (b, b)\}$, slično i Δ_2).

Elementi (a, Δ_2) i $(\Delta_1, 2)$ pripadaju mreži $EwA_1 \times EwA_2$. $f(a, \Delta_2) =$

$\{(a,1), (a,1), ((a,2), (a,2))\}$ i $f(\Delta_1, 2) = \{(a,2), (a,2), ((b,2), (b,2))\}$
 (f je definisano kao kod kongruencija, t.j. $f(\rho_1, \rho_2) = \rho$, za
 $(\rho_1, \rho_2) \in EwA_1 \times EwA_2$, gde je ρ relacija na skupu $A_1 \times A_2$, definisana sa:
 $(x,y)\rho(z,t)$ akko $x\rho_1 z$ i $y\rho_2 t$).

$$(a, \Delta_2) \vee (\Delta_1, 2) = (\Delta_1, \Delta_2) \text{ (supremum u mreži } EwA_1 \times EwA_2 \text{)}.$$

Dalje je $f(\Delta_1, \Delta_2) = \{(a,1), (a,1), ((a,2), (a,2)), ((b,2), (b,2)), ((b,1), (b,1))\}$.

Sa druge strane je $f(a, \Delta_2) \vee f(\Delta_1, 2) = \{(a,1), (a,1), ((a,2), (a,2)), ((b,2), (b,2))\}$.

Znači f nije izomorfizam, jer je $f((a, \Delta_2) \vee (\Delta_1, 2)) = \{(a,1), (a,1), ((a,2), (a,2)), ((b,2), (b,2)), ((b,1), (b,1))\} \neq \{(a,1), (a,1), ((a,2), (a,2)), ((b,2), (b,2))\} = f(a, \Delta_2) \vee f(\Delta_1, 2)$. ■

3.4 PRENOŠENJE MREŽNIH ZAKONA SA MREŽA KONGRUENCIJA I PODALGEBRI NA MREŽU SLABIH KONGRUENCIJA

U ovom delu ispitićemo se osobine mreže CwA , u zavisnosti od osobina mreža $SubA$ i $ConA$, proizvoljne algebre A . Pokazaće se da svojstva CEP i CIP imaju značajnu ulogu u prenošenju proizvoljnih mrežnih zakona sa $SubA$ i $ConA$ na CwA . Sledeća tvrđenja posledice su mrežnih tvrđenja iz poglavlja I.

Tvrđenje 3.18 Neka je A algebra koja ima svojstva CEP i CIP. Proizvoljni mrežni identitet važi na CwA ako i samo ako on važi na $SubA$ i na $ConA$.

Dokaz. Ako algebra A ima CEP i CIP, Δ je neutralni elemenat u mreži CwA , što sledi iz Posledice 3.1. Iz Tvrđenja 3.1 sledi da je $ConA = \{\Delta\}$, a $SubA \cong \{\Delta\}$, pa ako identitet važi na $ConA$ i $SubA$, prema Tvrđenju 1.17 iz poglavlja I sledi da identitet važi i

na mreži CwA . ■

Posledica 3.7 [130] Algebra A ima distributivnu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako A ima CEP i CIP, i $ConA$ i $SubA$ su distributivne mreže. ■

Posledica 3.8 [130] Algebra A ima modularnu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako A ima CEP i CIP, i $ConA$ i $SubA$ su modularne mreže. ■

Dalje će se ispitivati kada se proizvoljan mrežni zakon (koji može da sadrži i beskonačno-mesne operacije) prenosi sa mreža $SubA$ i $ConA$ na mrežu CwA . Pokazalo se da u tome značajnu ulogu ima, pored svojstava CEP i CIP, i neprekidnost elementa Δ u mreži slabih kongruencija te algebre.

Tvrđenje 3.19 Ako algebra A ima svojstva CEP i CIP i Δ je v -neprekidan element u mreži CwA , tada je proizvoljni mrežni zakon (koji može da sadrži i beskonačno-mesne operacije) zadovoljen na CwA ako i samo ako isti zakon važi na $SubA$ i na $ConA$.

Dokaz. Sledi direktno iz Tvrđenja 1.19 iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.9 Ako algebra A ima svojstva CEP i *CIP tada je proizvoljni mrežni zakon (koji može da sadrži i beskonačno-mesne operacije) zadovoljen na CwA ako i samo ako isti zakon važi na $SubA$ i na $ConA$.

Dokaz. Sledi iz prethodnog tvrđenja i iz Tvrđenja 1.10 iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.10 Algebra A ima beskonačno distributivnu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako algebra ima CEP i *CIP i $SubA$ i $ConA$ su beskonačno distributivne mreže. ■

* * *

U sledećih nekoliko tvrdenja dace se potrebni i dovoljni uslovi pod kojima je mreža slabih kongruencija neke algebre polumodularna.

Lema 3.12 Ako je mreža slabih kongruencija algebre \mathcal{A} polumodularna, i ima konačnu dužinu, tada algebra \mathcal{A} ima CEP.

Dokaz. Sledi iz Tvrdenja 3.1 i Tvrdenja 1.6 iz poglavlja I. ■

Lema 3.13 Ako algebra \mathcal{A} ima CEP i wCIP, tada je za svako $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$
 $\text{Con}\mathcal{B} \cong (\mathcal{B}^2 \vee \Delta)_{\text{Con}\mathcal{A}}$ ■

Dokaz. Sledi iz Leme 1.13 iz Poglavlja I. ■

Tvrdenje 3.20 Ako je mreža slabih kongruencija algebre \mathcal{A} polumodularna mreža konačne dužine tada važi sledeće:

- (0) $Cw\mathcal{B}$ je polumodularna mreža za svako $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$;
- (i) $\text{Con}\mathcal{B}$ je polumodularna mreža za svako $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$;
- (ii) $\text{Sub}\mathcal{A}$ je polumodularna mreža;
- (iii) za $\rho, \theta \in \text{Con}\mathcal{C}$, $\mathcal{C} \in \text{Sub}\mathcal{B}$ i $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$, važi:
 $\rho > \theta$ implicira $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} > \theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}$.

Dokaz. (0), (i) i (ii) slede iz činjenice da su sve mreže $Cw\mathcal{B}$ i $\text{Con}\mathcal{B}$, za $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$, kao i $\text{Sub}\mathcal{A}$ konveksne podmreže mreže $Cw\mathcal{A}$. Ako neka od njih ne bi bila polumodularna, ni mreža $Cw\mathcal{A}$ ne bi bila polumodularna, odakle sledi tvrdenje.

(iii)

Neka su ρ i θ iz $\text{Con}\mathcal{C}$ za $\mathcal{C} \in \text{Sub}\mathcal{B}$ i $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$, i neka važi: $\rho > \theta$. Iz $\rho \geq \theta$ sledi $(\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho \geq \theta$. Ako bi važilo $(\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho > \theta$, iz $\rho > \theta$ i $\rho \geq (\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho > \theta$, sledilo bi $\rho = (\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho$, odnosno $\rho \leq (\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}})$, odakle, $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} = \theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}$. Iz polumodularnosti mreže $Cw\mathcal{B}$ sledi da algebra \mathcal{B} ima CEP (prema Lemi 3.12), pa iz $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} = \theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}$ i $\rho \wedge \Delta_{\mathcal{B}} = \Delta_{\mathcal{C}} = \theta \wedge \Delta_{\mathcal{B}}$ i Tvrdenja 3.2 sledi da je $\rho = \theta$. Znači da nije $\rho = (\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho$, pa iz uslova $\rho > \theta$ i $\rho \geq (\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho \geq \theta$ sledi $(\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho = \theta$. Iz $(\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho = \theta$ dobija se da $\rho > (\theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \rho$,

pa iz polumodularnosti sledi da $\rho \vee \theta \vee \Delta_B \succ \theta \vee \Delta_B$, odnosno, $\rho \vee \Delta_B \succ \theta \vee \Delta_B$ ■

Tvrđenje 3.21 Ako je \mathcal{A} algebra za koju su $\text{Con}\mathcal{A}$ i $\text{Sub}\mathcal{A}$ polumodularne mreže, i \mathcal{A} ima CEP i slabi CIP tada je $\text{Cw}\mathcal{A}$ polumodularna mreža.

Dokaz. Neka su ρ i θ iz $\text{Cw}\mathcal{A}$, i pretpostavimo da je $\rho \succ \rho \wedge \theta$. Neka $\rho \in \text{Con}\mathcal{C}$, $\theta \in \text{Con}\mathcal{B}$, za $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub}\mathcal{A}$. Mogu se razlikovati tri slučaja:

a) $\mathcal{C} = \mathcal{B}$; b) $\mathcal{C} < \mathcal{B}$; i c) \mathcal{B} i \mathcal{C} su neuporedivi elementi mreže $\text{Cw}\mathcal{A}$.

a) Iz Leme 3.13 pošto važe CEP i slabi CIP, sledi da je:

$$\text{Con}\mathcal{C} \cong (C^2 \vee \Delta)_{\text{Con}\mathcal{A}}, \quad (*),$$

i iz polumodularnosti mreže $\text{Con}\mathcal{A}$, sledi:

$$\rho \vee \theta \succ \theta.$$

b) Iz $\mathcal{C} < \mathcal{B}$ sledi da $\rho \wedge \theta \in \text{Con}\mathcal{C}$. Prema Lemi 3.4 CEP se prenosi na podalgebre, pa važi i na \mathcal{B} . Iz Leme 3.13 sledi da je $\text{Con}\mathcal{C} \cong (C^2 \vee \Delta)_{\text{Con}\mathcal{B}}$, u odnosu na izomorfizam $\rho \rightarrow \rho \vee \Delta_B$, pa je :

$$\rho \vee \Delta_B \succ (\rho \wedge \theta) \vee \Delta_B.$$

Pošto važi slabi CIP, iz $\Delta_B \leq \theta$, sledi:

$$\Delta_B \vee (\rho \wedge \theta) = (\Delta_B \vee \rho) \wedge \theta, \text{ pa je:}$$

$$\rho \vee \Delta_B \succ (\rho \vee \Delta_B) \wedge \theta.$$

$\text{Con}\mathcal{B}$ je takode polumodularna mreža (jer je $\text{Con}\mathcal{B} \cong (B^2 \vee \Delta)_{\text{Con}\mathcal{A}}$), pa važi:

$$(\rho \vee \Delta_B) \vee \theta \succ \theta, \text{ odnosno } \rho \vee \theta \succ \theta$$

c) Neka su \mathcal{B} i \mathcal{C} neuporedive podalgebre od \mathcal{A} . Tada $\rho \wedge \theta \in \text{Con}(\mathcal{B} \wedge \mathcal{C})$. Iz $\rho \succ \rho \wedge \theta$ sledi da je $\rho = (\rho \wedge \theta) \vee \Delta_C$. Odatle je:

$$\rho \vee \theta = (\rho \wedge \theta) \vee \Delta_C \vee \theta = \theta \vee \Delta_C = \theta \vee \Delta_{\mathcal{B} \vee \mathcal{C}}.$$

Iz kodistributivnosti elementa Δ u $\text{Cw}\mathcal{A}$ sledi da je

$$(\{\text{Con}\mathcal{B} \mid \mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}\}, \leq) \cong \text{Sub}\mathcal{A},$$

pa iz polumodularnosti mreže $\text{Sub}\mathcal{A}$, sledi da je $(\{\text{Con}\mathcal{B} \mid \mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}\}, \leq)$ polumodularna mreža.

Iz $\rho \succ \rho \wedge \theta$, sledi $\mathcal{B} \succ \mathcal{B} \wedge \mathcal{C}$ (kad bi postojala algebra \mathcal{D} , takva da

je $\mathcal{B} > \mathcal{D} > \mathcal{B} \wedge \mathcal{C}$, tada bi bilo $\rho > \rho \wedge ((\rho \wedge \theta) \vee \Delta_{\mathcal{D}}) > \rho \wedge \theta$, jer $\rho \wedge ((\rho \wedge \theta) \vee \Delta_{\mathcal{D}}) \in \text{Con} \mathcal{D}$, što bi bilo u suprotnosti sa $\rho > \rho \wedge \theta$.

Iz polumodularnosti mreže $(\{\text{Con} \mathcal{B} \mid \mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}\}, \leq)$ sledi da je: $\mathcal{B} \vee \mathcal{C} > \mathcal{B}$. Pošto $\rho \vee \theta = \theta \vee \Delta_{\mathcal{B} \vee \mathcal{C}} \in \text{Con}(\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$ i $\theta \in \text{Con} \mathcal{B}$, iz $\mathcal{B} \vee \mathcal{C} > \mathcal{B}$ i CEPa u $\text{Con} \mathcal{B}$ (ne postoji $\theta_1 > \theta$ takvo da je $\theta_1 < \theta \vee \Delta_{\mathcal{B} \vee \mathcal{C}}$) sledi da je $\rho \vee \theta > \theta$. ■

Tvrđenje 3.22 Neka je \mathcal{A} algebra sa mrežom slabih kongruencija konačne dužine. Ako za svako $\mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{A}$, i sve $\rho, \theta \in \mathcal{C}$

$$\text{iz } \rho > \theta \text{ sledi } \rho \vee \Delta > \theta \vee \Delta, \quad (*)$$

tada algebra \mathcal{A} ima CEP.

Dokaz. Ako \mathcal{A} nema CEP tada, prema Tvrđenju 3.2 postoji $\mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{A}$ i $\rho, \theta \in \text{Con} \mathcal{C}$ takvi da je $\rho \vee \Delta = \theta \vee \Delta$. Važi i $\rho \vee \theta \vee \Delta = \rho \vee \Delta = \theta \vee \Delta$, i za svaku slabu kongruenciju χ iz intervala $[\rho, \rho \vee \theta]$ i $[\theta, \rho \vee \theta]$ važi $\chi \vee \Delta = \rho \vee \Delta = \theta \vee \Delta$. Ako je $Cw \mathcal{A}$ konačne dužine, tada postoje dve slabe kongruencije α i β , od njih tako da $\alpha > \beta$ i da je $\alpha \vee \Delta = \beta \vee \Delta$, pa ne važi uslov (*). ■

Sledeće tvrđenje je potreban i dovoljan uslov pod kojim je mreža slabih kongruencija konačne dužine polumodularna.

Tvrđenje 3.23 Neka je \mathcal{A} algebra sa mrežom slabih kongruencija konačne dužine. $Cw \mathcal{A}$ je polumodularna mreža ako i samo ako su zadovoljeni sledeći uslovi:

- (i) $\text{Con} \mathcal{B}$ je polumodularna mreža za svako $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$;
- (ii) $\text{Sub} \mathcal{A}$ je polumodularna mreža;
- (iii) za sve $\rho, \theta \in \text{Con} \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$,
iz $\rho > \theta$ sledi $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} > \theta \vee \Delta_{\mathcal{B}}$.

Dokaz.

(\longrightarrow) Sledi iz Tvrđenja 3.20.

(\longleftarrow) Neka $\rho, \theta \in Cw \mathcal{A}$, $\rho \in \text{Con} \mathcal{C}$, $\theta \in \text{Con} \mathcal{B}$, $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{A}$, i neka

$\rho > \rho \wedge \theta$. Mogu se razlikovati tri slučaja:

a) $\mathcal{B} = \mathcal{C}$; b) $\mathcal{C} < \mathcal{B}$; c) \mathcal{B} i \mathcal{C} nisu uporedivi elementi mreže $\text{Sub} \mathcal{A}$.

U slučaju a) $\rho \vee \theta > \theta$ sledi direktno iz polumodularnosti mreže \mathcal{B} (iz (i)).

b) Iz $\mathcal{C} < \mathcal{B}$ sledi da $\rho \wedge \theta \in \text{Con} \mathcal{C}$, pa prema (iii) sledi da $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} > (\rho \wedge \theta) \vee \Delta_{\mathcal{B}}$. Iz $(\rho \wedge \theta) \vee \Delta_{\mathcal{B}} \leq (\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \theta \leq \rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}$ i $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} > (\rho \wedge \theta) \vee \Delta_{\mathcal{B}}$ sledi da je $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} = (\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \theta$ ili $(\rho \wedge \theta) \vee \Delta_{\mathcal{B}} = (\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \theta$. Iz $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} = (\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \theta$ sledi da je $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} \leq \theta$, odakle $\rho \wedge (\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \leq \rho \wedge \theta$, tj. $\rho \leq \rho \wedge \theta$, što je u suprotnosti sa $\rho > \rho \wedge \theta$. Znači važi $(\rho \wedge \theta) \vee \Delta_{\mathcal{B}} = (\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \theta$. Sledi da $\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}} > (\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge \theta$. Po pretpostavci $\text{Con} \mathcal{B}$ je semimodularna mreža, pa odatle sledi da: $(\rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \vee \theta > \theta$, odnosno, $\rho \vee \theta > \theta$.

c) Iz Tvrdjenja 3.22 sledi da algebra ima CEP, pa se ovaj slučaj dokazuje slično kao slučaj c) u Tvrdjenju 3.21. ■

Sledeća tri tvrdjenja daju potrebne i dovoljne uslove koje treba da ispuni algebra tako da njena mreža slabih kongruencija bude komplementirana, odnosno Bulova mreža.

Tvrdjenje 3.24 [101] Algebra \mathcal{A} ima CEP, CIP, i komplementiranu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako važe sledeći uslovi:

(i) za svako $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$, preslikavanje $\rho \rightarrow \rho \vee \Delta_{\mathcal{B}}$ je mrežni izomorfizam iz $\text{Con} \mathcal{B}$ u $\text{Con} \mathcal{A}$;

(ii) $\text{Con} \mathcal{A}$ je komplementirana mreža;

(iii) $\text{Sub} \mathcal{A}$ je komplementirana mreža. ■

Tvrdjenje 3.25 [101] Neka je \mathcal{A} algebra sa modularnom mrežom slabih kongruencija. Uslovi (i), (ii) i (iii) iz prethodnog tvrdjenja su potrebni i dovoljni uslovi za mrežu $\text{Cw} \mathcal{A}$ da bude komplementirana. ■

Tvrdjenje 3.26 [101] Za algebru \mathcal{A} mreža slabih kongruencija $\text{Cw} \mathcal{A}$ je Bulova mreža ako i samo ako su zadovoljeni sledeći uslovi:

(i) za svako $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$, preslikavanje $\rho \rightarrow \rho \vee \Delta$ je mrežni izomorfizam iz $\text{Con} \mathcal{B}$ u $\text{Con} \mathcal{A}$;

(ii) $\text{Con} \mathcal{A}$ je Bulova mreža;

(iii) $\text{Sub} \mathcal{A}$ je Bulova mreža. ■

3.5 O PRENOŠENJU NEKIH SVOJSTAVA NA PODALGEBRE I FAKTOR ALGEBRE

Dijagonalne relacije, kao specijalni elementi mreže slabih kongruencija, imaju istaknuto mesto u proučavanju zakona koji važe na toj mreži. O tim zakonima i njihovim algebarskim posledicama govorimo u nastavku.

Tvrđenje 3.27 Data je algebra \mathcal{A} koja ima CEP i CIP, i neka je $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljni mrežni identitet, i \mathcal{B} podalgebra od \mathcal{A} .

Ako jednakost $f(x_1, \dots, x_{n-1}, \Delta) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, \Delta)$ važi na $\text{Con} \mathcal{A}$ i na $\text{Sub} \mathcal{A}$, tada identitet

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, \Delta_{\mathcal{B}}) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, \Delta_{\mathcal{B}})$$

važi na mreži $\text{Cw} \mathcal{B}$.

Dokaz. Direktna posledica Tvrđenja 1.20 iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.11 Ako algebra \mathcal{A} ima CEP i CIP, tada i svaka podalgebra \mathcal{B} algebre \mathcal{A} ima CEP i CIP. ■

Dokaz. Ako algebra \mathcal{A} ima CEP i CIP, tada je Δ neutralan element u mreži $\text{Cw} \mathcal{A}$, odnosno, zadovoljen je identitet $(x \wedge \Delta) \vee (y \wedge \Delta) \vee (x \wedge y) = (x \vee \Delta) \wedge (y \vee \Delta) \wedge (x \vee y)$ na celoj mreži $\text{Cw} \mathcal{A}$, pa i na $\text{Sub} \mathcal{A}$ i na $\text{Con} \mathcal{A}$, pa važi i $(x \wedge \Delta_{\mathcal{B}}) \vee (y \wedge \Delta_{\mathcal{B}}) \vee (x \wedge y) = (x \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge (y \vee \Delta_{\mathcal{B}}) \wedge (x \vee y)$ na $\text{Cw} \mathcal{B}$, odnosno $\Delta_{\mathcal{B}}$ je neutralan element mreže $\text{Cw} \mathcal{B}$, pa \mathcal{B} ima CEP i CIP. ■


Napomena 3.3 Neposredno se pokazuje da ako algebra \mathcal{A} ima CEP, da svaka podalgebra algebre \mathcal{A} ima CEP. Svojstvo CIP se u opštem slučaju ne prenosi na podalgebre, što se vidi i iz sledećeg primera.

Primer 3.3 Dat je grupoid $\mathcal{A} = (\{a, b, c, d, e\}, *)$, sa skupom nularnih

operacija $C=\{a,b,c\}$, gde je operacija $*$ zadata Kejljevom tablicom:

*	a	b	c	d	e
a	b	a	c	d	d
b	a	a	c	d	e
c	c	c	b	c	c
d	d	d	c	a	a
e	d	e	c	a	d

Podalgebre ovog grupoida su $C=\{a,b,c\}$ i $B=\{a,b,c,d\}$. Kongruencije podalgebre \mathcal{C} su Δ_C , C^2 i $\theta=\{\{a,b\},\{c\}\}$ (zadana preko klasa ekvivalencije). Kongruencije na podalgebri \mathcal{B} su Δ_B , B^2 , $\rho=\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$ i $\tau=\{\{a,b,d\},\{c\}\}$. Kongruencije na algebri \mathcal{A} su Δ , A^2 i $\sigma=\{\{a,b,d,e\},\{c\}\}$. Mreža $Cw\mathcal{A}$ je na slici 3.4:



Slika 3.4

Ova algebra ima CIP, što se jednostavno proverava primenom Tvrdjenja 3.3, jer za svako $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$ familije $\{\rho \in Cw\mathcal{A} \mid \rho \geq \theta\}$ imaju najmanje elemente. Ova algebra nema CEP, jer je $\tau \vee \Delta = \rho \vee \Delta = \sigma$, a obe relacije su kongruencije na istoj podalgebri \mathcal{B} . Podalgebra \mathcal{B} nema CIP, jer je $(\tau \wedge C^2) \vee \Delta_B = \rho \neq \tau = (\tau \vee \Delta_B) \wedge (C^2 \vee \Delta_B)$. ■

Ovaj primer pokazuje da se ni wCIP ne prenosi u opstem slucaju sa algebre na podalgebre, jer algebra \mathcal{A} ima wCIP, a podalgebra \mathcal{B} ga nema.

Sledece tvrdjenje je dualno prethodnom.

Tvrdjenje 3.28 Neka je \mathcal{A} algebra koja ima CEP i *CIP, i neka je $f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$ proizvoljni mrežni identitet. Za $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$, neka je $\underline{\theta}$ najmanji element u klasi kongruencije n_a kojoj pripada θ . Ako $f(x_1, \dots, x_{n-1}, \Delta) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, \Delta)$ važi na mrežama $\text{Sub}\mathcal{A}$ i $\text{Con}\mathcal{A}$, tada $f(x_1, \dots, x_{n-1}, \underline{\theta}) = g(x_1, \dots, x_{n-1}, \underline{\theta})$ važi na filtru $[\underline{\theta}]$ u mreži $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. Direktna posledica Tvrdjenja 1.23' iz Poglavlja I, jer ako važi *CIP tada za svako θ klase indukovane homomorfizmom $n_{\Delta}: \rho \rightarrow \rho \vee \Delta$ imaju najmanje elemente (prema Tvrdjenju 3.3). ■

Iz prethodnog tvrdjenja može se zaključiti kada se neke osobine prenose sa algebre na njenu faktor algebru. Naime, u sledećem delu će se ispitivati kada je za $\theta \in \text{Con} A$ mreža $CwA/\theta \cong [\underline{\theta}]$. Sledeće tvrdjenje kaže kada se CEP i CIP prenose sa algebre na faktor algebru, pod pretpostavkom da taj izomorfizam važi.

Posledica 3.12 Data je algebra A koja ima CEP i *CIP. Ako je $\theta \in \text{Con} A$ kongruencija za koju važi: $CwA/\theta \cong [\underline{\theta}]$ tada i faktor algebra A/θ ima CEP i CIP. ■

Napomena 3.4 U opštem slučaju se ni CEP ni CIP ne prenose na faktor algebre, a ni CEP i CIP zajedno.

Neke složenije jednakosti algebarskih funkcija takode mogu da se prošire sa mreže kongruencija odnosno podalgebri na celu mrežu slabih kongruencija. O tome i o odgovarajućim algebarskim posledicama raspravlja se u narednih nekoliko tvrdjenja.

Tvrdjenje 3.29 Neka algebra A ima CIP, i neka $\theta \in \text{Con} A$. Ako jednakost:

$$\bigwedge_{i=1}^n (\theta \vee f_1^i(x_1, \dots, x_n)) = \bigwedge_{j=1}^r (\theta \vee f_2^j(x_1, \dots, x_n))$$

važi na $\text{Con} A$, tada ona važi na celoj mreži CwA .

Dokaz. Direktna posledica Tvrdjenja 1.21 iz Poglavlja I ■

Posledica 3.13 Ako algebra A ima CIP i θ je distributivni element mreže $\text{Con} A$, i CwA/θ je podmreža mreže CwA , tada i faktor algebra A/θ ima CIP.

Dokaz. $\theta \vee (\rho \wedge \tau) = (\theta \vee \rho) \wedge (\theta \vee \tau)$ je jednakost oblika kao u prethodnom tvrdjenju, pa direktnom njegovom primenom sledi ovo

tvrdenje. ■

Tvrdenje 3.30 Data je algebra \mathcal{A} , i neka $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$. Ako jednakost

$$\bigvee_{i=1}^n (\mathcal{B} \wedge f_1^i(x_1, \dots, x_n)) = \bigvee_{j=1}^r (\mathcal{B} \wedge f_2^j(x_1, \dots, x_n))$$

važi na $\text{Sub}\mathcal{A}$, tada on važi na $\text{Cw}\mathcal{A}$. ■

Tvrdenje 3.31 Data je algebra \mathcal{A} koja ima CEP i CIP. Ako $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$

i jednakost $f(x_1, \dots, x_n, \theta) = g(x_1, \dots, x_n, \theta)$ važi na $\text{Con}\mathcal{A}$, i jednakost

$f(x_1, \dots, x_n, \Delta) = g(x_1, \dots, x_n, \Delta)$ važi na $\text{Sub}\mathcal{A}$, tada jednakost

$f(x_1, \dots, x_n, \theta) = g(x_1, \dots, x_n, \theta)$ važi na $\text{Cw}\mathcal{A}$.

Dokaz. Direktna posledica Tvrdjenja 1.22 iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.14 Ako algebra \mathcal{A} ima CEP i CIP i θ je kostandardan

elemenat mreže $\text{Con}\mathcal{A}$ i $\text{Cw}\mathcal{A}/\theta$ je podmreža od $\text{Cw}\mathcal{A}$, tada i faktor algebra

\mathcal{A}/θ ima CEP. ■

Tvrdenje 3.32 Data je algebra \mathcal{A} koja ima CEP i CIP. Ako $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$

i jednakost $f(x_1, \dots, x_n, \mathcal{B}) = g(x_1, \dots, x_n, \mathcal{B})$ važi na $\text{Sub}\mathcal{A}$, i jednakost

$f(x_1, \dots, x_n, \Delta) = g(x_1, \dots, x_n, \Delta)$ važi na $\text{Con}\mathcal{A}$, tada jednakost

$f(x_1, \dots, x_n, \mathcal{B}) = g(x_1, \dots, x_n, \mathcal{B})$ važi na $\text{Cw}\mathcal{A}$.

Dokaz. Direktna posledica Tvrdjenja 1.22' iz Poglavlja I ■

Tvrdenja 3.27 do 3.32 mogu se uopštiti koristeći mrežna tvrdjenja 1.23, 1.23', 1.24, 1.24', 1.25, 1.25' iz Poglavlja I, tako da se umesto jednakosti algebarskih funkcija sa konačno-mesnim operacija posmatraju jednakosti algebarskih funkcija sa beskonačno-mesnim operacijama. Jedini dodatni uslov u većini tih tvrdjenja je neprekidnost elementa Δ u mreži slabih kongruencija. Prema Tvrdjenju 3.7 Δ je uvek \wedge -neprekidan elemenat, a prema Tvrdjenju 3.8 svojstvo *CIP je ekvivalentno sa CIPom i \vee -neprekidnošću elementa Δ u mreži

CwA.

Tvrdenje 3.33 Data je algebra \mathcal{A} ima koja ima CEP i *CIP, i neka je $f(x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = g(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljni mrežni identitet (koji može da sadrži i beskonačno-mesne operacije), i \mathcal{B} podalgebra od \mathcal{A} .

Ako identitet $f(\Delta, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(\Delta, x_2, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na $\text{Con}\mathcal{A}$ i na $\text{Sub}\mathcal{A}$, tada identitet

$$f(\Delta_{\mathcal{B}}, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(\Delta_{\mathcal{B}}, x_2, \dots, x_\alpha, \dots)$$

važi na mreži $\text{Cw}\mathcal{B}$.

Dokaz. Direktna posledica Tvrdenja 1.23 iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.15 Ako algebra \mathcal{A} ima CEP i *CIP, tada i svaka podalgebra \mathcal{B} algebre \mathcal{A} ima CEP i *CIP. ■

Sledeće tvrdenje je dualno prethodnom.

Tvrdenje 3.34 Neka je \mathcal{A} algebra koja ima CEP i *CIP, i neka je $f(x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = g(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ proizvoljni mrežni identitet (koji može da sadrži i beskonačno-mesne operacije). Za $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$, neka je θ najmanji element u klasi kongruencije n_a kojoj pripada θ . Ako $f(\Delta, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(\Delta, x_2, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na mrežama $\text{Sub}\mathcal{A}$ i $\text{Con}\mathcal{A}$, tada $f(\theta, x_2, \dots, x_\alpha, \dots) = g(\theta, x_2, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na filtru $[\theta]$ u mreži $\text{Cw}\mathcal{A}$.

Dokaz. Direktna posledica Tvrdenja 1.23' iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.16 Data je algebra \mathcal{A} koja ima CEP i *CIP. Ako je $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$ kongruencija za koju važi: $\text{Cw}\mathcal{A}/\theta \cong [\theta]$ tada i faktor algebra \mathcal{A}/θ ima CEP i *CIP. ■

Tvrdenje 3.35 Neka algebra \mathcal{A} ima *CIP, i neka $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$. Ako

jednakost:

$$\bigwedge_{i \in I} (\theta \vee f_1^i(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)) = \bigwedge_{j \in J} (\theta \vee f_2^j(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)),$$

važi na $\text{Con}A$, tada ona važi na celoj mreži CwA .

Dokaz. Direktna posledica Tvrdjenja 1.24 iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.16 Ako algebra A ima *CIP i θ je beskonačno distributivni element mreže $\text{Con}A$, i CwA/θ je podmreža mreže CwA , tada i faktor algebra A/θ ima *CIP. ■

Tvrdjenje 3.36 Data je algebra A , i neka $B \in \text{Sub}A$. Ako jednakost

$$\bigvee_{i \in I} (B \wedge f_1^i(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)) = \bigvee_{j \in J} (B \wedge f_2^j(x_1, \dots, x_\alpha, \dots)),$$

važi na $\text{Sub}A$, tada on važi na CwA . ■

Tvrdjenje 3.37 Data je algebra A koja ima CEP i *CIP. Ako $\theta \in \text{Con}A$ i jednakost $f_1(\theta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(\theta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na $\text{Con}A$ i jednakost $f_1(\Delta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(\Delta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na $\text{Sub}A$, tada jednakost $f_1(\theta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(\theta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na CwA .

Dokaz. Direktna posledica Tvrdjenja 1.25 iz Poglavlja I. ■

Tvrdjenje 3.38 Data je algebra A koja ima CEP i *CIP. Ako $B \in \text{Sub}A$ i jednakost $f_1(B, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(B, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na $\text{Sub}A$, i jednakost $f_1(\Delta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(\Delta, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na $\text{Con}A$, tada jednakost $f_1(B, x_1, \dots, x_\alpha, \dots) = f_2(B, x_1, \dots, x_\alpha, \dots)$ važi na CwA .

Dokaz. Direktna posledica Tvrdjenja 1.35' iz Poglavlja I. ■

3.6 O MREŽI SLABIH KONGRUENCIJA FAKTOR ALGEBRE [106, 109]

Teorema 3.1 Neka je $A=(A, F)$ algebra i $\theta \in \text{Con}A$. Tada je $\text{Con}A/\theta$ izomorfno sa filtrom $[\theta]$ u mreži $\text{Con}A$, gde je izomorfizam α :

$[\theta] \rightarrow \text{Con } \mathcal{A}/\theta$ definisan sa: $\alpha(\phi) = \phi/\theta$. ■

Ovo je poznato tvrđenje iz univerzalne algebre, koje tačno određuje mrežu kongruencija homomorfne slike proizvoljne algebre preko mreže kongruencija te algebre. U ovom delu ćemo se baviti mrežom slabih kongruencija homomorfne slike algebre, i njenim odnosom sa mrežom slabih kongruencija te algebre. Pokazalo se da mreža slabih kongruencija homomorfne slike algebre u opštem slučaju nije izomorfna filtru, pa čak ni podmreži te algebre.

Neka $\theta \in \text{Con } \mathcal{A}$, i $\mathcal{D}_\theta = \{B \mid B \text{ je podalgebra od } \mathcal{A} \text{ i } B[\theta] = B\}$, gde je $B[\theta] = \{x \in A \mid x\theta b \text{ za neko } b \in B\}$. \mathcal{D}_θ je familija podalgebri od \mathcal{A} koje imaju svojstvo da seku kongruenciju θ pravilno po njenim klasama.

Mreži slabih kongruencija $Cw\mathcal{A}/\theta$ u mreži $Cw\mathcal{A}$ odgovara podskup

$$\mathcal{A}_\theta = \cup ([B^2 \wedge \theta, B^2] \mid B \in \mathcal{D}_\theta),$$

gde je $[B^2 \wedge \theta, B^2]$ interval mreže $Cw\mathcal{A}$.

Preslikavanje $\alpha: \mathcal{A}_\theta \rightarrow Cw\mathcal{A}/\theta$ definisano sa $\alpha(\phi) = \phi/\theta$ (kao u Teoremi 3.1), je mrežni izomorfizam, kad se \mathcal{A}_θ posmatra kao mreža u odnosu na poredak indukovan sa mreže $Cw\mathcal{A}$.

Zbog prethodnog razmatranja rešavajući problem u kakvom su odnosu $Cw\mathcal{A}/\theta$ i $Cw\mathcal{A}$, umesto $Cw\mathcal{A}/\theta$ posmatraće se u kakvom su odnosu \mathcal{A}_θ i $Cw\mathcal{A}$, odnosno, neće se praviti razlika između mreža $Cw\mathcal{A}/\theta$ i \mathcal{A}_θ .

U sledećem primeru $Cw\mathcal{A}/\theta$ nije podmreža od $Cw\mathcal{A}$.

Primer 3.4

Grupoid $(G, *)$ zadat je Kejljevom tablicom:

*	a	b	c	d
a	d	d	b	c
b	d	d	b	c
c	b	b	c	a
d	c	c	a	d


Podgrupoidi grupoida $(G, *)$ su $\mathcal{C} = (\{c\}, *)$ i

$\mathcal{D} = (\{d\}, *)$.

Kongruencije su: A^2 , Δ i $\theta = \{ \{a, b\}, \{c\}, \{d\} \}$.

Ako obeležimo klase kongruencije θ , redom sa C_a , C_c i C_d , tada je $G/\theta = \{C_a, C_c, C_d\}$. Podgrupoidi od G/θ su $\{C_c\}$ i $\{C_d\}$, a kongruencije su samo $(G/\theta)^2$ i $\Delta_{G/\theta}$. Mreže slabih kongruencija CwG i CwG/θ prikazane su

na slici 3.5:



Slika 3.5

Vidimo da G_θ nije podmreža od CwG , jer $C \vee D \neq \theta$ u CwG .

Da bi CwA/θ bila podmreža od CwA , za neku algebru A i $\theta \in \text{Con}A$ moraju važiti neki čisto mrežni uslovi, ali oni nisu i dovoljni, što se može pretpostaviti već iz definicije za \mathcal{D}_θ koja je u vezi sa A_θ . Ono što sledi je razmatranje potrebnih mrežnih uslova, zatim nekih algebarskih uslova, i dati su i neki potrebni i dovoljni uslovi da mreža CwA/θ bude podmreža od CwA .

Lema 3.14 Neka su \mathcal{B} i \mathcal{C} podalgebre algebre A i $\theta \in \text{Con}A$. Ako $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$, onda i $\mathcal{B} \wedge \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$.

Dokaz. Ako su B i C unija nekih klasa od θ , tada je i njihov presek unija nekih klasa od θ . ■

Lema 3.15 Ako $\rho, \phi \in CwA$ pripadaju A_θ onda i $\rho \wedge \phi \in A_\theta$.

Dokaz. Neka $\rho \in \text{Con}\mathcal{B}$ i $\phi \in \text{Con}\mathcal{C}$, za $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub}A$, i $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$. Pošto $\rho, \phi \in A_\theta$, važi da je $B^2 \wedge \theta \leq \rho \leq B^2$ i $C^2 \wedge \theta \leq \phi \leq C^2$, odakle je $B^2 \wedge C^2 \wedge \theta \leq \rho \wedge \phi \leq B^2 \wedge C^2$. Iz $B^2 \wedge C^2 = (B \wedge C)^2$, sledi $(B \wedge C)^2 \wedge \theta \leq \rho \wedge \phi \leq (B \wedge C)^2$, a iz prethodne leme, $\mathcal{B} \wedge \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$, odakle $\rho \wedge \phi \in A_\theta$. ■

Teorema 3.2 Neka je A algebra i $\theta \in \text{Con}A$. CwA/θ je podmreža od CwA ako i samo ako sledeći uslovi važe za sve $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$:

- (i) $\mathcal{B} \vee \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$;
- (ii) $\theta \wedge (B^2 \vee C^2) = (\theta \wedge B^2) \vee (\theta \wedge C^2)$;

$$(iii) \quad \theta \wedge (B^2 \vee C^2) = \theta \wedge (B \vee C)^2.$$

Dokaz. (\leftarrow)

Neka $\rho, \phi \in \mathcal{A}_\theta$, i neka $\rho \in \text{Con } \mathcal{B}$, i $\phi \in \text{Con } \mathcal{C}$, za $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$. Iz prethodne leme sledi da $\rho \wedge \phi \in \mathcal{A}_\theta$.

Dalje je $(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) \leq \rho \vee \theta \leq B^2 \vee C^2$, pa iz uslova (ii) i (iii) i činjenice da je $B^2 \vee C^2 \leq (B \vee C)^2$, sledi da je $(B \vee C)^2 \wedge \theta \leq \rho \vee \theta \leq (B \vee C)^2$, pa iz (i) sledi da $\rho \vee \phi \in \mathcal{A}_\theta$.

(\rightarrow)

Neka je \mathcal{A}_θ podmreža od $Cw\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$. $B^2 \wedge \theta$ i $C^2 \wedge \theta$ tada pripadaju \mathcal{A}_θ , pa i $(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) \in \mathcal{A}_\theta$. Pošto $(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) \in \text{Con}(\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$, sledi da $\mathcal{B} \vee \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$. Dalje, pošto je $(B \vee C)^2 \wedge \theta \leq (B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) \leq (B \vee C)^2$, a uvek važi da je $(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) \leq (B^2 \vee C^2) \wedge \theta \leq (B \vee C)^2 \wedge \theta$, sledi da je $(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) = (B^2 \vee C^2) \wedge \theta = (B \vee C)^2 \wedge \theta$, odnosno važe uslovi (ii) i (iii). ■

Pošto uvek važi da je:

$$(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) \leq (B^2 \vee C^2) \wedge \theta \leq (B \vee C)^2 \wedge \theta,$$

uslovi (ii) i (iii) su ekvivalentni sa uslovom:

$$(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) = (B \vee C)^2 \wedge \theta$$

Pošto je mreža $(\{B^2 \wedge \theta \mid \mathcal{B} \in \mathcal{D}_\theta\}, \leq)$ (podmreža od \mathcal{A}_θ) izomorfna sa mrežom $\text{Sub } \mathcal{A} / \theta$, iz prethodnog tvrdenja sledi:

Posledica 3.17 Za algebru \mathcal{A} i $\theta \in \text{Con } \mathcal{A}$, $Cw\mathcal{A} / \theta$ je podmreža od $Cw\mathcal{A}$ ako i samo ako je $\text{Sub } \mathcal{A} / \theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$. ■

Sledeća tvrdenja su direktne posledice nekih od mrežnih tvrdenja iz Poglavlja I, i daju neke potrebne uslove pod kojima je $Cw\mathcal{A} / \theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$.

Teorema 3.3 Neka je \mathcal{A} algebra sa nepraznom najmanjom podalgebrom \mathcal{B} . Ako je θ kodistributivni element mreže $Cw\mathcal{A}$ i za svake dve podalgebre \mathcal{B} i \mathcal{C} iz \mathcal{D}_θ sledi da i $\mathcal{B} \vee \mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$ tada je $Cw\mathcal{A} / \theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. Sledi iz Teoreme 3.2 Tvrdenja 1.27 iz Poglavlja I. ■

Posledica 3.18 Neka je \mathcal{A} algebra koja ima CIP i nepraznu najmanju podalgebru \mathcal{B}_m . Ako je θ distributivan i kodistributivan element mreže $\text{Con}\mathcal{A}$ i ako za svake dve podalgebre \mathcal{B} i \mathcal{C} iz \mathcal{D}_θ sledi da i $\mathcal{B}\mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$, tada je $Cw\mathcal{A}/\theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$ i \mathcal{A}/θ ima CIP.

Dokaz. Sledi iz Teoreme 3.2 i Posledice 3.13. ■

Posledica 3.19 Neka algebra \mathcal{A} ima CEP i CIP i nepraznu najmanju podalgebru \mathcal{B}_m . Ako je θ kodistributivan i kostandardan element mreže $Cw\mathcal{A}$ i ako za svake dve podalgebre \mathcal{B} i \mathcal{C} iz \mathcal{D}_θ sledi da i $\mathcal{B}\mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$, tada je $Cw\mathcal{A}/\theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$ i \mathcal{A}/θ ima CEP.

Dokaz. Sledi iz Teoreme 3.2 i Posledice 3.14. ■

Posledica 3.20 Ako algebra \mathcal{A} ima distributivnu mrežu slabih kongruencija i nepraznu najmanju podalgebru \mathcal{B}_m , i ako za svake dve podalgebre \mathcal{B} i \mathcal{C} iz \mathcal{D}_θ sledi da i $\mathcal{B}\mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$, tada je $Cw\mathcal{A}/\theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$ i \mathcal{A}/θ ima CEP i CIP.

Dokaz. Sledi iz prethodne dve posledice i činjenice da ako je $Cw\mathcal{A}$ distributivna mreža algebra \mathcal{A} ima CEP i CIP, a i θ je svakako neutralan element. ■

Teorema 3.4 Neka je \mathcal{A} algebra sa nepraznom najmanjom podalgebrom \mathcal{B}_m , koja zadovoljava CEP i wCIP. Ako je θ distributivan element mreže $\text{Con}\mathcal{A}$, i za svake dve podalgebre \mathcal{B} i \mathcal{C} iz \mathcal{D}_θ sledi da i $\mathcal{B}\mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$ tada je $Cw\mathcal{A}/\theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. Sledi iz Teoreme 3.2 i Tvrdjenja 1.26 iz Poglavlja I. ■


Posledica 3.21 Neka je \mathcal{A} algebra sa nepraznom najmanjom podalgebrom \mathcal{B}_m , koja zadovoljava CEP i CIP. Ako je θ distributivan element mreže $\text{Con}\mathcal{A}$, i za svake dve podalgebre \mathcal{B} i \mathcal{C} iz \mathcal{D}_θ sledi da i $\mathcal{B}\mathcal{C} \in \mathcal{D}_\theta$ tada je $Cw\mathcal{A}/\theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$ i \mathcal{A}/θ ima CIP. ■

Uslovi iz prethodne teoreme nisu i potrebni da bi $Cw\mathcal{A}/\theta$ bila podmreža od $Cw\mathcal{A}$, što pokazuje i sledeći primer:

Primer 3.5 Neka je $\mathcal{G}=(G,*)$ grupoid, gde je $G=\{a,b,c,d,e\}$ i operacija $*$ zadata Kejljevom tablicom:

*	a	b	c	d	e
a	c	c	b	c	c
b	c	c	a	d	d
c	b	a	a	e	e
d	c	d	e	e	e
e	c	d	e	e	d


Podgrupoidi ovog grupoida su: $B=\{a,b,c\}$ i $C=\{e,d\}$. Kongruencije su: G^2 , $\theta=\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d,e\}\}$ i Δ . Kongruencije na podgrupoidu B su B^2 , $\rho=\{\{a,b\},\{c\}\}$ i Δ_B . Mreža slabih kongruencija $Cw\mathcal{G}$ je na slici 3.6:



Slika 3.6

Grupoid \mathcal{G} nema CEP (jer je $\rho \vee \Delta = B^2 \vee \Delta$), nema wCIP (jer je $(\theta \wedge \rho) \vee \Delta = \Delta \neq \theta = \theta \wedge (\rho \vee \Delta)$), pa ni CIP, i najmanja podalgebra je prazna.

Medutim, CwA/θ je podmreža od CwA . CwA/θ , odnosno A_θ , dato je na slici 3.7:



Slika 3.7

Znači, uslovi iz Teoreme 3.3 nisu i potrebni da bi CwA/θ bila podmreža od CwA .

U sledećem delu razmatraju se neke klase algebri koje zadovoljavaju uslov da je mreža slabih kongruencija proizvoljne homomorfne slike algebre podmreža mreže slabih kongruencija te algebre.

Najjednostavniji slučaj su algebre kod kojih sve podalgebre pripadaju \mathcal{D}_θ za svaku kongruenciju θ . Za takve algebre uslovi za mrežu slabih kongruencija homomorfne slike da bude podmreža mreže slabih kongruencija te algebre svode se na čisto mrežne uslove - na položaj elementa θ u mreži CwA .

Druga klasa algebri koja zadovoljava potrebni algebarski uslov je klasa koherentnih algebri, algebri koje imaju svojstvo da ako neka podalgebra sadrži klasu neke kongruencije, tada je ta podalgebra unija klasa te kongruencije. Za koherentnu algebru A očigledno važi da iz $B, C \in \mathcal{D}_\theta$, za neko $\theta \in \text{Con}A$, sledi $BVC \in \mathcal{D}_\theta$.

Uz koherentnost, regularnost svake podalgebre za posmatranu algebru omogućuje ispunjenje i traženih mrežnih uslova Teoreme 3.2, pa važi sledeće tvrđenje:

Teorema 3.5 Neka je A koherentna algebra i $\theta \in \text{Con}A$. Ako su sve podalgebre iz \mathcal{D}_θ regularne, tada je CwA/θ podmreža od CwA .

Dokaz. Uslov (i) važi, jer je A koherentna algebra. Još treba pokazati da za svako B i C iz \mathcal{D}_θ važi $(B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta) = (BVC)^2 \wedge \theta$.

Neka je $\phi = \theta \wedge (BVC)^2$. Očito, $\phi \in \text{Con}(BVC)$ i ϕ je unija klasa od θ (jer $BVC \in \mathcal{D}_\theta$). $\psi = (B^2 \wedge \theta) \vee (C^2 \wedge \theta)$ takode pripada $\text{Con}(BVC)$. Pošto je uvek $\psi \leq \phi$, klase od θ koje pripadaju B i C su i klase od ψ , znači, ψ i ϕ imaju neke iste klase i pošto su obe iz $\text{Con}(BVC)$, i BVC je regularna, sledi da je $\psi = \phi$. ■

Posledica 3.22 Za svaku grupu \mathcal{S} , i \mathcal{N} normalnu podgrupu grupe \mathcal{S} ,

$Cw\mathcal{S}/N$ je podmreža od $Cw\mathcal{S}$.

Dokaz. Sledi iz Teoreme 3.5, jer je svaka grupa koherentna i regularna. ■

Posledica 3.23 Ako je \mathcal{A} algebra u koherentnom varijetetu, tada je za svaku $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$, $Cw\mathcal{A}/\theta$ je podalgebra od $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. Sledi iz Teoreme 3.5 i činjenice da je svaki koherentni varijetet kongruencijski regularan. ■

Traženo svojstvo imaju i algebre kod kojih je unija svake dve njene podalgebre opet podalgebra. (\cup -algebre):

Teorema 3.6 Ako je \mathcal{A} \cup -algebra, za svako $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$, $Cw\mathcal{A}/\theta$ je podmreža od $Cw\mathcal{A}$.

Dokaz. Ako $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$, i $B, C \in \mathcal{D}_\theta$, tada je očigledno i $B \vee C = B \cup C$ unija klasa od θ , odnosno $B \vee C \in \mathcal{D}_\theta$.

$\theta \wedge B^2$ je unija klasa od θ koje pripadaju B , slično je i $\theta \wedge C^2$ unija klasa od θ koje pripadaju C . $(\theta \wedge B^2) \vee (\theta \wedge C^2)$ je kongruencija na $B \vee C$, odnosno $B \cup C$. $\theta \wedge (B \cup C)^2$ je unija klasa od θ koje pripadaju $B \cup C$, pa je to i najmanja kongruencija na $B \cup C$ koja sadrži klase od θ iz B i klase od θ iz C , odakle sledi da je $(\theta \wedge B^2) \vee (\theta \wedge C^2) = \theta \wedge (B \cup C)^2$, što je i trebalo dokazati. ■

Posledica 3.24 Ako je \mathcal{A} unarna algebra, tada je za svako $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$ $Cw\mathcal{A}/\theta$ podmreža od $Cw\mathcal{A}$.


Dokaz. Sledi iz Teoreme 3.6 i činjenice da je unarna algebra \cup -algebra. ■

* * *

U sledećem delu ispitivaće se kada je mreža $Cw\mathcal{A}/\theta$ za $\theta \in \text{Con}\mathcal{A}$,

pored toga što je podmreža mreže CwA (za šta su uslovi ispitni u gornjem delu) i izomorfna sa odgovarajućim filtrom u mreži CwA (kao što je to slučaj sa $ConA/\theta$ i $ConA$).

Primer 3.6 Neka je $\mathcal{G} = (\{e, a, b, c, d, f\}, \cdot)$ ciklička grupa reda 6, tj. $b = a^2$, $c = a^3$, $d = a^4$, $f = a^5$ i $e = a^6$. Podgrupe ove grupe su: $B = \{e, b, d\}$, $C = \{e, c\}$ i $\{e\}$. Kongruencije su (zapisivanje po klasama): $\theta_1: \underline{ebd}, \underline{acf}$; $\theta_2: \underline{ec}, \underline{ad}, \underline{bf}$; Δ i G^2 . $Cw\mathcal{G}$ prikazana je na slici 3.8:



Slika 3.8

Ovde je $Cw\mathcal{G}/\theta_1 \cong [C^2]$. (jedino $C \in \mathcal{D}_{\theta_1}$).

Neka $\theta \in ConA$, za algebru A . Ispitivaće se kada je (kao u gornjem primeru) $CwA/\theta \cong [\underline{\theta}]$, gde je $\underline{\theta} = \wedge (\rho \in CwA \mid \rho \vee \Delta \geq \theta)$, u odnosu na preslikavanje $\rho \rightarrow \rho/\theta$.

U Tvrdenju 3.3 pokazano je da je svojstvo *CIP za algebru A ekvivalentno sa postojanjem kongruencije $\underline{\theta}$ za svaku kongruenciju $\theta \in ConA$. Moguće je da algebra nema *CIP, a da za neku kongruenciju θ postoji $\underline{\theta}$. Ovde će se ispitivati kada to svojstvo ($CwA/\theta \cong [\underline{\theta}]$) važi lokalno, za neku kongruenciju θ , i kada važi globalno, za svako $\theta \in ConA$. Kod ispitivanja kada to svojstvo važi globalno, pretpostavićemo da algebra koja je u pitanju ima *CIP.

Tvrđenje 3.39 Neka je A algebra i za svako $\theta \in ConA$ važi $CwA/\theta \cong [\underline{\theta}]$. Tada važi sledeće:

- 1) algebra A ima *CIP;
- 2) algebra A ima CEP;

3) za $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$ važi:

$$B[\theta] = B \text{ ako i samo ako } (B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = \theta.$$

Dokaz. 1) sledi iz Tvrdjenja 3.3.

2) Pretpostavimo da algebra \mathcal{A} ne zadovoljava CEP. Tada postoje slabe kongruencije ρ_1 i ρ_2 iz iste podalgebre $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$, takve da je $\rho_1 \vee \Delta = \rho_2 \vee \Delta = \theta \in \text{Con} \mathcal{A}$. Ako ρ_1 i ρ_2 nisu uporedive, posmatramo $\rho_1 \wedge \rho_2$ ($\rho_1 \wedge \rho_2$ pripada takode $\text{Con} \mathcal{B}$, a zbog *CIPa je $(\rho_1 \wedge \rho_2) \vee \Delta = \theta$). Znači, uzimamo da je $\rho_1 < \rho_2$. Sada je $B^2 \wedge \theta \geq \rho_2$ i $B^2 \wedge \theta > \rho_1$. Sledi da $\rho_1 \notin \text{Cw} \mathcal{A} / \theta$, ali $\rho_1 \geq \underline{\theta}$, odnosno $\rho_1 \in [\underline{\theta}]$. Ovo je u suprotnosti sa uslovom $\text{Cw} \mathcal{A} / \theta \cong [\underline{\theta}]$, pa početna pretpostavka nije tačna, znači, CEP važi.

3) Neka $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$ i $\theta \in \text{Con} \mathcal{A}$. Ako je $B[\theta] = B$, tada $B^2 \wedge \theta$ pripada, do na izomorfizam, $\text{Cw} \mathcal{A} / \theta$, odnosno, pripada $[\underline{\theta}]$. Znači, $(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta \geq \theta$, pa je $(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = \theta$.

Ako je $(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = \theta$, tada $B^2 \wedge \theta$ pripada filtru $[\underline{\theta}]$, pa $B^2 \wedge \theta$ pripada i $\text{Cw} \mathcal{A} / \theta$, pa je $B[\theta] = B$. ■

Obrat ovog tvrdjenja takode važi:

Tvrdjenje 3.39' Ako je \mathcal{A} algebra koja ima *CIP, CEP i za $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$ važi: $B[\theta] = B$ ako i samo ako $(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = \theta$, tada je za svako $\theta \in \text{Con} \mathcal{A}$,

$$\text{Cw} \mathcal{A} / \theta \cong [\underline{\theta}]$$

u odnosu na izomorfizam $\rho \rightarrow \rho / \theta$.

Dokaz. Za svako $\theta \in \text{Con} \mathcal{A}$, $\underline{\theta}$ postoji, jer \mathcal{A} ima *CIP. Ono što treba pokazati je da $\bigcup \{ [B^2 \wedge \theta, B^2] \mid B[\theta] = B, \text{ za } \mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A} \} = [\underline{\theta}]$, za svako $\theta \in \text{Con} \mathcal{A}$.

Neka $\rho \in [B^2 \wedge \theta, B^2]$, gde je $B[\theta] = B$. Iz $B[\theta] = B$ sledi da je $(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = \theta$, odakle $B^2 \wedge \theta \in [\underline{\theta}]$, odakle $\rho \in [\underline{\theta}]$. Ovim je pokazano:

$$\bigcup \{ [B^2 \wedge \theta, B^2] \mid B[\theta] = B, \text{ za } \mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A} \} \subseteq [\underline{\theta}].$$

Neka $\rho \in [\underline{\theta}]$, i $\rho \in \text{Con} \mathcal{B}$, za $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$. Sledi da je $\rho \vee \Delta \geq \theta$, odakle $B^2 \vee \Delta \geq \theta$. Pošto važi *CIP, sada je:

$$(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = (B^2 \vee \Delta) \wedge \theta = \theta, \text{ pa je prema uslovu tvrdjenja, } B[\theta] = B.$$

Dalje je $(\rho \wedge \theta) \vee \Delta = (\rho \vee \Delta) \wedge \theta = \theta = (B^2 \wedge \theta) \vee \Delta$,

i $(\rho \wedge \theta) \wedge \Delta = (B^2 \wedge \theta) \wedge \Delta$, pa je, s obzirom da važi CEP,

$\rho \wedge \theta = B^2 \wedge \theta$, znači, važi da je $\rho \geq B^2 \wedge \theta$, što pokazuje da

je: $[\underline{\theta}] \subseteq U([B^2 \wedge \theta, B^2] | B[\theta] = B, \text{ za } B \in \text{Sub} \mathcal{A})$. ■

Prethodna dva tvrđenja dokazuju sledeću teoremu:

Teorema 3.7 Za svaku kongruenciju $\theta \in \text{Con} \mathcal{A}$, algebre \mathcal{A} važi: $Cw \mathcal{A} / \theta \cong [\underline{\theta}]$ u odnosu na izomorfizam $\rho \rightarrow \rho / \theta$ ako i samo ako algebra \mathcal{A} ima *CIP, CEP i važi uslov:

$B[\theta] = B$ ako i samo ako $(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = \theta$. ■

Posledica 3.25 Data je algebra \mathcal{A} koja ima CEP i *CIP. Ako za svaku kongruenciju $\theta \in \text{Con} \mathcal{A}$ i svaku podalgebru $B \in \text{Sub} \mathcal{A}$ važi:

$B[\theta] = B$ ako i samo ako $(B^2 \wedge \theta) \vee \Delta = \theta$

tada svaka faktor algebra \mathcal{A} / θ ima CEP i CIP. ■

3.7 MREŽE SLABIH KONGRUENCIJA NEKIH POSEBNIH KLASA I VARIJETETA ALGEBRI

U sledećem delu ispitivaće se svojstva mreža slabih kongruencija nekih posebnih klasa algebri, kao što su unari, unarne algebre, mreže, grupe, prsteni, moduli, Hamiltonove algebre, Risove algebre,...

Algebra \mathcal{A} je **Hamiltonova** ako je svaka podalgebra algebre \mathcal{A} klasa neke kongruencije iz $\text{Con} \mathcal{A}$.

Algebra \mathcal{A} je **regularna** ako je svaka kongruencija jednoznačno određena svakom svojom klasom.

Algebra \mathcal{A} je **c-regularna** ako je svaka kongruencija jednoznačno određena klasom koja sadrži konstantu c .

Neka je \mathcal{A} algebra i \mathcal{A}_m njena najmanja podalgebra (pretpostavlja se da je neprazna). Algebra \mathcal{A} je **\mathcal{A}_m -regularna** ako je svaka kongruencija jednoznačno određena klasom koja sadrži \mathcal{A}_m .

Algebra \mathcal{A} je Risova ako je za svako $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$, $B^2 \cup \Delta$ kongruencija na \mathcal{A} .

Algebra \mathcal{A} je \cup -algebra ako je njena mreža podalgebri zatvorena u odnosu na skupovnu uniju.

Algebra \mathcal{A} je koherentna ako ima svojstvo da ako neka njena podalgebra sadrži klasu neke kongruencije, tada je ta podalgebra unija klasa te kongruencije.

*

U sledećih nekoliko tvrdenja ispituje se mreža slabih kongruencija unarne algebre.

Lema 3.16 Svaka unarna algebra je Hamiltonova.

Dokaz. Neka je \mathcal{A} unarna algebra. Ono što treba da se pokaže je da je svaka podalgebra blok neke kongruencije. Neka $\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$. Neka je ρ relacija definisana sa: $\rho = ((A \setminus B)^2 \cap \Delta) \cup B^2$. ρ je očigledno relacija ekvivalencije. Ako je $a \rho b$, onda ili $a \in B$ i $b \in B$ ili $a = b$. Ako $a \in B$ i $b \in B$, onda $f(a) \rho f(b)$, za svako $f \in F$, jer je B podalgebra, a ako je $a = b$, tada i $f(a) = f(b)$, za svako $f \in F$. Znači, ρ je i kongruencija, a B je njen blok, čime je tvrdjenje dokazano. ■

Lema 3.17 Unarna algebra je \cup -algebra koja ima jaki CEP. ■

Lema 3.18 Unarna algebra ima *CIP.

Dokaz. Sledi iz Leme 3.17, jer jaki CEP implicira *CIP. ■

Lema 3.19 Ako je \mathcal{A} unarna algebra, $\text{Sub}\mathcal{A}$ je distributivna mreža.

Dokaz. Pošto je za $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub}\mathcal{A}$, $B \vee C = B \cup C$, i $B \wedge C = B \cap C$, tvrdjenje važi. ■

Tvrđenje 3.40 Neka je \mathcal{A} unarna algebra. $Cw\mathcal{A}$ je modularna mreža akko je $\text{Con}\mathcal{A}$ modularna mreža.

Dokaz. Prema Posledici 3.8 potrebni i dovoljni uslovi za modularnost $Cw\mathcal{A}$ su da \mathcal{A} ima CEP i CIP, i da su $\text{Con}\mathcal{A}$ i $\text{Sub}\mathcal{A}$ modularne mreže. Iz Leme 3.17 sledi da algebra \mathcal{A} ima CEP, iz Leme 3.18 da ima

CIP, a iz Leme 3.19 da je $\text{Sub}A$ modularna mreža. Ovim je tvrdjenje dokazano. ■

Tvrđenje 3.41 Neka je A unarna algebra. $\text{Cw}A$ je distributivna mreža ako i samo ako je $\text{Con}A$ distributivna mreža.

Dokaz. Sličan kao dokaz Tvrđenja 3.40. ■

U skladu sa dogovorom na početku prvog dela ovog poglavlja \emptyset se ne smatra kao element mreže $\text{Cw}A$, osim ako to nije neophodno radi kompletiranja mreže. Samo pod tim uslovima važe sledeća lema, tvrdjenje, posledica i primer:

Lema 3.20 Neka je A unarna algebra. Ako je $\text{Cw}A$ komplementirana, tada A nema pravih podalgebri.


Dokaz. Ako je $\text{Cw}A$ komplementirana algebra, onda svaki element, pa i Δ mora imati komplement. Ako Δ ima komplement u $\text{Cw}A$, onda mora postojati minimalna podalgebra od A , za koju je $|A| > 1$. Neka je to \mathcal{B}_m , i $|\mathcal{B}_m| > 1$. Tada je komplement od Δ element \mathcal{B}_m^2 (jer komplement za Δ mora pripadati $\text{Con}\mathcal{B}_m$). Znači, $\Delta \vee \mathcal{B}_m^2 = A^2$. Iz $\Delta \vee \mathcal{B}_m^2 = \Delta \cup \mathcal{B}_m^2$ (Lema 3.12) sledi da je $\Delta \cup \mathcal{B}_m^2 = A^2$, odakle je $\mathcal{B}_m^2 = A^2$, odnosno, minimalna podalgebra te algebre je sama ta algebra. ■

Tvrđenje 3.42 Mreža slabih kongruencija unarne algebre je komplementirana ako i samo ako ta algebra nema pravih podalgebri, i mreža kongruencija te algebre je komplementirana. ■

Posledica 3.26 Mreža slabih kongruencija unarne algebre je Bulova mreža ako i samo ako ta algebra nema pravih podalgebri, i mreža kongruencija te algebre je Bulova mreža. ■

Primer 3.7 Neka je (A, f) unarna algebra, gde je $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ i $f = \begin{array}{|cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{array}$. Ova algebra nema podalgebri, a

prave kongruencije su: $\rho_1 = \{\{1,3,5\}, \{2,4,6\}\}$ i $\rho_2 = \{\{1,4\}, \{2,5\}, \{3,6\}\}$.



CwA je Bulova mreža.

Slika 3.9

Tvrđenje 3.43 Neka je A unarna algebra CwA je polumodularna mreža ako i samo ako je $ConA$ polumodularna mreža.

Dokaz. Ako je CwA polumodularna mreža, prema Tvrđenju 3.20. Neka je $ConA$ polumodularna mreža. Prema Lemi 3.19 $SubA$ je distributivna mreža, pa i polumodularna, prema Lemi 3.17 A ima jaki CEP, pa ima i CEP, a prema Lemi 3.18 A ima *CIP, pa ima i slabi CIP. Prema Tvrđenju 3.21 CwA je polumodularna mreža. ■

*

U sledećem delu karakterišu se mreže slabih kongruencija mreža, i daju se potrebni i dovoljni uslovi da mreža slabih kongruencija mreže bude modularna, distributivna, komplementirana i polumodularna.

Lema 3.21 [100] Ako je L mreža, $SubL$ je modularna mreža ako i samo ako je L lanac. ■

Lema 3.21' Ako je L mreža, $SubL$ je polumodularna mreža ako i samo ako je L lanac. ■

Lema 3.22 [100] Za svaku mrežu L , $ConL$ je distributivna mreža. ■

Lema 3.23 [100] Ako je L distributivna mreža, onda ona ima CEP. ■

Lema 3.24 [100] Lanac L zadovoljava CIP ako i samo ako on nema više od dva elementa. ■

Teorema 3.8 [100] Mreža L ima modularnu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako je ona lanac sa ne više od dva elementa. ■

Teorema 3.9 [100] Mreža L ima distributivnu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako je ona lanac sa ne više od dva elementa. ■


Teorema 3.10 [100] Neka je $L=(L, \wedge, \vee, 0, 1)$ mreža sa najmanjim i

najvećim elementom. Mreža \mathcal{L} ima komplementiranu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako ona ima komplementiranu mrežu podalgebri. ■

Teorema 3.11 Mreža \mathcal{L} ima polumodularnu mrežu slabih kongruencija ako i samo ako je \mathcal{L} lanac sa ne više od dva elementa.


Dokaz. Prema Tvrdenju 3.20, ako je $Cw\mathcal{L}$ polumodularna mreža, tada je i $Sub\mathcal{L}$ polumodularna mreža, odakle, prema Lemi 3.21' sledi da je \mathcal{L} lanac. Ako bi \mathcal{L} bio lanac sa više od dva elementa, tada bi $Cw\mathcal{L}$ imala kao konveksnu podmrežu $Cw\mathcal{L}_3$ (mreža slabih kongruencija troelementnog lanca), koja nije polumodularna (slika 3.10), pa ni $Cw\mathcal{L}$ ne bi bila polumodularna.

$Cw\mathcal{L}_2$ (mreža slabih kongruencija dvoelementnog lanca) je polumodularna mreža (slika 3.11), što dokazuje tvrdjenje.



$Cw\mathcal{L}_2$

Slika 3.10



$Cw\mathcal{L}_3$

Slika 3.11

*

U sledećem delu karakterišu se mreže slabih kongruencija grupe i prstena.

Neka je \mathcal{G} grupa i neka $\rho \in Cw\mathcal{G}$. Slaba kongruencija ρ jednoznačno određuje uređeni par $(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ podgrupa od \mathcal{G} , takvih da je \mathcal{K} normalna podgrupa od \mathcal{H} . Podgrupa \mathcal{H} je ona čijoj mreži kongruencija pripada ρ , a \mathcal{K} je normalna podgrupa od \mathcal{H} koja odgovara kongruenciji ρ na njoj (\mathcal{K} je klasa kongruencije ρ koja sadrži e -neutralni element te grupe).

Važi i obratno, svakom uređenom paru $(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ podgrupa od \mathcal{G} takvom

da je \mathcal{K} normalna podgrupa od \mathcal{H} jednoznačno odgovara slaba kongruencija- ona kongruencija na \mathcal{H} koju određuje \mathcal{K} .

Znači, postoji uzajamno jednoznačna korespodencija između skupa svih slabih kongruencija grupe, i skupa svih uredenih parova $(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ podgrupa grupe \mathcal{S} , takvih da je \mathcal{K} normalna podgrupa od \mathcal{H} .

Međutim, ako posmatramo mrežu $\text{Sub}\mathcal{S} \times \text{Sub}\mathcal{S}$, mreža $Cw\mathcal{S}$ nije njena podmreža. Operacija \wedge se poklapa, jer ako je \mathcal{K}_1 normalna podgrupa u \mathcal{H}_1 i \mathcal{K}_2 normalna podgrupa u \mathcal{H}_2 , tada je i $\mathcal{K}_1 \cap \mathcal{K}_2$ normalna podgrupa u $\mathcal{H}_1 \cap \mathcal{H}_2$, ali operacija \vee se u opštem slučaju ne poklapa, jer ako je \mathcal{K}_1 normalna podgrupa u \mathcal{H}_1 i \mathcal{K}_2 normalna podgrupa u \mathcal{H}_2 , tada $\mathcal{K}_1 \vee \mathcal{K}_2$ ne mora biti normalna podgrupa u $\mathcal{H}_1 \vee \mathcal{H}_2$.

Dijagonala Δ mreže $Cw\mathcal{S}$ odgovara uredenom paru $(\mathcal{S}, \{e\})$.

Neka je sa $\bar{\mathcal{K}}$ označena najmanja normalna podgrupa od \mathcal{S} koja sadrži \mathcal{K} . Neka je sa \mathcal{K} takode označena i slaba kongruencija koja odgovara uredenom paru $(\mathcal{K}, \mathcal{K})$. Očigledno je da je sada $\bar{\mathcal{K}} = \mathcal{K} \vee \Delta$, gde je Δ dijagonala mreže $Cw\mathcal{S}$. To dokazuje sledeće leme:

Lema 3.25 [102] Grupa \mathcal{S} ima CIP ako i samo ako za svake dve podgrupe \mathcal{H} i \mathcal{K} od \mathcal{S} važi:

$$\bar{\mathcal{H}} \cap \bar{\mathcal{K}} = \overline{\mathcal{H} \cap \mathcal{K}} . \quad \blacksquare$$

Lema 3.26 Grupa \mathcal{S} ima *CIP ako i samo ako za svaku familiju podgrupa od \mathcal{S} $\{\mathcal{H}_i \mid i \in I\}$ važi:

$$\bigcap_{i \in I} \bar{\mathcal{H}}_i = \overline{\bigcap_{i \in I} \mathcal{H}_i} . \quad \blacksquare$$

Sledeća tvrđenja daju karakterizaciju Hamiltonovih grupa preko svojstava mreža slabih kongruencija.

Hamiltonove grupe su nekomutativne grupe čije su sve podgrupe normalne. Znači, klasu grupa koje su i Hamiltonove algebre čine Hamiltonove i komutativne grupe.

Tvrđenje 3.44 [102] Grupa \mathcal{S} je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako ima CIP i CEP. ■

Dokaz. Ako je grupa \mathcal{G} Hamiltonova ili komutativna, tada je Δ neutralni element mreže $Cw\mathcal{G}$, jer je preslikavanje $\rho \rightarrow (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ iz $Cw\mathcal{G}$ u $Sub\mathcal{G} \times Con\mathcal{G}$ potapanje. Zaista, za grupe čija je svaka podgrupa normalna definisana korespodencija između mreže $Cw\mathcal{G}$ i svih uređenih parova podgrupa je potapanje (i operacija \vee se u ovom slučaju poklapa, jer ako je K_1 normalna podgrupa u \mathcal{H}_1 i K_2 normalna podgrupa u \mathcal{H}_2 , tada je i $K_1 \vee K_2$ normalna podgrupa u $\mathcal{H}_1 \vee \mathcal{H}_2$). Kod Hamiltonovih i komutativnih grupa je $Sub\mathcal{G} \cong Con\mathcal{G}$ u odnosu na izomorfizam $\mathcal{H} \rightarrow (\mathcal{G}, \mathcal{H})$, za \mathcal{H} podgrupu grupe \mathcal{G} , gde je sa $(\mathcal{G}, \mathcal{H})$ predstavljena kongruencija koju indukuje (normalna podgrupa) \mathcal{H} . Pošto se $Cw\mathcal{G}$ potapa u $Sub\mathcal{G} \times Sub\mathcal{G}$, i postoji izomorfizam iz $Sub\mathcal{G}$ u $Con\mathcal{G}$, i $Cw\mathcal{G}$ se može potopiti u $Sub\mathcal{G} \times Con\mathcal{G}$, i to potapanje je baš ono koje je potrebno, jer za $\rho \in Cw\mathcal{G}$, ako njoj odgovara uređeni par $(\mathcal{H}, \mathcal{K})$, $\rho \wedge \Delta$ je tada \mathcal{H} , a $\rho \vee \Delta$ je kongruencija određena sa $(\mathcal{G}, \mathcal{K})$, jer je \mathcal{K} normalna podgrupa grupe \mathcal{G} , i to je najmanja kongruencija koja sadrži ρ . Znači preslikavanje $\rho \rightarrow (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ je potapanje pa je prema Lemi 1.3 iz Poglavlja I Δ neutralni element mreže $Cw\mathcal{G}$, pa, prema Posledici 3.1, važe CEP i CIP.

Ako grupa ima CEP i CIP, tada je preslikavanje $\rho \rightarrow (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ potapanje iz $Cw\mathcal{G}$ u $Sub\mathcal{G} \times Con\mathcal{G}$. Prema gornjem predstavljanju preko uređenih parova podgrupa, ako ρ predstavimo kao $(\mathcal{H}, \mathcal{K})$, gde je \mathcal{K} normalna podgrupa od \mathcal{H} , $\rho \wedge \Delta$ odgovara podgrupi \mathcal{H} , a $\rho \vee \Delta$ je najmanja kongruencija koja sadrži ρ , a ona je određena najmanjom normalnom podgrupom koja sadrži \mathcal{K} , a to je $\bar{\mathcal{K}}$. Znači, gornje potapanje možemo predstaviti kao $(\mathcal{H}, \mathcal{K}) \rightarrow (\mathcal{H}, \bar{\mathcal{K}})$. Znači, $\mathcal{K} \rightarrow \bar{\mathcal{K}}$ je takođe potapanje iz $Sub\mathcal{G}$ u $Con\mathcal{G}$. Znači, $Sub\mathcal{G}$ je podmreža od $Con\mathcal{G}$, a pošto $Con\mathcal{G}$ predstavlja mrežu svih normalnih podgrupa grupe \mathcal{G} , imamo da je $Sub\mathcal{G} \cong Con\mathcal{G}$, odnosno grupa \mathcal{G} je Hamiltonova ili komutativna. ■

Tvrđenje 3.45 [102] Grupa \mathcal{G} je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako je njena mreža slabih kongruencija $Cw\mathcal{G}$ modularna. ■

Dokaz. Grupa je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako ima

CEP i CIP, prema prethodnom tvrdenju. Kod tih grupa $\text{Con}\mathcal{G}$ i $\text{Sub}\mathcal{G}$ su modularne mreže. Odatle sledi, prema Posledici 3.8, da je $\text{Cw}\mathcal{G}$ modularna mreža. Sa druge strane, ako je $\text{Cw}\mathcal{G}$ modularna mreža tada važe CEP i CIP prema Posledici 3.8, pa je grupa Hamiltonova ili komutativna. ■

Tvrđenje [3.46 [102] Grupa \mathcal{G} je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako je Δ izuzetan element u mreži $\text{Cw}\mathcal{G}$.

Dokaz. Prema Tvrđenju 3.44 grupa je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako je Δ neutralan element u mreži $\text{Cw}\mathcal{G}$. Δ je i izuzetan, jer su najveći elementi klasa kongruencije indukovani sa $m_\Delta: x \rightarrow x \wedge \Delta$ kvadrati podalgebri (tj. za \mathcal{B} podalgebru od \mathcal{G} , slaba kongruencija određena sa $(\mathcal{B}, \mathcal{B})$), a ti kvadrati čine podmrežu od $\text{Cw}\mathcal{G}$. ■

Tvrđenje 3.47 Grupa \mathcal{G} je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako ima *CIP.

Dokaz. Ako je \mathcal{G} Hamiltonova ili komutativna svaka njena podgrupa je normalna, pa je *CIP očigledno zadovoljen.

Obratno, ako grupa \mathcal{G} nije Hamiltonova ni komutativna, postoji podgrupa \mathcal{H} koja nije normalna u \mathcal{G} . Neka je $\{\mathcal{H}_i \mid i \in I\}$ familija njoj konjugovanih podgrupa. Tada je $\bar{\mathcal{H}} = \bar{\mathcal{H}}_i$, za svako $i \in I$. Pošto je presek svih međusobno konjugovanih podgrupa normalna podgrupa, važi da je:

$$\mathcal{H} \cap \left(\bigcap_{i \in I} \mathcal{H}_i \right) = \mathcal{N}, \text{ gde je } \mathcal{N} \text{ normalna podgrupa grupe } \mathcal{G}.$$

Sledi da je:

$$\overline{\mathcal{H} \cap \left(\bigcap_{i \in I} \mathcal{H}_i \right)} = \bar{\mathcal{N}} = \mathcal{N} \subset \mathcal{H} \subset \bar{\mathcal{H}} = \bar{\mathcal{H}} \cap \left(\bigcap_{i \in I} \bar{\mathcal{H}}_i \right),$$

odakle sledi da grupa \mathcal{G} ne zadovoljava *CIP. ■

Posledica 3.27 Grupa \mathcal{G} je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako ima CIP i Δ je v -neprekidan element mreže $\text{Cw}\mathcal{G}$.

Dokaz. Sledi iz prethodnog tvrđenja i Tvrđenja 3.8. ■

Posledica 3.28 [128] Konačna grupa \mathcal{G} je Hamiltonova i komutativna

ako i samo ako ima CIP. ■

Problem. [128] Da li važi da je proizvoljna grupa Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako važi CIP, odnosno da li kod grupa CIP implicira *CIP?

Mogući putokaz za karakterisanje grupa kod kojih je svojstvo "biti Hamiltonova ili komutativna" ekvivalentno sa svojstvom CIP, daje sledeće tvrdjenje.

Tvrđenje 3.47 Grupa \mathcal{G} je Hamiltonova ili komutativna ako i samo ako za svaku normalnu podgrupu N od \mathcal{G} familija podgrupa \mathcal{H}_i od \mathcal{G} takvih da je $\overline{\mathcal{H}_i} = N$ ima najmanji element. ■

*

Kod prstena situacija je analogna kao kod grupa.

Neka je \mathcal{P} prsten i neka $\rho \in \text{Cw}\mathcal{P}$. Slaba kongruencija ρ jednoznačno određuje uređeni par $(\mathcal{R}, \mathcal{I})$ potprstena od \mathcal{P} , takvih da je \mathcal{I} ideal prstena \mathcal{R} , i obratno, svaki uređeni par $(\mathcal{R}, \mathcal{I})$ potprstena od \mathcal{P} takav da je \mathcal{I} ideal u \mathcal{R} određuje jednu slabu kongruenciju iz $\text{Cw}\mathcal{P}$. Kao kod grupa ni $\text{Cw}\mathcal{P}$ nije podmreža od $\text{Sub}\mathcal{P} \times \text{Sub}\mathcal{P}$.

Dijagonala Δ u mreži $\text{Cw}\mathcal{P}$ odgovara uređenom paru $(\mathcal{P}, \{e\})$.

Neka je sa $\bar{\mathcal{R}}$ označen najmanji ideal prstena \mathcal{P} koji sadrži potprsten \mathcal{R} . Ako je sa \mathcal{R} označena slaba kongruencija koja odgovara uređenom paru $(\mathcal{R}, \mathcal{R})$ tada je $\bar{\mathcal{R}} = \mathcal{R} \vee \Delta$, pa važe sledeća tvrđenja:

Lema 3.27 Prsten \mathcal{P} ima CIP ako i samo ako za svaka dva potprstena \mathcal{R} i \mathcal{I} od \mathcal{P} važi:

$$\bar{\mathcal{R}} \cap \bar{\mathcal{I}} = \overline{\mathcal{R} \cap \mathcal{I}}. \quad \blacksquare$$

Lema 3.28 Prsten \mathcal{P} ima *CIP ako i samo ako za svaku familiju potprstena od \mathcal{P} $\{\mathcal{R}_i \mid i \in I\}$ važi:

$$\bigcap_{i \in I} \bar{\mathcal{R}}_i = \overline{\bigcap_{i \in I} \mathcal{R}_i}. \quad \blacksquare$$

U sledećim tvrđenjima karakterišu se Hamiltonovi prsteni, prsteni

kod kojih je svaki potprsten ideal.

Tvrđenje 3.48 Prsten \mathcal{P} je Hamiltonov ako i samo ako ima CIP i CEP.

Dokaz. Ako je prsten Hamiltonov to znači da je svaki potprsten i ideal. Zato, ako je $(\mathcal{R}_1, \mathcal{I}_1)$ uređeni par koji odgovara slaboju kongruenciji ρ_1 i $(\mathcal{R}_2, \mathcal{I}_2)$ uređeni par koji odgovara slaboju kongruenciji ρ_2 (\mathcal{I}_1 ideal od \mathcal{R}_1 i \mathcal{I}_2 ideal od \mathcal{R}_2) onda uvek važi da je $\mathcal{I}_1 \wedge \mathcal{I}_2$ ideal od $\mathcal{R}_1 \wedge \mathcal{R}_2$. Ovde važi i da je $\mathcal{I}_1 \vee \mathcal{I}_2$ ideal od $\mathcal{R}_1 \vee \mathcal{R}_2$. Znači, $Cw\mathcal{P}$ je podmreža od $Sub\mathcal{P} \times Sub\mathcal{P}$, pa i od $Sub\mathcal{P} \times Con\mathcal{P}$ (jer je $Sub\mathcal{P} \cong Con\mathcal{P}$ kod Hamiltonovog prstena). To potapanje iz $Cw\mathcal{P}$ u $Sub\mathcal{P} \times Con\mathcal{P}$ je preslikavanje $\rho \rightarrow (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$. Zaista, $\rho \wedge \Delta$ određuje podalgebru na kojoj je ρ kongruencija, a ako ρ odgovara uređenom paru $(\mathcal{R}, \mathcal{I})$, tada je \mathcal{I} ideal u \mathcal{R} , ali je ideal i u \mathcal{P} , jer je prsten Hamiltonov, pa za $\rho \vee \Delta$ odgovara uređeni par $(\mathcal{P}, \mathcal{I})$, koji je odgovarajući za potprsten \mathcal{I} , kod izomorfizma iz $Sub\mathcal{P}$ u $Con\mathcal{P}$ (slično kao kod grupa). Znači, pošto je preslikavanje $\rho \rightarrow (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ potapanje, Δ je neutralan elemenat, i važe CEP i CIP.

Obratno, ako prsten ima CEP i CIP, gore definisano preslikavanje $\rho \rightarrow (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ je potapanje. To potapanje, slično kao i kod grupa indukuje preslikavanje $(\mathcal{R}, \mathcal{I}) \mapsto (\mathcal{R}, \bar{\mathcal{I}})$, gde je \mathcal{I} ideal od \mathcal{R} , i $\bar{\mathcal{I}}$ najmanji ideal koji sadrži potprsten \mathcal{I} . Pošto svaki ideal indukuje kongruenciju na prstenu, ovo preslikavanje indukuje potapanje iz $Sub\mathcal{P}$ u $Con\mathcal{P}$, a pošto je $Con\mathcal{P}$ mreža svih ideala prstena \mathcal{P} , sledi da je $Sub\mathcal{P} \cong Con\mathcal{P}$, i prsten \mathcal{P} je Hamiltonov. ■

Tvrđenje 3.49 Prsten \mathcal{P} je Hamiltonov ako i samo ako je $Cw\mathcal{P}$ modularna mreža.

Dokaz. Ako je prsten \mathcal{P} Hamiltonov, on zadovoljava CEP i CIP, a $Con\mathcal{P}$ i $Sub\mathcal{P}$ (mreže svih ideala prstena \mathcal{P}) su modularne mreže, pa je i $Cw\mathcal{P}$ modularna mreža (prema Posledici 3.8).

Obratno, ako je $Cw\mathcal{P}$ modularna mreža tada \mathcal{P} ima CEP i CIP, pa je prema prethodnom tvrdenju prsten Hamiltonov. ■

Tvrđenje 3.50 Ako je prsten \mathcal{P} Hamiltonov onda \mathcal{P} ima *CIP.

Dokaz. Ako je \mathcal{P} Hamiltonov prsten, svaki njegov potprsten je ideal, pa je *CIP očigledno zadovoljen. ■

Problem. Da li važi da je konačan prsten Hamiltonov ako i samo ima CIP?

(Kompjuterom je provereno da ovo tvrđenje važi za sve prstene sa najviše 8 elemenata).

*

U sledećem delu razmatraju se mreže slabih kongruencija za module.

U sledećim tvrđenjima M je desni \mathcal{R} -modul, ali razmatranje je potpuno isto i za levi \mathcal{R} -modul, ili za \mathcal{R} -modul nad komutativnim prstenom.

Tvrđenje 3.51 Svaki modul M ima svojstva CEP i CIP. ■

Dokaz. Prema Posledici 3.1 svaka algebra ima CEP i CIP ako i samo ako je preslikavanje $f: Cw\mathcal{A} \rightarrow \text{Sub}\mathcal{A} \times \text{Con}\mathcal{A}$ definisano sa: $f(\rho) = (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta)$ potapanje. Kod modula važi da je $\text{Sub}M \cong \text{Con}M$, jer je svaki podmodul normalna podgrupa odgovarajuće grupe, koja određuje jednu kongruenciju te grupe, a ta kongruencija je i kongruencija na modulu (saglasna je i sa svim unarnim operacijama modula ("množenjem sa skalarima iz prstena")). Takode svaka slaba kongruencija $\rho \in CwM$ jednoznačno određuje uređeni par podmodula od M (M_1, M_2) , takvih da je M_2 podmodul od M_1 , i obratno, svaki uređeni par podmodula (M_1, M_2) , takav da je M_2 podmodul od M_1 jednoznačno određuje slabu kongruenciju ρ iz CwM . Za $\rho \in CwM$ važi da je $f(\rho) = (\rho \wedge \Delta, \rho \vee \Delta) = (M_1, M_2)$, gde je (M_1, M_2) odgovarajući uređeni par za ρ , gde M_2 označava istovremeno i

kongruenciju koja je određena sa M_2 na modulu M . Slično kao kod grupa pokazuje se da je preslikavanje f potapanje, pa svaki modul ima CEP i CIP. ■

Tvrđenje 3.52 Neka je M R -modul. Mreža slabih kongruencija CwM je modularna mreža.

Dokaz. Pošto su $SubM$ i $ConM$ modularne mreže (kao mreže normalnih podgrupa odgovarajuće grupe), a važe CEP i CIP, iz Posledice 3.1 sledi da je CwM modularna mreža. ■

Posledica 3.29 Varijetet modula je CEP i CIP varijetet. Varijetet modula je slabo-kongruencijski modularan. ■

*

U sledećem delu karakterišu se Hamiltonove algebre, kao i one koje su Hamiltonove i B_m -regularne, preko svojstava njihovih mreža slabih kongruencija. U tom cilju koriste se sledeće leme:

Lema 3.29 Ako algebra A ima jednočlanu najmanju podalgebru, tada svaka slaba kongruencija $\rho \in CwA$ ima klasu koja je podalgebra.

Dokaz. Neka je $B_m = \{e\}$, i neka $\rho \in CwA$. Neka je $B = \{x \in A \mid x\rho e\}$. B je podalgebra algebre A , jer ako $f \in F$ i f je ranga n , i $x_1, \dots, x_n \in B$, tj. $x_1\rho e, \dots, x_n\rho e$, sledi da $f(x_1, \dots, x_n)\rho e$. B je klasa slabe kongruencije ρ , što dokazuje tvrđenje. ■

Lema 3.30 Ako algebra A ima nepraznu najmanju podalgebru, tada za svako $B, C \in SubA$ važi da je:

$$(B \vee C)^2 = B^2 \vee C^2. \quad \blacksquare$$

Tvrđenje 3.53 Algebra A je Hamiltonova ako i samo ako za sve $B, C \in SubA$,

$$\text{iz } B < C \text{ sledi } B^2 \vee A \neq C^2 \vee A \quad (*)$$

u mreži CwA .

Dokaz. Neka je \mathcal{A} Hamiltonova algebra i neka je $B < C$ (za $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub}\mathcal{A}$). Tada je $B^2 \leq C^2$. Svaka podalgebra, pa i B je tada blok neke kongruencije. Najmanja kongruencija koja sadrži B^2 je $B^2 \vee \Delta$, pa je B tada svakako blok kongruencije $B^2 \vee \Delta$. To znači da je $B^2 \vee \Delta \neq C^2 \vee \Delta$, jer ako bi važila jednakost, iz $C^2 > B^2$ sledilo bi da B^2 nije blok te kongruencije, što vodi u kontradikciju sa pretpostavkom.

Obratno, pretpostavimo da algebra \mathcal{A} nije Hamiltonova. Znači postoji podalgebra \mathcal{B} koja nije blok nijedne kongruencije, pa ni $B^2 \vee \Delta$. Neka je $C = B[B^2 \vee \Delta]$. \mathcal{C} je takođe podalgebra od \mathcal{A} i važi $B^2 \vee \Delta = C^2 \vee \Delta$. Znači da uslov (*) ne važi, čime je tvrđenje dokazano. ■

Posledica 3.30 Neka algebra \mathcal{A} ima najmanju nepraznu podalgebru \mathcal{A}_m . Algebra \mathcal{A} je Hamiltonova ako i samo ako za sve $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub}\mathcal{A}$,

iz $B \neq C$ sledi da je $B^2 \vee \Delta \neq C^2 \vee \Delta$.

Dokaz. Neka je \mathcal{A} Hamiltonova algebra sa nepraznom minimalnom podalgebrom \mathcal{A}_m , i neka su \mathcal{B} i \mathcal{C} dve proizvoljne podalgebre od \mathcal{A} za koje važi da je $B^2 \vee \Delta = C^2 \vee \Delta$. B^2 i C^2 su klase iste kongruencije od \mathcal{A} . B i C svakako imaju neprazan presek, jer $\mathcal{A}_m \subseteq B \cap C$. Sledi da je $B = C$.

Obratna implikacija sledi iz prethodnog tvrđenja. ■

Posledica 3.31 Algebra \mathcal{A} u kojoj je najmanja podalgebra neprazna je Hamiltonova ako i samo ako je preslikavanje $B \rightarrow B^2 \vee \Delta$ ($\mathcal{B} \in \text{Sub}\mathcal{A}$) injekcija iz $\text{Sub}\mathcal{A}$ u $\text{Con}\mathcal{A}$ (u $Cw\mathcal{A}$). ■

Tvrđenje 3.54 Ako je \mathcal{A} Hamiltonova algebra koja ima CIP i najmanju nepraznu podalgebru \mathcal{A}_m onda je preslikavanje definisano sa $B \rightarrow B^2 \vee \Delta$ potapanje iz $\text{Sub}\mathcal{A}$ u $\text{Con}\mathcal{A}$ (u mreži $Cw\mathcal{A}$).

Dokaz. Iz prethodne posledice sledi da je definisano preslikavanje injekcija.

Neka $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{A}$. Tada je:

$$(B^2 \vee \Delta) \wedge (C^2 \vee \Delta) = (B^2 \wedge C^2) \vee \Delta = (B \wedge C)^2 \vee \Delta, \text{ jer važi CIP, i}$$

$$(B^2 \vee \Delta) \vee (C^2 \vee \Delta) = (B^2 \vee C^2) \vee \Delta = (B \vee C)^2 \vee \Delta, \text{ što sledi iz Leme 3.30, pa}$$

je preslikavanje $B \rightarrow B^2 \vee \Delta$ potapanje. ■

Sledeće tvrdenje karakteriše \mathcal{A}_m -regularne algebre sa jednočlanom nepraznom podalgebrom.

Tvrđenje 3.55 Algebra \mathcal{A} sa jednočlanom najmanjom podalgebrom \mathcal{A}_m je \mathcal{A}_m -regularna ako i samo ako je svaka kongruencija $\rho \in \text{Con} \mathcal{A}$ jednaka $B^2 \vee \Delta$, za neko $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$.

Dokaz. Za svako $\rho \in \text{Con} \mathcal{A}$, prema Lemi 3.29 postoji podalgebra $\mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{A}$ koja je klasa kongruencije ρ . C je tada klasa i u $C^2 \vee \Delta$, odnosno, kongruencije ρ i $C^2 \vee \Delta$ imaju istu klasu koja sadrži \mathcal{A}_m , pa iz \mathcal{A}_m -regularnosti algebre \mathcal{A} sledi da je $\rho = C^2 \vee \Delta$.

Obratno, pretpostavimo da postoje dve kongruencije ρ i θ koje imaju istu klasu B koja sadrži \mathcal{A}_m (prema dokazu Leme 3.29 ta klasa je podalgebra od \mathcal{A}). Po pretpostavci, postoje $\mathcal{C}, \mathcal{D} \in \text{Sub} \mathcal{A}$, takve da je $\rho = C^2 \vee \Delta$, i $\theta = D^2 \vee \Delta$. B je klasa kongruencije ρ koja sadrži \mathcal{A}_m , i pošto C takođe sadrži \mathcal{A}_m , sledi da je $C \leq B$, odakle je $C^2 \vee \Delta \leq B^2 \vee \Delta$. Pošto je $B^2 \vee \Delta$ najmanja kongruencija koja sadrži B kao klasu, a $C^2 \vee \Delta$ sadrži B kao klasu, sledi da je $B^2 \vee \Delta = C^2 \vee \Delta$. Na sličan način dobija se da je $B^2 \vee \Delta = D^2 \vee \Delta$, odakle je $D^2 \vee \Delta = C^2 \vee \Delta$, odnosno $\rho = \theta$, što znači da je algebra \mathcal{A} \mathcal{A}_m -regularna. ■

Lema 3.31 Ako je \mathcal{A} Hamiltonova algebra sa nepraznom najmanjom podalgebrom \mathcal{A}_m tada za $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{A}$,

$$\text{iz } B^2 \vee \Delta \leq C^2 \vee \Delta \text{ sledi } B \leq C.$$

Dokaz. Pošto je \mathcal{A} Hamiltonova algebra, B , odnosno C , su redom klase u $B^2 \vee \Delta$, odnosno u $C^2 \vee \Delta$. Iz $B \cap C \neq \emptyset$ i $B^2 \vee \Delta \leq C^2 \vee \Delta$ sledi da je $B \leq C$. ■

Tvrđenje 3.56 Ako je \mathcal{A} algebra sa jednočlanom najmanjom podalgebrom \mathcal{A}_m , sledeća tvrđenja su ekvivalentna:

- (i) \mathcal{A} je Hamiltonova i \mathcal{A}_m -regularna;
- (ii) preslikavanje $B \rightarrow B^2 \vee \Delta$ ($B \in \text{Sub}\mathcal{A}$) je izomorfizam iz $\text{Sub}\mathcal{A}$ u $\text{Con}\mathcal{A}$. (u $\text{Cw}\mathcal{A}$).

Dokaz. (i) \rightarrow (ii).

Neka je \mathcal{A} Hamiltonova algebra sa jednočlanom najmanjom podalgebrom \mathcal{A}_m koja je \mathcal{A}_m -regularna. Prema Posledici 3.31 i Tvrđenju 3.55 preslikavanje $B \rightarrow B^2 \vee \Delta$ je bijekcija iz $\text{Sub}\mathcal{A}$ u $\text{Con}\mathcal{A}$.

Ono što još treba dokazati je da je preslikavanje $B \rightarrow B^2 \vee \Delta$ izomorfizam, odnosno, za $B, C \in \text{Sub}\mathcal{A}$,

$$(B^2 \vee \Delta) \vee (C^2 \vee \Delta) = (B \vee C)^2 \vee \Delta \quad \text{i}$$

$$(B^2 \vee \Delta) \wedge (C^2 \vee \Delta) = (B \wedge C)^2 \vee \Delta.$$

Prema Lemi 3.30 važi da je:

$$(B^2 \vee \Delta) \vee (C^2 \vee \Delta) = (B^2 \vee C^2) \vee \Delta = (B \vee C)^2 \vee \Delta.$$

Prema Tvrđenju 3.56 postoji podalgebra \mathcal{D} takva da je:

$(B^2 \vee \Delta) \wedge (C^2 \vee \Delta) = D^2 \vee \Delta$. Prema prethodnoj Lemi iz $D^2 \vee \Delta \leq B^2 \vee \Delta$ i $D^2 \vee \Delta \leq C^2 \vee \Delta$ sledi da je $D \leq B$ i $D \leq C$, odnosno, $D \leq B \wedge C$. Iz $(B \wedge C)^2 \vee \Delta \leq (B^2 \vee \Delta) \wedge (C^2 \vee \Delta) = D^2 \vee \Delta$ sledi da je $B \wedge C \leq D$, pa je $B \wedge C = D$, odnosno:
 $(B^2 \vee \Delta) \vee (C^2 \vee \Delta) = (B \vee C)^2 \vee \Delta$.

(ii) \rightarrow (i)

Prema Posledici 3.31 algebra \mathcal{A} je Hamiltonova, a prema Tvrđenju 3.55 algebra \mathcal{A} je \mathcal{A}_m -regularna, što dokazuje tvrđenje. ■

Lema 3.32 Ako je preslikavanje $B \rightarrow B^2 \vee \Delta$ izomorfizam iz $\text{Sub}\mathcal{A}$ u $\text{Con}\mathcal{A}$ tada su sledeća tvrđenja ekvivalentna za svako $\mathcal{C} \in \text{Con}\mathcal{A}$:

(i) $\text{Con}\mathcal{C} \cong (C^2 \vee \Delta)_{\text{Con}\mathcal{A}}$ (ideal u mreži $\text{Con}\mathcal{A}$) u odnosu na preslikavanje $\rho \rightarrow \rho \vee \Delta$ ($\rho \in \text{Con}\mathcal{C}$);

(ii) $\text{Sub}\mathcal{C} \cong \text{Con}\mathcal{C}$ u odnosu na preslikavanje $D \rightarrow D^2 \vee \Delta_{\mathcal{C}}$ (za

$\mathcal{D} \in \text{Sub} \mathcal{C}$).

Dokaz. Preslikavanje $D \rightarrow D^2 \vee \Delta$ je izomorfizam iz $\text{Sub} \mathcal{C}$ u $(C^2 \vee \Delta)_{\text{Con} \mathcal{A}}$. Ako je $\text{Con} \mathcal{C} \cong (C^2 \vee \Delta)_{\text{Con} \mathcal{A}}$, tada je i $\text{Sub} \mathcal{C} \cong \text{Con} \mathcal{C}$, i obratno, ako je $\text{Sub} \mathcal{C} \cong \text{Con} \mathcal{C}$, tada je i $\text{Con} \mathcal{C} \cong (C^2 \vee \Delta)_{\text{Con} \mathcal{A}}$. ■

Tvrđenje 3.57 Neka je \mathcal{A} algebra sa jednočlanom najmanjom podalgebrom \mathcal{A}_m . Tada su sledeća tvrđenja ekvivalentna:

(i) \mathcal{A} je Hamiltonova algebra i svaka podalgebra od \mathcal{A} je \mathcal{A}_m -regularna;

(ii) preslikavanje $C \rightarrow C^2 \vee \Delta_B$ ($\mathcal{C} \in \text{Sub} \mathcal{B}$) je izomorfizam iz $\text{Sub} \mathcal{B}$ u $\text{Con} \mathcal{B}$, za sve $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$;

(iii) algebra \mathcal{A} ima svojstva *CIP, CEP, i skup minimalnih slabih kongruencija u klasama indukovanim preslikavanjem $\rho \rightarrow \rho \vee \Delta$ je skup svih kvadrata B^2 (za $\mathcal{B} \in \text{Sub} \mathcal{A}$).

Dokaz.

(i) \leftrightarrow (ii) Sledi iz Tvrđenja 3.56.

(ii) \leftrightarrow (iii) Sledi iz Tvrđenja 1.16 iz Poglavlja I i Leme 3.32. ■

*

U sledećem delu karakterišu se Risove algebre, Risovi varijeteti i data je jedna karakterizacija varijeteta skupova preko svojstava mreža slabih kongruencija tih algebri, ili svih algebri tog varijeteta, koristeći, u ovom poglavlju već navedene rezultate u vezi sa problemom kada je za algebru \mathcal{A} mreža $Cw\mathcal{A}$ podmreža mreže $Ew\mathcal{A}$, a kada se mreže $Cw\mathcal{A}$ i $Ew\mathcal{A}$ poklapaju.

Tvrđenje 3.58 Za varijetet V sledeći uslovi su ekvivalentni:

(1) V je Risov varijetet.

(2) Za svako $\mathcal{A} \in V$, $Cw\mathcal{A}$ je podmreža od $Ew\mathcal{A}$.

Dokaz . (2) \rightarrow (1)

Sledi iz Tvrdjenja 3.15.

(1)→(2)

Ako je V Risov varijetet i $A \in V$, tada je mreža podalgebri $\text{Sub}A$ zatvorena u odnosu na skupovnu uniju i A zadovoljava jaki CEP ([*]), pa je prema Tvrdjenju 3.16 za svaku $A \in V$ CwA podmreža od EwA . ■

Tvrdjenje 3.59 Za varijetet V sledeći uslovi su ekvivalentni:

- (1) Za svako $A \in V$, $CwA = EwA$.
- (2) V je ekvivalentan varijetetu skupova.

Dokaz. Sledi direktno iz Posledice 3.6. ■

L I T E R A T U R A

- [1] M. Aigner, Combinatorial theory, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1979
- [2] R. Balbes, A representation theorem for distributive quasi lattices, Fund. Math 68 (1970) 207-214.
- [3] R. Beazer, Coherent De Morgan algebras, Algebra Universalis, 24(1987) 128-136.
- [4] G. Birkhoff, Lattice Theory, Third Edition, Reprinted 1984, AMS, Providence, R. I.
- [5] G. Birkhoff, Some applications of universal algebra, Coll. Math. Soc. Janos Bolyai, 29. Univ. Alg, Esztergom (Hungary), 1977, 107-128.
- [6] B. Biro, E. W. Kiss, P. P. Palfy, On the congruence extension property, Coll. Math. Soc. Janos Bolyai, 29. Univ. Alg, Esztergom (Hungary), 1977, 129-151.
- [7] S. Burris, H. P. Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1981
- [8] I. Chajda, Lattices of Compatible Relations, Arch. Math. 2, Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis, X:89-96, 1974.
- [9] I. Chajda, Varieties with tolerance and congruence extension property, Arch. Math. (Brno) Vol. 21, No. 1 (1985), 5-12.
- [10] I. Chajda, Partitions, coverings and blocks of compatible relations, Glasnik matemicki Vol. 14(34) (1979), 21-26.
- [11] I. Chajda, J. Duda; Rees algebras and their varieties, Publ. Math. Debrecen 32(1985) no. 1-2, 17-22.
- [12] I. Chajda, J. Duda, Blocks of binary relations, Acta Univ. Sci. Budapest, (1979), 3-9.
- [13] B. Csakany, Ob ekvivalentnosti nekotarih klassov algebraiceskih sistem, Acta Sci. Math, 23(1962), 46-57. (rus.)
- [14] B. Csakany, Primitivnie klassi algebr, ekvivalentnie klassam polumodulei i modulei, 157-164. (rus.)
- [15] B. Csakany, Varieties of affine modules, Acta. Sci. Math., 37 (1975) 3-10, Szeged.
- [16] B. Csakany, Varieties in which congruences and subalgebras are amicable, (1973), 25-31.
- [17] B. Csakany, Congruences and subalgebras, Annales Univ. Sci. Buda-

pest, Sectio Math., 18(1975), 37-44.

[18] P. Crawley, R. P. Dilworth, Algebraic theory of lattices, Prentice-Hall, Inc., N. J., 1973.

[19] G. Czédli, R. Freese; On Congruence distributivity and modularity, Algebra Universalis 17(1983) 216-219.

[20] A. Day; The congruence extension property and subdirectly irreducible algebras- an example, Algebra Universalis, Vol. 3, (1973) 229-237.

[21] A. Day; A Note on the Congruence Extension Property, Algebra Universalis 1 (1978), 234-235.

[22] A. Day, E. W. Kiss; Frames and Rings in Congruence Modular Varieties, Journal of Algebra, Vol. 109, No. 2, (1987) 479-507

[23] R. A. Dean, Elements of Abstract Algebra, John Wiley and Sons, Inc., New York London Sydney, 1966.

[24] H. Draškovicová, Connections between some congruence properties in a single algebra, Contributions to General Algebra 3, 1984, 103-113.

[25] H. Draškovicová, Weak direct product decomposition of algebras, Contributions to General Algebra 5, 1986, 105-121.

[26] H. Draškovicová, The lattice of partitions in a set, Acta F.R.N. Univ. Comen. - Math. XXIV (1970) 37-65.

[27] K. Drbohlav, Remarks on Tolerance Algebras, Acta Universitatis Carolinae- Mathematica et Physica, Vol. 22, No. 1, 11-16

[28] J. Duda, Mal'cev conditions for regular and weakly regular subalgebras of the square, Acta Sci. Math. 46(1983), 29-34.

[29] J. Dudek, A. Romanowska, Bisemilattices with four essentially binary polynomials, 33. Contributions to Lattice theory, Colloq. Math. Soc. Janos Bolyai, Szeged (1980), 337-360.

[30] J. Dudek; On Bisemilattices I, Colloq. Math., 47 (1982), 1-5.

[31] J. Dudek; On Bisemilattices II, Demonstratio Math., 15 (1982), no. 2., 465-475.

[32] J. Dudek; On Bisemilattices III, Math. Sem. Notes Kobe Univ. 10 (1982) no. 2, 275-279.

[33] I. Fleischer; On extending congruences from partial algebras, Fund. Math., (1975) 11-16.

[34] E. Fried, G. Gratzer, R. Quackenbush; Uniform congruence schemes, Algebra Universalis 10(1980) 176-188.

[35] E. Fried; A note on congruence extension property, Acta. Sci. Math., 40(1978), 261-263.

[36] E. Fried, A. F. Pixley, The dual discriminator function in universal algebra, Acta Sci. Math., 41(1979), 83-100.

- [37] J.Gałaszka; Generalized absorption laws in bisemilattices, *Algebra Universalis*, 19(1984), 304-318.
- [38] J.Gałaszka; On bisemilattices with generalized absorption laws, I, *Demonstratio Math.* 20 (1987) no 1-2, 37-43.
- [39] J.Gałaszka; Bisemilattices with five essentially binary polynomialis. *Math.Slovaca* 38 (1988) No.2, 123-132.
- [40] R.M.Godowski; On bisemilattices with one absorption law, *Demonstratio Math.* 19 (1986), no.1, 237-246.
- [41] G.Gratzer, *General lattice theory*, Akademie-Verlag Berlin, 1978.
- [42] G.Gratzer, H.Lakser; Two observations on the congruence extension property, *Proc.Amer.Math.Soc.*, Vol.35, No1(1975), 63-64
- [43] G.Gratzer, W.A.Lampe, On Subalgebra Lattices of Universal Algebras, *Journal of Algebra*, Vol.7 No.2 (1967), 263-270.
- [44] G.Gratzer, E.T.Schmidt, Characterizations of congruence lattices of abstract algebras, Budapest, 34-57.
- [45] G.H.Greco; On Raney's Theorems for completely distributive complete lattices, *Colloquium Mathematicum*, Vol LV (1988), Fasc.2, 213-217
- [46] H.P.Gumm; An easy way to the commutator in modular varieties, *Arch.Math.*, Vol.34(1980), 220-228
- [47] H.P.Gumm; *Geometrical Methods in Congruence Modular Algebras*, *Memoirs of the AMS*, No 286, Vol.45, 1983.
- [48] J.Hagemann, C.Herrmann, A concrete ideal multiplication for algebraic systems and its relation to congruence distributivity, *Arch.Math.*, Vol.32 (1979) 234-245.
- [49] C.Herrmann, Affine algebras in congruence modular varieties, *Acta.Sci.Math.*, 41(1979), 119-125.
- [50] M.Erne, Weak distributive laws and their role in lattices of congruences and equational theories, *Algebra Universalis* 25(1988) 290-231.
- [51] T.Evans, B.Ganter; Varieties with modular subalgebra lattices, *Bull.Austral.Math.Soc.* Vol.28(1983), 247-254.
- [52] O.Frink; Ideals in partially ordered sets, *Monthly*, april 1954, 223-234
- [53] O.Hajek, Direct decompositions of lattices, I. *Czech.Math.J.*, No.1 (1957) 1-13.
- [54] A.A.Iskander, Extensions of algebraic systems, *Trans.Amer.Math.Soc.*, Vol.281. No.1(1984)309-327.
- [55] J.Jezek; The lattice of equational theories. Part I: Modular elements. *Czech.Math.J.* 31(1981), 127-153.

- [56] J. Ježek; The lattice of equational theories. Part II: The lattice of full sets of terms. *Czech. Math. J.* 31(1981), 573-603.
- [57] J. Ježek; The lattice of equational theories. Part III: Definability and automorphisms. *Czech. Math. J.* 32(1982), 129-164.
- [58] B. Jonsson, *Topics in Universal Algebra*, Springer-Verlag Berlin·Heidelberg·New York, 1972.
- [59] J. A. Kalman, Subdirect decomposition of distributive quasi-lattices, *Fund. Math.* 71 (1971), 161-163.
- [60] R. McKenzie, A. Romanowska; Varieties of \ast -distributive bisemilattices, "Contribution to General Algebra", Klagenfurt 1979, 213-218.
- [61] R. McKenzie, G. McNulty, W. Taylor; *Algebras, Lattices, Varieties*, Vol. I, Monterey, California.
- [62] E. W. Kiss; Each Hamiltonian variety has the congruence extension property, *Algebra Universalis* 12 (1981) 395-398.
- [63] E. W. Kiss; Injectivity and related concepts in modular varieties, I Two commutator properties, *Bull. Austral. Math. Soc.*, Vol 32 (1985), 33-44.
- [64] E. W. Kiss; Injectivity and related concepts in modular varieties, II The congruence extension property, *Bull. Austral. Math. Soc.*, Vol 32 (1985), 35-53.
- [65] E. W. Kiss; Definable principal congruences in congruence distributive varieties, *Algebra Universalis*, 21(1985) 213-224.
- [66] E. W. Kiss, L. Marki, P. Prohle, W. Tholen, Categorical algebraic properties. A compendium on amalgamation, congruence extension, epimorphisms, residual smallness, and injectivity, *Studia Sci. Math. Hung.* 18(1983), 79-141.
- [67] L. Klukovits, Hamiltonian varieties in universal algebras, *Acta Sci. Math. Hung.* (Szeged) 37(1975) 11-15.
- [68] W. A. Lampe, On the congruence lattice characterization theorem, *Trans. Amer. Math. Soc.*, Vol. 182 (1973) 43-60.
- [69] W. A. Lampe, The Independence of Certain Related Structures of a universal algebra, I, Partial Algebras with Useless Operations and Other Lemmas, *Algebra Universalis*, Vol. 2, fasc. 1, (1972), 99-112.
- [70] W. A. Lampe, The Independence of Certain Related Structures of a universal algebra, II, The Automorphism Group and Congruence Lattice are Independent, *Algebra Universalis*, Vol. 2, fasc. 3, (1972), 271-283.
- [71] W. A. Lampe, The Independence of Certain Related Structures of a universal algebra, III, The Subalgebra Lattice and Congruence Lattice are Independent, *Algebra Universalis*, Vol. 2, fasc. 3, (1972), 286-295.
- [71'] W. A. Lampe, The Independence of Certain Related Structures of a

universal algebra, IV, The triple is Independent, Algebra Universalis, Vol. 2, fasc. 3, (1972), 296-302.

[72] E. Lukács; On the polynomial functions of bisemilattices, Ann. Univ. Sci. Budapest Eötvös Sect. Math. 29 (1986), 223-226 (1987).

[73] C. Mallia, P. Bhatta; Lattices all of whose congruences are neutral, Proc. Amer. Math. Soc, Vol. 94, Number 1, 49-51

[74] G. Markowsky, Primes, Irreducibles and Extremal Lattices, preprint, August 1991.

[75] S. D. Milić; On the isomorphism of modular lattices, Matematički vesnik 2(17), 1965, str. 153-155.

[76] S. Milić; Ob odnom dokazateljstve teoremi Sreiera v strukturah, Matematički vesnik 6(21) 1969, str. 161-162. (ruski).

[77] S. Milić, A. Tepavčević, Special elements generalizing modularity in a lattice, Rev. of Res. Fac. of Sci, Univ. of Novi Sad, (u štampi).

[78] R. Padmanabhan; Regular identities in lattices, Trans. Amer. Math Soc. 158 (1971) 179-188.

[79] P. P. Palfy, Modular Subalgebra Lattices, Preprint-Nr-1097, 1987.

[80] F. J. Pastijn, Constructions of varieties that satisfy the amalgamation property or the congruence extension property, Studia Sci. Math. Hung. 17(1982), 101-111.

[81] D. Pigozzi; Amalgamation, Congruence-Extension, and Interpolation Properties in Algebras, Algebra Universalis, Vol. 1, 1972, 269-349.

[82] J. Plonka; On distributive quasi-lattices, Fund. Math. 60(1967), 191-200.

[83] J. Plonka; On the lattice of varieties of unary algebras, SIMON STEVIN, A Quartely Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 59 (1985), Number 4, 353-364

[84] Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, Vol. II, Lattice Theory, AMS, Providence, R. I., 1961.

[85] P. Pudlak, A new proof of the congruence lattice representation theorem, Algebra Universalis 6(1976) 269-275.

[86] G. N. Raney; A subdirect-union representation for completely distributive complete lattice, Proc. Amer. Math. Soc. vol. 4 (1953) pp. 518-522.

[87] G. N. Raney; Tight Galois Connections and complete distributivity, Trans. Amer. Math. Soc. 97(1960), 418-426.

[88] N. R. Reilly; Representations of lattices via neutral elements, Algebra Universalis, 19(1984) 341-354.

[89] A. Romanowska; On bisemilattices with one distributive law, Algebra Universalis, 10(1980) 36-47.

- [90] A. Romanowska; Subdirectly irreducible \ast -distributive bisemilattices I, *Demonstratio Math.* 13 (1980), no.3, 767-785.
- [91] A. Romanowska; On distributivity of bisemilattices with one distributive law; *Universal Algebra (Esztergom, 1977.)*, pp.653-661, *Colloq. Math. Soc. Janos Bolyai*, 29, North-Holland, Amsterdam, 1982..
- [92] A. Romanowska, J.D.H. Smith; Bisemilattices of subsemilattices, *Journal of Algebra* 70, (1981), 78-88.
- [93] A. Romanowska; Building bisemilattices from lattices and semilattices, *Contributions to general algebra*, 2 (Klagenfurt, 1982), 343-358, Hölder-Pichler-Tempsky, Vienna, 1983.
- [94] A. Romanowska; On some construction of bisemilattices, *Demonstratio Math.* 17 (1984), no.4, 1011-1021.
- [95] I.G. Rosenberg, D. Schweigert, Compatible orderings and tolerances of lattices, preprint, 1984.
- [96] V.N. Salii, *Resetki s edinstvenimi dopolenenijami*, Nauka, Moskva 1984. (ruski).
- [97] L. A. Skornjakov, *Elementi teorii struktur*, Nauka, Moskva, 1982. (ruski).
- [98] J. Shapiro; Finite equational bases for subalgebra distributive varieties, *Algebra Universalis*, 24(1987) 36-40.
- [99] L. A. Skornjakov; Unars, *Colloquia Math. Soc. Janos Bolyai*, 29. *Univ. alg*, Esztergom (Hungary), 1977, 735-743.
- [100] B. Šešelja, G. Vojvodić, Weak congruences of a lattice, *Zbornik radova PMF u Novom Sadu*, 18,2 (1988) 205-209.
- [101] B. Šešelja, G. Vojvodić, On the complementedness of the lattice of weak congruences, *Studia Sci. Mat. Hung.* 24(1989), 289-293.
- [102] B. Šešelja, G. Vojvodić, A note on some lattice characterizations of Hamiltonian groups, *Zbornik radova PMF u Novom Sadu*, 19,1, 179-184 (1989).
- [103] B. Šešelja, G. Vojvodić, CEP and homomorphic images of algebras, *Zbornik radova PMF u Novom Sadu* 19,2, 75-80 (1989).
- [104] B. Šešelja, A. Tepavčević, Infinitely distributive elements in the lattices of weak congruences, *General algebra 1988*, Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland), 1990, 241-253.
- [105] B. Šešelja, A. Tepavčević, On CEP and semimodularity in the lattice of weak congruence, *Zbornik radova PMF u Novom Sadu* (u štampi).
- [106] B. Šešelja, A. Tepavčević, Weak congruence and homomorphisms, *Zbornik radova PMF u Novom Sadu, Ser. Mat.* 20,2 (1990), 61-69.
- [107] B. Šešelja, A. Tepavčević, Special elements of the lattice and lattice identities, *Zbornik radova PMF u Novom Sadu, Ser. Mat.* 20,2

(1990), 21-29.

[108] B. Šešelja, A. Tepavčević, On a construction of codes by P-fuzzy sets, Zbornik radova PMF u Novom Sadu, Ser. Mat. 20,2 (1990), 71-80.

[109] B. Šešelja, A. Tepavčević, Filters in a weak congruence lattice, Zbornik radova PMF u Novom Sadu (u štampi).

[110] B. Šešelja, A. Tepavčević, On a characterization of Rees varieties, preprint.

[111] B. Šešelja, A. Tepavčević, Relational valued fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, North-Holland Publ. Co., 52(1992) 217-222.

[112] B. Šešelja, A. Tepavčević, On the collection of lattices determined by the same poset of meet irreducibles, Zbornik radova PMF u Novom Sadu (u štampi).

[113] B. Šešelja, A. Tepavčević, G. Vojvodic, L-fuzzy sets and codes, Fuzzy sets and systems, North Holland Publ. Co., 53 (1993) 217-222.

[114] B. Šešelja, A. Tepavčević, Fuzzy Boolean algebras, Proceedings of the International Workshop on Advances in Automated Reasoning, Beijing, China, Elsevier Science Publishers (u štampi).

[115] B. Šešelja, A. Tepavčević, Representation of lattices by fuzzy sets, Information Science, (u štampi)

[116] A. Tepavčević, I. Stojmenović, Counting nonisomorphic paths in triangle-hexagonal grids, Zbornik radova sa IX međunarodnog simpozija "Kompjuter na sveučilistu", Dubrovnik, 1987.

[117] A. Tepavčević, On the continuous elements of the lattice, Zbornik radova PMF u Novom Sadu (u štampi).

[118] A. Tepavčević, Mrežno vrednosne algebarske strukture i kodovi, magistarski rad, 1990.

[119] R. F. Tichy, The Rees congruence in universal algebras, Publ. Inst. Math. tome 29(43), 1981, 229-239.

[120] Tran Duc Mai, Partitions and congruences in algebras, I. Basic properties, Arch. Math. 2, Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis, X:111-122, 1974.

[121] Tran Duc Mai, Partitions and congruences in algebras, II. Modular and distributive equalities, complements properties, Arch. Math. 3, Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis, X:159-172, 1974.

[122] Tran Duc Mai, Partitions and congruences in algebras, III. Commutativity of congruences Arch. Math. 2, Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis, X:173-188, 1974.

[123] Tran Duc Mai, Partitions and congruences in algebras, IV. Associable systems properties, Arch. Math. 4, Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis, X:231-254, 1974.

- [124]Usporiadane množiny a zvyazy, Vdedcky redaktor Tibor Katrinak, Univerzita Komenskeho, 1985.(ruski).
- [125]Usporiadane množiny a zvyazy II, Vdedcky redaktor Eva Gedeonova, Univerzita Komenskeho, 1988.(ruski).
- [126]J.Ušan, A. Tepavčević, On one class of bisemilattices, Zbornik radova PMF u Novom Sadu, 19,2, 93-104 (1989).
- [127]G.Vojvodić, B.Šešelja, On CEP and CIP in the lattice of weak congruences, Proceedings of the conference "Algebra and logic", Cetinje 1986.,221-227.
- [128]G.Vojvodić, B.Šešelja, A note on the modularity of the lattice of weak congruences on a finite group, Contributions to general algebra-5, Wien 1987, 415-419.
- [129]G.Vojvodić, B.Šešelja, Subalgebras and congruences via diagonal relation,, Proc. of the conference "Algebra and Logic", Sarajevo 1987, 169-177.
- [130]G.Vojvodić, B.Šešelja, On the lattice of weak congruence relations, Algebra Universalis, 25 (1988) 121-130.
- [131]G.Vojvodić, B.Šešelja, The diagonal relation in the lattice of weak congruences and the representtion of lattices, Zbornik radova PMF u Novom Sadu ,19,1,167-178(1989).
- [132]H.Werner, A Mal'cev condition for admissible relations, Algebra Universalis 3(1972),263.